
DUBLAŃSKI KALENDARZ ROLNICZY

1904

H. Altenberg Lwów









Wykaz oddziałów c. k. T. g. g., Towarzystw okręgowych c. k. T. R. Kr. oraz ich prezesów.

C. k. Towarzystwo gospodarskie galicyjskie we Lwowie.

Oddział	Przewodniczący	Miejsce zamieszkania	Miejsce poczta	Zastępca
Bełz	Madeyski Jan	Parchacz	Krystynopol	
Bóbrka	Czaykowski Włodzimierz	Sarniki	Bóbrka	
Brody-Złoczów	Obertyński Kazimierz	Stronibaby	Krasne	Bierzyński Emil Sekretarz R. O. } Złoczów Rada pow.
Brzeżany	Miliński Franciszek	Medowa	Kozowa	Biechoński Jan Sekretarz Oddz. } Brzeżany Rada pow.
Cieszanów				Strzelecki Jan Sekretarz R. O. } Cieszanów Rada pow.
Drohobycz	Bielski hr. Juliusz (junior)	Rychcice	Drohobycz	Frey Juliusz } Opary p. Drohobycz
Jarosław	Bzowski Władysław	Pantalowice	Kańczuga	Dąbrowski Józef Sekretarz R. O. } Wiązownica poczta loco
Jaworów	Szeptycki hr. Jan	Przyłbice		Dąbrowski Edm. Sekretarz R. O. } Jaworów Rada pow.
Kałusz	Rojowski Kazimierz	Humenów	Niegowce	
Kamionka Str.				
Lwów	Wiesiołowski Adolf	Lwów	Czarnieckiego 28	Dudrewicz Zygm. Sekretarz R. O. } Lwów Kopernika 19
Nawórna	Mandyczewski ks. kan. Kornel	Nadwórna		Szyszkowski zarz. dóbr i lasów rząd. } Nadwórna
Podolski	Cielecki-Zaremba Artur	Hadyńkowce		
Pokucki	Krzysztofowicz Mikołaj Dr.	Załucze nad Czeremoszem		
Przemyśl	Sapieha książę Wład.	Krasiczyn		Smolnicki Ant. Sekretarz R. O. } Przemyśl Rada pow.
Przemyślany	Wybranowski Aleks.	Czupernosów	Przemyślany	
Rawa	Jan Sołowij	Kamionka wołoska	Kamionka Lipnik	
Rohatyn	Tustanowski Michał	Podmichałowce	Żurów	Jomrógiewicz Sekretarz R. O. } Rohatyn Rada pow.
Rudki	Rayski Albin	Michalewice	Rudki	
Sambor	Stef. hr. Komorowski	Siekierczyce	Dublany-Kranzberg	Stefanowski St. Sekretarz R. O. } Sambor
Sanok	Wiktor Kazimierz	Zarszyn		
Stanisławów	Cieński Stanisław	Wodniki		Smulski Stan. Sekretarz R. O. } Stanisławów Rada pow.
Stryj	Brunicki bar. Julian	Podhorce koło Stryja		
Tarnopol	Fedorowicz Tadeusz	Klebanówka	Bogdanówka	Kierski Stanisław Sekretarz R. O. } Tarnopol
Tłumacz	Bohdanowicz Stan.	Petryłów	Uście zielone	
Żółkiew	Kozicki Stefan	Soposzyn	Żółkiew	

C. k. Towarzystwo rolnicze w Krakowie.

Towarzystwa okręgowe:

Siedziba	Prezes	Miejsce zamieszkania
Biała	Czecz baron Herman	Kozy
Bochnia	Rostworowski hr. Mich.	Ostrów szlachec.
Brzesko	Jordan Dr Adam	Więckowice
Jasło	Ostaszewski Stan.	Klimkówka
Kraków	Skirliński Jan	Kryspinów
Mielec	Tarnowski hr. Jan	Chorzelów
Nowy Sącz	Breza hr. August	Witowice dolne
Nowy Targ	Ks. Krawczyński Piotr	Ludzimierz
Ropczyce-Pilzno	Rey hr. Mikołaj	Przyborów
Rzeszów	Dąmbski Aleksander	Nosówka
Tarnów	Męciński Józef	Partyń
Wadowice	Chrząszcz Ludwik	Graboszyce
Wieliczka	Dydyński Maryan	Raciborsk

C. k. Towarzystwo gospodarskie we Lwowie:
Prezes Komitetu: Dr Włodzimierz Kozłowski.

C. k. Towarzystwo rolnicze w Krakowie:
Prezes Komitetu: Zdzisław hr. Tarnowski.

Towarzystwo Kółek rolniczych we Lwowie:
Prezes: Artur Zaremba-Cielecki.

Wypierajmy
wyroby nieswojskie!

Nowootworzony sklep we Lwowie
przy placu Halickim L. 14
pod firmą:

Piotra Miączyńskiego zięć
Stanisław Strzałkowski


poleca: naftę krajową z rafineryi Adama hr. Skrzyńskiego w Libuszy, oraz lampy wszelkiego rodzaju, tudzież bronzy kościelne i salonowe — od najtańszych do najwykwintniejszych, z fabryki J. Serkowskiego w Warszawie.

PALNIKI i SIATKI ŻAROWE, tudzież części składowe do lamp i świeczników, są zawsze na składzie.
Przyjmuje zamówienia na świeczniki oraz urządzenia elektryczne i gazowe.

Pierwsze galicyjskie Towarzystwo akcyjne Rafineryi spirytusu

* * *

Fabryka Likierów, Rozolisów, Rumu i Octu we Lwowie.



Orenstein & Koppel

FABRYKI
KOLEI WĄZKOTOROWYCH i LOKOMOTYW
we LWOWIE,
BIURA: ul. Słowackiego L. 2.
(naprzeciw głównej poczty).
SKŁADY: ul. Gródecka L. 127.
urządzają i dostarczają:

KOLEJE POLNE, LASOWE
oraz dla CELÓW PRZEMYSŁOWYCH
do ruchu ręcznego, konnego i parowego.

Koleje liniowe.
Koleje elektryczne.
Koleje przenośne.
Koleje drugorzędne.
Koleje dojazdowe.

Lokomotywy parowe.
Lokomotywy elektryczne i wagoniki.
Bagiery parowe.
Bagiery ręczne.

Wynajmuję koleje kompletnie urządzone.
Części zapasowe zawsze na składzie.
Katalogi, kosztorysy, rysunki bezpłatnie.

Bank Melioracyjny
Stowarzyszenie z ograniczoną poręką
we Lwowie

wykonuje
wszelkie prace melioracyjne

jako to: zdjęcia planów, wygotowywanie kosztorysów do drenowania pól, nawodnienia i odwodnienia łąk, budowy rowów, kanałów, dróg, szos, kolejek i t. p. i poleca się do praktycznego przeprowadzenia powyższych prac.

Finansowanie

uskutecznia się podług każdorazowej szczególnej umowy, a w razie potrzeby wyrabia Bank melioracyjny kredyt hipoteczny na cele melioracyi.

W razie już gotowych planów nastąpić może na podstawie tychże wykonanie pracy.

Dyrekcya.



DUBLAŃSKI
KALENDARZ ROLNICZY

na rok 1904.

WYDANY
PRZY WSPÓŁUDZIALE PROF. ST. CHANIEWSKIEGO
ST. KRÓLIKOWSKIEGO, DR. ST. PAWLIKA, K. SZULCA
ORAZ INŻ. ROZWADOWSKIEGO, DR. T. RYLSKIEGO
I INŻ. Z. CHMIELEWSKIEGO

PRZEZ

PROF. JÓZEFA MIKUŁOWSKIEGO-POMORSKIEGO
KIEROWNIKA KRAJ. STACYI DOŚWIADCZALNEJ CHEM.-ROLN. W DUBLANACH.

ROCZNIK DRUGI.

LWÓW.
NAKŁADEM KSIĘGARNI H. ALTENBERGA
1903.

SPIS RZECZY.

STATYSTYKA GALICYI

NA PODSTAWIE URZĘDOWYCH ŹRÓDEŁ

ułożona przez prof. Dr. St. Pawlika.

Obszar i podział administracyjny. Galicya obejmuje 78.496 km², t. j. 26.16% z obszaru Austro-Węgier; obszarów dworskich 5.384, gmin podatkowych 5.946; ogółem miejscowości 15.793. Miast o własnym statucie 2; powiatów politycznych 77: sądów obwodowych 16; sądów powiatowych 186.

Stosunki zaludnienia według tymczasowych wyników spisu z dnia 31 grudnia 1900. Galicya liczyła 7,315.817 mieszkańców, na 1 km² 93, przyrost ludności od 1890 r. wynosił 708.001 t. z. 10.7%. Ludność Austryi w r. 1900 wynosiła 26,150.599 mieszkańców, na 1 km² 87; przyrost od 1890 2,255.186 t. z. 9.4%. — Wiedeń liczył 1,662.269, Lwów zajmuje w Austryi 4-te miejsce i liczył 159.618, Kraków 7-me miejsce i liczył 91.310 mieszk. Domów mieszkalnych w Galicyi w r. 1900 było 1,130.101 partyj 1,450.900.

Podług **wyznania** było w Galicyi: rz. kat. 3,350.564, gr. kat. 3,090.139, ormian un. 11.836, ewang. 48 113, mojżesz. 811.149, reszta innego wyznania. Podług **języka towarzyskiego** (z przynależ. do obywatelstwa austr.) używało 1) w Galic. języka polskiego 3,9?0.621, ruskiego 3,042.199, niemieckiego 211.641, słowiańskiego 10.179, rumuńskiego 504, włoskiego 142. 2) w Austryi 4,260.961 polskiego, 3,343.323 ruskiego, 5,959.825 czeskiego, 1,192.750 słowackiego, 711.439 serb. i kroackiego, 727.084 włoskiego, 230.962 rumuńskiego, 9.512 węgiersk., a tylko 9,167.899 niemieckiego. Analfabetów liczyła Galicya 4.6 mil., Austrya 9 2 milionów

Zatrudnionych przy rolnictwie, leśnictwie i. t. p. 77.38%, przy przemyśle 9.26%, handlem 7.94%, urzędnicy i t. d. 5.42%.

Szkolnictwo: w r, 1900 1 było w Galicyi publ. szkół ludowych 2.152 pol, i 2.157 ruskich. Wydatki na szkoły ludowe wynosiły w r. 1897 koron 11,8 milionów. Gimnazyów było w r. 1898 9 30, klas 391: szkół realnych 6, klas 54; ogółem uczniów w szkołach średnich 18.892; nauczających 888. Średnia szkoła przypada w G. na 206.080 mieszkańców.

Uniwersytety we Lwowie i w Krakowie z ogólną liczbą słuchaczy (r. 1898/9) 3.239 zim. półr. 3,015 l. p. i profesorów 293 z. p. 301 l. p. Szkoła **politechniczna** we Lwowie (r. 1898/9) 560 słuchaczy z. p. 487 l p., wykładających ogółem 59.

Szkoły **przemysłowe** i zawodowe: 2 państw. Kraków i Lwów i 40 szkół zawodowych; uzupełniających przemysl. 47 i c. k. Akademia sztuk pięknych w Krakowie. Akademia handlowa Lwów.

Szkoły **rolnictwa,** leśnictwa, ogrodnictwa, weterynaryi i kucia koni w r. 1898/9. Studyum rolnicze przy c. k. Uniw. w Krako-

wie (1890)[1]), Akademia rolnicza w Dublanach (1855), kraj. sred. szkoła rol. w Czernichowie (1860), kraj. szkoła leśna we Lwowie (1864). Kraj. szkoła gorzelnicza w Dublanach (1881). Szkoły niższe rolnicze krajowe: Dublany (1873 r.), Jagielnica (1885), Horodenka (1885), Kobiernice (1886), Bereźnica (1896), Suchodół (1898). C. k. szkoła leśniczych w Bolechowie (1883), szkoła ogrod. we Lwowie przy Towarz. ogrod. (1872). Kraj. szkoła ogrod. w Tarnowie (1889). Praktyczna szkoła uprawy chmielu w Star. Siole (1887). Zakład sadowniczy w Zaleszczykach (1889).

C. k. Akademia weterynaryi wraz z szkołą kucia koni we Lwowie. Kursa weter. i kucia koni, kursa mleczarskie, kursa ogrodnicze, uprawy tytoniu i t. d. urządzane przez Towarzystwa rolnicze.

Kraj. Stacye doświadczalne chemiczno-rolnicza w Dublanach i botaniczno-rolnicza we Lwowie (ul. Badenich 7.), Kraj. Biuro melioracyjne (Lwów).

C. k. Towarzystwo Rolnicze Krakowskie z 13 okręgow. Tow. roln. (Kraków).

C. k. Towarzystwo gospodarskie galicyjskie z 27 oddziałami. (Lwów).

Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń. od ognia i gradu w Krakowie.

Centr. Towarzystwo Kółek rolniczych (Lwów Kopernika 19). Towarzystwo Ogrodnicze Kraków. Tow. ogrod. sadownicze Lwów. Tow. zawodowych ogrodników Lwów i w. i. — Gal. Towarzystwo leśne Lwów. Tow. hodowli drobiu Lwów.

Rolnictwo. Z ogólu 7,849.600 ha. ziemi obejmują role 3,803.351 (48.45%), łąki 876.458 (11.16%), ogrody 109.259 (1.39%), pastwiska 721.087 (9.19%), hale 33.466 (0.43%), lasy 2,021.828 (25.76%), jeziora, moczary, stawy 20.976 (0.27%), pod zabudowaniami 46.045 (0.58%), nieużytki 40.628 (0.52%), inne grunta 176.429 (2.25%). Opodatkowanej ziemi 7,856.597 ha., wolnej od podatku 263.102 ha

Zbiory zbożowych, okopowych i siana łąkowego w Galicyi w cetnarach metrycznych z ha.:

przeciętnie	pszenica	żyto	jęczmień	owies	kukurydza
od 1889–1898.	8.48	7.18	7.85	6.62	10.38
Rok 1899.	11.84	9.68	9.40	8.66	10.33

przeciętnie	ziemniaki	buraki cukr.	buraki past.	siano łąkowe
od 1889–1898.	89.33	167.75	198.89	24.16
Rok 1899.	97.68	207.20	224.50	21.50

Hodowla bydła:

	W Austryi w r. 1900 było:	w Galicyi w r. 1900.
koni	1.7 mil.	864.000
bydła	9.5 »	2,715.000
wołów	1.5 »	
mułów i osłów	66.000	962
kóz	1 mil.	17.952
owiec	2.6 »	437.697
świń	4.7 »	1,254.444
kur	23.1 »	6,878.377

[1]) w ( ) rok założenia.

W Austryi w r. 1900 było:		w Galicyi w r. 1900.
gęsi	1.8 mil.	457.939
kaczek	0.5 »	285.319
innego drobiu	1.3 »	133.235
ulów pszczół	995.300.	1.115

	W rejonie c. k. krak. Towarz. roln. było w r. 1899.		W rejonie c. k. gal. Towarz. gospodarsk. było w r. 1901.	
Zakładane przez Towarz. gospod.	obór zarod. bydła rogat.	109		68
	stacyi subwencyjnych.	183	}	302
	buhajów subwencyon.	115		
	ogierów subwencyon.	8	} licencyonowanych stacyj ogierów	44
	» subwencyjnych.	11		
	chlewni zarod. ogółem	16	centralnych i zarod.	384
	stac. knurów subwenc.	26		205
	owczarń zarodowych.	3		80
	stac. tryków subwenc.	4		87
	kurników zarodowych.	5		8

Przemysł cukrowniczy, gorzelniany i piwowarski w Galicyi.

W r. 1900 były 2 cukrownie i 1 rafin. (Przeworsk i Tłumacz).
» » było 662 gorzelń z produkcyą 590.952 hl. spiryt.
» » » 125 browarów » 1,102.438 hl. piwa.

W r. 1898 było młynów parowych i ameryk. 221, wodnych 1.455, konnych 23, wiatraków 22, wodnych z tartakiem 117.

Komunikacye Galicyi.

W r. 1898 było dróg bitych eraryalnych	2.887	kilometrów;
dróg krajowych	1.812	»
dróg powiatowych i konkurencyjnych	2.382	»
dróg gminnych	6.750	»
Razem	13.833	kilometrów.

Dróg wodnych spławnych na rzekach i kanałach w r. 1898.		
dla galarów	1.287	kilometrów.
dla galarów i okrętów	815	»
Razem	2.102	kilometrów.

Kolei żelaznych: c. k. kolei państwowych	2.273	km.
prywatnych w zarządzie państwa	1.012	»
» (c. Ferdynanda)	195	»
zagranicznych (pruska kolej)	2.4	»
Ogółem	3.483	km.

Długość linii telefonicznych w r. 1898 wynosiła 815 km.; urzędów pocztowych było 834, stacyj telegraficznych państwowych 367, kolejowych 317.

Podatki:

W r. 1900 zapłaciła Galicya: pod. grun.	8.60	mil. K.
pod. dom. czynszowego	3.96	» »
» » klasowego	3.06	» »
pod. zarobkowego, osob. dochod. i t. d.	9.81	» »

Ogółem podatków bezpośrednich 26,088.800 K. (9.90%).
» podat. spożyw. w r. 1898. 35,699.798 »

Dochody państwa preliminowane na r. 1901. wynoszą 1,641.997.585 koron.

Udział Galicyi w dochodach państwa, dających się rozłożyć na kraje koronne (bez preliminarza inwestycyjnego) wynosił w r. 1901. 122,932.831 koron t. j. 11.82%.

Budżet krajowy na r. 1901. wynosi 21,333.224 koron — z czego na cele rolnictwa i górnictwa przeznaczono 1,285.191 koron.

STREFY KLIMATYCZNE W GALICYI

przez **prof. K. Szulca.**

I. Strefa zachodnia (Chrzanowskie, Krakowskie, Powiśle) przeciętna temperatura roczna dochodzi do + 8° C, lata do + 18° C, zimy do — 3.3° przeciętne maximum temperatury w lipcu + 31.7 (Kraków), w roku + 32.8 (Kraków). przeciętne minimum temperatury w styczniu — 18.9° (Kraków), w roku 22% (Kraków). Prawdopodobieństwo przymrozków majowych 1/5 (t. j. co 5 lat). Roczny opad 600—700 mm. Najwięcej dni z opadem wykazują maj i czerwiec; największą ilość opadu czerwiec i lipiec.

II. Strefa północno-wschodnia (na wschód od poprzedniej, sięga na południe prawie do działu wód Sanu, Buga, Styru a Dniestru) latem cieplejsza zimą zimniejsza od poprzedniej. Prawdopodobieństwo przymrozków w kwietniu 1/5, w maju 1/5. Roczny opad w ogóle nie przechodzi 700 mm. Najwięcej dni z opadem wykazuje czerwiec; największą ilość opadu — czerwiec (w zachodniej części strefy) i lipiec.

III. Strefa środkowo-wschodnia (zajmująca środek wschodniej Galicyi od Sambora ku wyżynie Tarnopolskiej) wykazuje w wyższym stopniu cechy klimatu śródlądowego, zwłaszcza we wschodniej części strefy, gdzie zima jest znacznie ostrzejszą, wahania temperatury większe, a i roczne temperatury niższe, niż w strefach poprzednich. Prawdopodobieństwo przymrozków w maju więcej niż 1/5, w kwietniu 9/10. Roczna ilość opadu jest większą w północnej części tej strefy (wyżej 700 mm.), a mniejszą w południowej części (600—700 mm.). Najwięcej dni z opadem okazuje czerwiec, największą ilość opadu lipiec.

IV. Strefa południowo-wschodnia (na południe od poprzedniej, opierająca się od zachodu o okolice podgórskie) odznacza się wyższą temperaturą lata przy ostrej zimie. Roczna ilość opadu 600 - 700 mm. Najwięcej dni z opadem przypada na czerwiec i lipiec; najwięcej opadu na lipiec i czerwiec.

V. Strefa górska (obejmująca najwyższą część kraju) wykazuje niższe roczne temperatury, chłodniejsze lato i ostrzejszą zimę, niż inne części kraju. Roczna ilość opadu tej strefy jest największą w całym kraju, przekraczając w oddzielnych miejscach nawet 1100 lub 1200 mm. Najwięcej dni z opadem wykazuje czerwiec i lipiec, największą ilość również czerwiec i lipiec.

CZĘŚĆ KALENDARZOWA.

Rok 1904 jest:

rokiem 6617 peryodu juliańskiego.
» 7412—7413 ery bizantyjskiej.
» 1321—1322 » mahometańskiej.
» 5664—5665 kalendarza żydowskiego.

Zaćmienia słońca i księżyca w r. 1904.

I. 16 marca przypada pierścieniowe zaćmienie słońca widzialne we wschodniej części Afryki i Azyi, na oceanie indyjskim i zachodniej stronie Oceanu spokojnego.

II. 9 września całkowite zaćmienie słońca widzialne w południowo-zachodniej Ameryce i na Oceanie Spokojnym.

W r. b. nie przypada żadne zaćmienie księżyca.

Ferye sądowe.

Wszystkie Niedziele i Święta uroczyste; od Bożego Narodzenia do Trzech Króli; od Niedzieli Kwietnej do Poniedziałku Wielkanocnego; Dnie Krzyżowe; 10 ostatnich dni w lipcu i 10 pierwszych w październiku.

Żydów dni wolne od stawania w Sądach przypadają w następujące ich święta:

1) Nowy rok 2 dni; 2) Święto pojednania 1 dzień; 3) Święto Kuczek 2 pierwsze i 2 ostatnie dni;
4) Wielkanoc 3 pierwsze i 2 ostatnie dni;
5) Zielone święta 2 dni.

W Niedzielę Wielkanocną, Zielonych Świątek i w dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia przedstawienia teatralne i inne widowiska mogą być dawane tylko na cele dobroczynne i za zezwoleniem Zwierzchności. W dnie te bale publiczne i tańce są zabronione.

Styczeń

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Styczeń.

DNIE		ŚWIĘTA		
		rzymsko-katolickie	grecko-katolickie	
1	**P.**	**Nowy Rok**	19	Wonyfatya
2	S.	Makarego opata	20	Ibnatyja
3	**N.**	**Genowefy p.** p.	21	**Julyanny mucz.**
4	P.	Tytusa bisk.	22	Anastazyi
5	W.	Telesfora m.	23	10 m. w Kriti
6	**Ś.**	**Trzech Króli.**	24	Iewhenyi
7	C.	Walentego b.	25	**Roždest. Chryst.**
8	P.	Seweryna op.	26	**Sobor P. Boh.**
9	S.	Marcyanny p. o. k.	27	**Stefana Mucz.**
10	**N.**	**Pawła pust.**	28	**20.000 Mucz.**
11	P.	Higina m.	29	SS. Młaďanciw
12	W.	Honoraty	30	Anysyi
13	Ś.	Hilarego bisk.	31	Mełanyi
14	C.	Feliksa z Noli	1	**Henvar. 1904.**
15	P.	Maura op.	2	Sylvestra
16	S.	Marcelego I. pap.	3	Małahia
17	**N.**	**Antoniego op.** n.	4	**Sobor 70 Apost.**
18	P.	Pryski panny	5	Fteopempta
19	W.	Imienia Jezus	6	**Bohojawl. Hospod.**
20	Ś.	Fabiana i Seb. m.	7	Sobor S. Joana
21	C.	Agnieszki p. m.	8	Hryhorya pr.
22	P.	Wincentego m.	9	Patyjewkta
23	S.	Zaślubiny NPM.	10	Hryhora ep.
24	**N.**	**Tymoteusza**	11	**Fteodozya pr.**
25	P.	N. św. Pawła Ap.	12	Tatiany M.
26	W.	Polikarpa 1 k.	13	Ermyła m.
27	Ś.	Jana Chryzostoma	14	S. S. Otec. w S.
28	C.	Karola W.	15	Pawła Ftew.
29	P.	Franciszka Salezego	16	Pokłon ok. Petr.
30	S.	Martyny p. i Saw. p.	17	Antonia weł.
31	**N.**	**Piotra N. i Marcelli**	18	Aftanazya

Luty.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Luty.

DNIE		ŚWIĘTA rzymsko-katolickie		ŚWIĘTA grecko-katolickie
1	P.	Ignacego b. † 🌕 p.	19	Makarya
2	**W.**	**NPM. Gromnicznej**	20	Eufemija
3	S.	Błażeja bisk.	21	Maksyma
4	C.	Weroniki p.	22	Tymofteja ap.
5	P.	Agaty p.	23	Kłymenta m
6	S.	Doroty p.	24	Ilenyi prep.
7	**N.**	**Romualda op.**	25	**Hryhorya**
8	P.	Jana z Maty ☾ o. k.	26	Ksenofonta
9	W.	Apolonii p.	27	Joana Chrys.
10	Ś.	Scholastyki p.	28	Jefrema
11	C.	Eufrozyny p.	29	Ihnatya mucz.
12	P.	Eulalii	30	**Trech Swiat.**
13	S.	Katarzyny Rici	31	Kyra i Joana
14	**N.**	**Walentego bisk.**	1	**Trytona**
15	P.	Faustyna m.	2	**Stritenie Hosp.**
16	W.	Julianny 🌑 nów	3	Symeon i Anny
17	Ś.	Konstancyi p. *Pop.†*	4	Isydora
18	C.	Flawiana	5	Ahaftyi mucz.
19	P.	Konrada	6	Wukoła pr.
20	S.	Nicefora m.	7	Parftenya
21	**N.**	**Eleonory p.**	8	**Fteodora S.**
22	P.	Piotra katedry	9	Nykofora m.
23	W.	Romany	10	Charłampyja
24	Ś.	Sergiusza m.	11	Własya *Pop*
25	C.	Macieja ap.	12	Meletya arch.
26	P.	Anastazyi p. ☽ 1 k.	13	Martyniana
27	S.	Wiktora z Ar.	14	Kiryła
28	**N.**	**Aleksandra b.**	15	**Onysyma**
29	P.	Romana wyzn.	16	Samfytyja

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

29 (Adar 13) Post Esthery.

Marzec.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Marzec.

DNIE		ŚWIĘTA rzymsko-katolickie	ŚWIĘTA grecko-katolickie	
1	W.	Albina bisk.	17	Fteodora m †
2	Ś.	Symplicyusza p.	18	Lwa pap. m.
3	C.	Kunegundy	19	Archyppa
4	P.	Kazimierza króla	20	Łeona Jep.
5	S.	Fryderyka op.	21	Tymofteja pr.
6	N.	Kolety	22	SS. Mucz. w E.
7	P.	Tomasza z Akwinu	23	Połykarpa
8	W.	Jana Bożego	24	Ob. hoł. św. Joana
9	Ś.	Franciszki p. o. k.	25	Tarasia
10	C.	40 męczenników	26	Porfyrya
11	P.	Konstantyna	27	Prokopia
12	S.	Grzegorza W.	28	Wasyłja
13	N.	Rozyny i Rudryka	29	Kassiana
14	P.	Matyldy p.	1	Ewdokii
15	W.	Longina m.	2	Fteodota
16	Ś.	Lubina m.	3	Ewtropia
17	C.	Gertrudy p. nów	4	Harasyma
18	P.	Edwarda II. króla	5	Konowa m.
19	S.	Józefa Oblub.	6	42 mucz.
20	N.	Joachima i Klaudyi	7	Wasyła mucz.
21	P.	Katarzyny	8	Fteofyłakta
22	W.	Oktawiana	9	S. S 40 mucz.
23	Ś.	Wiktora m.	10	Kondrata
24	C.	Gabryela arch. 1 k.	11	Sofronya
25	P.	Zwiastowanie NPM.	12	Fteofana
26	S.	Teodozyusza	13	Nykyfora
27	N.	Ruperta	14	Wenedykta
28	P.	Sykstusa	15	Ahapia mucz.
29	W.	Eustazego	16	Sawyna mucz.
30	Ś.	Kwiryna	17	Aleksia pr.
31	C.	Balbiny pełnia	18	Kiryłła mucz.

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

1 (Adar 14) Purim. 2 (Adar 15) Schuschan Purim.
31 (Nisan 15) Passah.

Kwiecień.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Kwiecień.

DNIE		ŚWIĘTA rzymsko-katolickie		ŚWIĘTA grecko-katolickie
1	P.	*W. P.* Hugona b.	19	Chrysanfta
2	S.	*W. S.* Franciszka z P.	20	Prep. Otec
3	N.	Wielkanoc. Ryszarda	21	Janowa
4	P.	Pon. Wielk. Izydora	22	Wasyłya
5	W.	Wincentego F	23	Nykona
6	Ś.	Celestyna p.	24	Zacharyi pre.
7	C.	Hermana wyz. ☾ o. k	25	Błach. P. Bohor.
8	P.	Dyonizego bisk.	26	Welika Piatnic.
9	S.	Maryi E.	27	Matrony Sełun.
10	N.	Ezechiela pr.	28	Woskr. Hospod.
11	P.	Leona pap.	29	Poned. Woskr.
12	W.	Juliusza p.	30	Wtorek Hospod.
13	Ś.	Justyna	31	Apołonii
14	C.	Waleryana	1	Maryi
15	P.	Ludwiny ● nów	2	Tyta
16	S.	Lamberta	3	Nikity Sr.
17	N.	Rudolfa bisk.	4	Josyfa prep.
18	P.	Apoloniusza m.	5	Fteodyła m.
19	W.	Emmy wdowy	6	Jewtychia
20	Ś.	Agnieszki	7	Georgia
21	C.	Anzelma bisk.	8	Irydiona
22	P.	Sotera i Kaja	9	Wadima
23	S.	Wojciecha b. ☽ 1 k.	10	Terentya
24	N.	Jerzego męcz.	11	Antypy m.
25	P.	Marka ewang.	12	Wasyłya
26	W.	Kleta i Marcelina	13	Artemona
27	Ś.	Peregryna	14	Mortyna
28	C.	Witalisa	15	Arystarcha
29	P.	Piotra męcz. ○ p.	16	Atrapii mucz.
30	S.	Katarzyny Sen.	17	Symeona

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

1, 6, 7 (16, 21, 22 Nisan) Passah.

Maj.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Maj.

DNIE		ŚWIĘTA rzymsko-katolickie		ŚWIĘTA grecko-katolickie
1	N.	Filipa i Jakóba	18	Joanna prep.
2	P.	Zygmunta króla	19	Joanna Wel.
3	W.	Znalezienie ś. Krz.	20	Fteodora
4	Ś.	Floryana m.	21	Januaria
5	C.	Piusa V	22	Fteodora Syk.
6	P.	Jana w ol.	23	Heorhya m.
7	S.	Domiceli ☾ ost. kw.	24	Sawwy mucz.
8	N.	Stanisława bisk.	25	Marka Jew.
9	P.	Grzegorza Nar.	26	Wasylya.
10	W.	Izydora oracza	27	Symeona
11	Ś.	Beatryksy p.	28	Jasona arch.
12	C.	Wniebows. P. Pankr.	29	Dewiat mucz.
13	P.	Serwacego	30	Jakowa
14	S.	Bonifacego	1	Jeremyi
15	N.	Zofii i 3 córek 🌑 n.	2	Aftanazyi
16	P.	Jana Nepomucena	3	Tymofteja
17	W.	Paschalisa wyz.	4	Pełanyi mucz.
18	Ś.	Feliksa spow.	5	Iryny mucz.
19	C.	Piotra C. p.	6	Woznesenie hospod.
20	P.	Bernarda	7	Znam. cz. Kr.
21	S.	Heleny wd.	8	Joana Boh.
22	N.	Zesł. D. ś. Julii p. ☽	9	Nikołaja per. moszc
23	P.	P. Z. S. Dezyder.	10	Symeona ap.
24	W.	Joanny wdowy	11	Mokya mucz.
25	Ś.	Grzegorza	12	Jepyfanya
26	C.	Filipa Nereusza	13	Hlyheryi mucz.
27	P.	Jana pap.	14	Izydora mucz.
28	S.	Wilhelma	15	Pachorgeya
29	N.	Maryi Magdaleny 🌕	16	Sosz. św. Ducha
30	P.	Feliksa pap.	17	Poned. Sosz.
31	W.	Petroneli p.	18	Fteodota

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

3 (Ijar 18) Lag B'omer. 20, 21 (Sivar 6, 7) Ziel. Święta.

Czerwiec.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Czerwiec.

DNIE		ŚWIĘTA rzymsko-katolickie	ŚWIĘTA grecko-katolickie	
1	S.	Nikodema m.	19	Patryki Jep.
2	**C.**	**Boże Ciało**	20	Ftatałeja
3	P.	Klotyldy król.	21	Konstantyna
4	S.	Kwiryna	22	Wasyłya
5	**N.**	**Bonifacego**	23	**Mychaiła**
6	P.	Norberta ☾ o. kw.	24	Symeona
7	W.	Roberta b. m.	25	Obr. hl. ś. Joana.
8	Ś.	Medarda	26	Karpa ap.
9	C.	Felicyana Prym.	27	Fteraponta.
10	P.	Małgorzaty	28	Nykyty
11	S.	Barnaby ap.	29	Fteodozyi
12	**N.**	**Onufrego wyzn.**	30	**Isakya A.**
13	P.	Antoniego z P. 🌑 n.	31	Jeremya A.
14	W.	Bazylego bisk.	1	Justyma
15	Ś.	Wita i Modesta	2	Nykifora
16	C.	Franciszka reg.	3	Łukilyana
17	P.	Adolfa bisk.	4	Mytrofona
18	S.	Marka i Marc.	5	Dorofteja
19	**N.**	**Gerwazego i Prot.**	6	**Wysaryona pr.**
20	P.	Sylweryusza ☽ 1 k.	7	Fteodota świaszcz.
21	W.	Alojzego Gonz.	8	Fteodora m.
22	Ś.	Paulina	9	Kiryła arch.
23	C.	Zenona bisk.	10	Tymoftea
24	P.	Jana Chrzc.	11	Warftołomeja
25	S.	Prospera b.	12	Onufrya prep.
26	**N.**	**Jana i Pawła**	13	**Akiłymy**
27	P.	Władysława kr. 🌕 p.	14	Ełyseja
28	W.	Leona pap.	15	Amosa pror.
29	**Ś.**	**Piotra i Pawła**	16	Tychona
30	C.	Lucyny i Emiliany	17	Manuiła

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

30 (17 Thamur.) Post. Zdobycie Świątyni.

Lipiec.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Lipiec.

DNIE		ŚWIĘTA rzymsko-katolickie		ŚWIĘTA grecko-katolickie
1	P.	Teobalda op.	18	Leontya
2	S.	Nawiedzenie NPM.	19	Judy apost.
3	N.	Heliodora	20	Mefodya
4	P.	Józefa Kalas.	21	Julyana mucz.
5	W.	Filomeny p. ☾ o. k.	22	Jewsewyja
6	Ś.	Izajasza pror.	23	Ahrypiny
7	C.	Pulcheryi	24	Rożd. ś. Joana
8	P.	Elżbiety król.	25	Fewronyi
9	S.	Cyryla b. Weron.	26	Dawyda Fłes.
10	N.	Amalii p.	27	Samsona pr.
11	P.	Pelagii p.	28	Kyra i Joana
12	W.	Henryka Jana Gwal.	29	Petra i Pawła
13	Ś.	Małg. p. J. z D. ● n.	30	Sobor 12 Ap.
14	C.	Bonawentury	1	Kosmy i Damiana
15	P.	Rozesłanie Apost.	2	Poł. ryzy Boh.
16	S.	NPM. Szkaplerz.	3	Jakynfta m.
17	N.	Aleksandra wyzn.	4	Andreja
18	P.	Szymona z L.	5	Aftanazya Afr.
19	W.	Winc. z P. ☽ 1 k.	6	Sysosa pr.
20	Ś.	Czesława	7	Ftomy prop.
21	C.	Praksedy p.	8	Prokopya
22	P.	Maryi Magd.	9	Pankratya
23	S.	Apolinarego	10	SS. 45 Mucz.
24	N.	Krystyny	11	Jeftymya
25	P	Jakóba apost.	12	Prokła
26	W.	Anny	13	Sabor s. Hawł.
27	Ś.	Natalii p. Kun. p. ○	14	Akyły ap.
28	C.	Inocentego	15	Kyraka m.
29	P.	Marty p.	16	Aftynohena
30	S.	Abdona i Senny	17	Martyny
31	N.	Ignacego Lojoli	18	Jemylyana

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

9 (9 Ab) Post. Spalenie Świątyni.

Sierpień.

1
2
3
4
5
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sierpień.

DNIE		ŚWIĘTA rzymsko-katolickie		ŚWIĘTA grecko-katolickie
1	P.	Piotra w okow.	19	Makryny
2	W.	NPM. Anielskiej	20	Iłyi pror.
3	Ś.	Znalez. św. Szczep.	21	Symeona
4	C.	Dominika w. ☾ o. k.	22	Maryi Mahd.
5	P.	NPM. Śnieżnej	23	Trofyma
6	S.	Przemien. Pańskie	24	Chrystyny
7	**N.**	**Kajetana wyzn.**	25	**Uspen. ś. Anny**
8	P.	Cyryaka męcz.	26	Jermołaja
9	W.	Romana i Sek.	27	Pantałejmona
10	Ś.	Wawrzyńca m.	28	Prohora i Nik.
11	C.	Zuzanny p. 🌑 n.	29	Kałłynyka
12	P.	Klary p.	30	Syły ap.
13	S.	Hipolita męcz.	31	Jewdokina
14	**N.**	**Euzebiusza**	1	**Prois s. Kr.**
15	**P.**	**Wniebowz. NPM.**	2	Stefana m.
16	W.	Rocha wyzn.	3	Izaakija
17	Ś.	Liberata op. Jacka w.	4	Otrok. † w Ef.
18	C.	Heleny ☽ 1 k.	5	Jewsychnia
19	P.	Benigny	6	**Preobr. Hosp.**
20	S.	Stefana króla	7	Dometya pr.
21	**N.**	**Joanny Fremiot**	8	**Jemyłyana**
22	P.	Filiberta op.	9	Maftea ap.
23	W.	Filipa bisk.	10	Ławrentya m.
24	Ś.	Bartłomieja	11	Jewpła arch.
25	C.	Ludwika króla	12	Fotya mucz.
26	P.	Zefiryny p. 🌕 p.	13	Maksyma p.
27	S.	Przenieś. św. Kaz.	14	Mycheja pr.
28	**N.**	**Augustyna bisk.**	15	**Usp. Bohor.**
29	P.	Ścięcie ś. Jana	16	Nemkoł Obr.
30	W.	Róży z Limy	17	Myrona
31	Ś.	Rajmunda w. Joach.	18	Flora z Ławra.

Wrzesień.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Wrzesień.

DNIE		ŚWIĘTA rzymsko-katolickie		ŚWIĘTA grecko-katolickie
1	C.	Idziego op.	19	Andreja str.
2	P.	Justa b. Stefana kr.	20	Samuiła prep.
3	S.	Bron. i Izab. ☾ o k.	21	Ftadeja
4	N.	Rozalii panny	22	Achaftonika
5	P.	Wawrzyńca b.	23	Łuppa mucz.
6	W.	Zacharyasza	24	Ewtychia
7	Ś.	Reginy p. †	25	Warttołomeja
8	C.	Narodz. NPM.	26	Adriana
9	P.	Gorgoniusza ● n.	27	Pymena
10	S.	Mikołaja z Tol.	28	Mojseja
11	N.	Jacka i Prota	29	Usikł. ht. S. I.
12	P.	Gwidona w. Waler.	30	Aleksandra
13	W.	Tobiasza Filipa	31	Poł. poj. p. Boch.
14	Ś.	Podw. ś. Krz.	1	Symeona
15	C.	Nikodema	2	Mamanta
16	P.	Korn. i Cypr. † ☽ 1 k.	3	Anftyma
17	S.	Lamberta bisk.	4	Wawyły
18	N.	Tom. z K. Józ. z K.	5	Zacharya
19	P.	Januaryusza	6	Wosp. cz. Mich.
20	W.	Eustachiusza	7	Sozanta
21	Ś.	Mateusza ew.	8	Roż Pr. Boh.
22	C.	Maurycego bisk	9	Joakima i Anny
23	P.	Tekli p.	10	Mynodory m.
24	S.	Gerarda bisk. ○ p.	11	Fteodory prep.
25	N.	Kleofasa męcz.	12	Awtemona
26	P.	Cypryana	13	Kornyła Poł.
27	W.	Kosmy i Damiana	14	Woz. cz. Kr.
28	Ś.	Wacława kr.	15	Nikity
29	C.	Michała Arch.	16	Jewfimyi
30	P.	Hieronima wyzn.	17	Sofii mucz.

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

10 (1 Tischri). Nowy rok 5665. 11 (2 Tischri). Drugie Święto Nowego roku. 12 (3 Tischri) post Gedajlach. 19 (Tischri 10) Święto poj. (Sądny dzień). 24, 25 (15, 16 Tischri) Święto Kuczek. 12 (21 Tischri) Święto palmowe.

Październik.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Październik.

DNIE		ŚWIĘTA rzymsko-katolickie		ŚWIĘTA grecko-katolickie
1	S.	Remigiusza	18	Jewmenyja pr.
2	N.	NMP. Róż. ☾ o. k.	19	Trofyma m.
3	P.	Kandyda męcz.	20	Eustafia
4	W.	Franciszka Ser.	21	Kodrata
5	Ś.	Placydy	22	Foky mucz.
6	C.	Brunona w.	23	Zacz. Ioan.
7	P.	Justyny p.	24	Ftekły mucz.
8	S.	Brygidy wdowy	25	Eufrozyny
9	N.	Winc. Kadł. ● n.	26	Joana Boh.
10	P.	Franciszka Borgia.	27	Kałystrata
11	W.	Placydy męcz.	28	Charytona
12	Ś.	Maksymiliana	29	Kyrjaka
13	C.	Edwarda k.	30	Hrehorya
14	P.	Kaliksta pap.	1	Pokr. P.
15	S.	Jadwigi i Teresy	2	Kypryana
16	N.	Gawła op. ☽ 1 k.	3	Dyonisia
17	P.	Lucyny, Wiktora	4	Jerofteja
18	W.	Łukasza ew.	5	Charytyny
19	Ś.	Piotra z A. Jana K.	6	Ftomy ap.
20	C.	Felicyana	7	Serhya
21	P.	Urszuli p. m.	8	Pełahyi m.
22	S.	Korduli p.	9	Jakowa ap.
23	N.	Jana Kapistrana	10	Jewłampia
24	P.	Rafała arch. ○ p.	11	Fylypa ap.
25	W.	Kryspiny	12	Prowa mucz.
26	S.	Ewarysta	13	Karpa
27	C.	Sabiny	14	Nazarya i Par.
28	P.	Szymona i Tad.	15	Jewfymija
29	S	Narcyza bisk.	16	Łonhyna m.
30	N.	Klaudyusza	17	Osyi prep.
31	P.	Wolfganga †	18	Łukii Ew.

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

1 (22 Tischri) Koniec Kuczek. 2 (23 Tischri) Radość z prawa.

Listopad.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Listopad.

DNIE		ŚWIETA rzymsko-katolickie		ŚWIETA grecko-katolickie
1	W.	Wszyst. św. ☾ o. k.	19	Joiła pror.
2	S.	Dzień zaduszny	20	Artemija
3	C.	Huberta	21	Iłaryona pr.
4	P.	Karola Boromeusza	22	Awerkyja
5	S.	Elżbiety męcz.	23	Jakowa
6	N.	Leonarda wyzn.	24	Arefty
7	P.	Herkulana n.	25	Makaryona
8	W.	4 Koronatów	26	Demetryja
9	Ś.	Teodora męcz.	27	Nestora m.
10	C.	Andrzeja z Awel.	28	Terentya m.
11	P.	Marcina bisk.	29	Anastazyi m.
12	S.	Marcina pap.	30	Zynowija m.
13	N.	Eugen. Stan. Kostki	31	Stachya ap.
14	P.	Sarafina wyz.	1	Kos. i Dam.
15	W.	Leopolda 1 k.	2	Akindyna m.
16	Ś.	Edmunda	3	Akepsyma m.
17	C.	Salomei panny	4	Joannyka prep.
18	P.	Ottona op.	5	Hałaktyona
19	S.	Elżbiety k.	6	Pawła Arch.
20	N.	Feliksa de Wal.	7	Jerona
21	P.	Ofiarow. NPM.	8	Sob. św. Mych.
22	W.	Cecylii panny	9	Onysifora
23	Ś.	Klemensa pap. p.	10	Erasta ap.
24	C.	Jana od Krzyża	11	Myny mucz.
25	P.	Katarzyny p.	12	Joana mył.
26	S.	Konrada męcz.	13	Joana Złot.
27	N.	Waler. i Wirgil.	14	Fyłypa ap.
28	P.	Krescentego	15	Hurya i Sams.
29	W.	Saturnina m.	16	Mafteja ap.
30	Ś.	Andrzeja ap. ☾ o. k.	17	Hryhorya Ne.

Grudzień.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Grudzień.

DNIE		ŚWIĘTA rzymsko-katolickie	ŚWIĘTA grecko-katolickie	
1	C.	Eligiusza bisk.	18	Platona
2	P.	Bibianny p.	19	Awdyja
3	S.	Franciszka Ksaw.	20	Hryhorya
4	**N.**	**Barbary p.**	21	**Wch. Pr. Boharod.**
5	P.	Sabby opata	22	Fyłymona
6	W.	Mikołaja bisk.	23	Amfyłokyja
7	Ś.	Ambrożego † 🌕 n.	24	Ekateryny
8	**C.**	**Niep. Pocz. NPM.**	25	Kłymenta
9	P.	Leokadyi p.	26	Ałyppa prep.
10	S.	NMP. Loret.	27	Jakowa mucz.
11	**N.**	**Damazego pap.**	28	**Stefana m.**
12	P.	Aleks. żołn.	29	Paramona
13	W.	Łucyi i Ottylii	30	Andreja
14	Ś.	Spiryd. bisk. ☽ 1 k.	1	Nauma
15	C.	Fortunata	2	Awakuma
16	P.	Adelajdy ces. †	3	Sofonia prep.
17	S.	Łazarza bisk.	4	Warwary m.
18	**N.**	**Gracyana**	5	**Sawwy oś.**
19	P.	Nemezyusza †	6	**Nykołaja ep.**
20	W.	Teofila męcz.	7	Amwrozya
21	Ś.	Tomasza apost.	8	Patapia
22	C.	Zenona m. 🌑 p.	9	**Zaczat. Bohor.**
23	P.	Wiktoryi p.	10	Myny i Ermob.
24	S.	Adam i Ew. Wig. †	11	Danyiła
25	**N.**	**Boze Narodzenie**	12	**Spirydyona**
26	**P.**	**Szczep. pierw. m.**	13	Ewstratyja
27	W.	Jana ew.	14	Ftyrsa
28	Ś.	Młodzianków	15	Jelewterya
29	C.	Tomasza b. ☾ o. k.	16	Ahhea
30	P.	Dawida kr.	17	Sewastyona
31	S.	Sylwestra	18	Wonyfatya

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

3 (25 Kislev) Poświęcenie świątyni. 18 (Tebet 10). Post: oblężenie Jerozolimy.

Terminarz na rok 1904.

Atram. znaczy:
Czerwony ....
Niebieski ....
Zielony ....
Czarny ....

Tabelka ta służy do oznaczenia wszelkich terminów: płatności czynszu, weksli, stałych zgromadzeń, zebrań towarzyskich i t. p. Wystarcza podkreślić liczbę dnia odpowiednią barwą, atramentem lub ołówkiem, ustaliwszy wprzód która barwa co oznacza, co należy uwidocznić w górnych bocznych tabliczkach.

Ołówek znaczy:
Czerwony ....
Niebieski ....
Zielony ....
Czarny ....

	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
Niedziela . . .	— 3 10 17 24 31	— 7 14 21 28	— 6 13 20 27	— 3 10 17 24	1 8 15 22 29	— 5 12 19 26
Poniedziałek .	— 4 11 18 25 —	1 8 15 22 29	— 7 14 21 28	— 4 11 18 25	2 9 16 23 30	— 6 13 20 27
Wtorek	— 5 12 29 26 —	2 9 16 23 —	1 8 15 22 29	— 5 12 19 26	3 10 17 24 31	— 7 14 21 28
Środa	— 6 13 20 27 —	3 10 17 24 —	2 9 16 23 30	— 6 13 20 27	4 11 18 25 —	1 8 15 22 29
Czwartek . . .	— 7 14 21 28 —	4 11 18 25 —	3 10 17 24 31	— 7 14 21 28	5 12 19 26 —	2 9 16 23 30
Piątek	1 8 15 22 39 —	5 12 29 26 —	4 11 18 25 —	1 8 15 22 29	6 13 20 27 —	3 10 17 24 —
Sobota	2 9 16 23 30 —	6 13 20 27 —	5 12 19 26 —	2 9 16 23 30	7 14 21 28 —	4 11 18 25 —

	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październ.	Listopad	Grudzień
Niedziela . . .	— 3 10 17 24 31	— 7 14 21 28	— 4 11 18 25	— 2 9 16 23 30	— 6 13 20 27	— 4 11 18 25
Poniedziałek .	— 4 11 18 25 —	1 8 15 22 29	— 5 12 19 26	— 3 10 17 24 31	— 7 14 21 28	— 5 12 19 26
Wtorek	— 5 12 19 26 —	2 9 16 23 30	— 6 13 20 27	— 4 11 18 25 —	1 8 15 22 29	— 6 13 20 27
Środa	— 6 13 20 27 —	3 10 17 24 31	— 7 14 21 28	— 5 12 19 26 —	2 9 16 23 30	— 7 14 21 28
Czwartek . . .	— 7 14 21 28 —	4 11 18 25 —	1 8 15 22 29	— 6 13 20 27 —	3 10 17 24 —	1 8 15 22 29
Piątek	1 8 15 22 29 —	5 12 19 26 —	2 9 16 23 30	— 7 14 21 28 —	4 11 18 25 —	2 9 16 23 30
Sobota	2 9 16 23 30 —	6 13 20 27 —	3 10 17 24 —	1 8 15 22 29 —	5 12 19 26 —	3 10 17 24 31

Kalendarz myśliwski dla Galicyi wraz z W. Ks. Krakowskiem.

według §. 33 ust. łowieckiej z 5 marca 1897, Dz. ust. kr. Nr. 71.

Pole □ oznacza czas polowania.
Pole ■ czas ochrony.

Rodzaj zwierzyny	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Jelenie	■	■	■	■	■	■	■				■	■
Kozły (rogacze)			■	■	▌							
Zające		■	■	■	■	■	■	■	■			
Jarząbki		■	■	■	■	■	■	■				
Głuszce i cietrzewie (koguty)					21 ▌	■	■	■				
Kuropatwy	■	■	■	■	■	■	■	▌ 15				■
Bażanty	■	■	■	■	■	■	■	▌ 15				
Przepiórki i dzikie gołębie	■	■	■	■	■	■	■				■	■
Dropie, pardwy				15 ▌	■	■	■					
Ptactwo błotne				15 ▌	■	■						
Ptactwo wodne				15 ▌	■	▌ 15						
Łanie, sarny, cielęta, spiczaki, kury głuszców i cietrzewi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Kalendarz rybacki dla Galicyi wraz z W. Ks. Krakowskiem.

(rozporz. c. k. Namiestnictwa z d. 21 sierpnia 1890 L. 55433. D. u. k. Nr. 38, z d. 31 sierpnia 1893 L. 65635. D. u. k. Nr. 56 i z d. 5 maja 1892 L. 7679. D. u. k. Nr. 43, wydane do §§ 54 i 61 ustawy o rybołowstwie z dnia 31 października 1887. D. u. k. Nr. 38 z r. 1890).

Minimalna miara ryb, mierzy się od początku głowy do końca ogona. Ryb, nie mających minimalnej miary, jakoteż ryb podczas czasów ochrony łapać, sprzedawać lub w domach gościnnych podawać nie wolno.

■ oznacza czas ochrony.

Rodzaj ryby	Stycz.	Luty	Marzec	Kwiec.	Maj	Czerw.	Lipiec	Sierp.	Wrzes.	Paźdz.	Listop.	Grudz.	Minimalna miara w cm.
Brzana					▌	■							25
Brzanka													16
Cyrta					▌	■							20
Czeczuga													30
Czop				■	■								16
Głowacica			▌	■	▌								40
Jaź			▌	■									25
Klonek													20
Leszcz						■	▌						25
Lipień			▌	■	▌								20
Łosoś										■	■	■	30
Pstrąg									▌	■	■	▌	20
Sandacz				■	■								40
Świnka				■	▌								20
Węgorz													40
Wyrozub				■	■								40
Rak samiec	■	■	■							■	■	■	10
Rak samica	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	10

Gatunki ryb obok nie wymienione nie mają prawa ochrony (nie wyznaczono dla nich ani czasu ochrony ani minimalnej miary).

Przepisy pocztowe i telegraficzne.

Listy zwyczajne nie mogą ważyć więcej jak 250 gramów.

Opłata (w monarchii austryacko-węgierskiej do 20 gr. do Niemiec 15 gr.) 10 h., nad 20 gr. do 250 gr. 20 h.

Za granicę, do innych państw 25 h. za 15 gr.

Za listy miejscowe (loco) płaci się do 20 gr. 6 h., od 20 gr. do 250 gr. 12 h. za listy urzędowe uiszcza adresat pojedynczą opłatę t. j. 10 h. a względnie 20 h.

Listy poste restante są przechowywane w urzędach pocztowych przez 2 miesiące.

Karty korespondencyjne po 5 h. do wszystkich krajów monarchii austryackiej i do Niemiec, 10 h. do wszystkich innych krajów europejskich. Można używać kart korespondencyjnych własnego wyrobu, jednakże muszą być tej samej wielkości i na takiej samej grubości papierze jak urzędowe i muszą mieć napis w języku niemieckim: »Correspondenzkarte«, obok którego może być napis w języku krajowym.

Listy polecone. Listy zwyczajne i karty korespondencyjne mogą być polecone za opłatą 25 h., — nadawca otrzymuje recepis. Jeżeli list zaginął, nadawca ma prawo żądać wynagrodzenia 50 kor. Listy polecone wysyłane w kraju można reklamować w przeciągu 6 miesięcy, na listy przesyłane za granicę służy prawo reklamowania rok cały od dnia nadania listu.

Listy polecone z pobraniem pocztowem można wysyłać do całej austro-węgierskiej monarchii, do Belgii, Francyi, Holandyi, Luxemburgu, Niemiec, Szwajcaryi, Szwecyi, Tunisu i Włoch do 1000 kor. = 800 marek = 1000 franków. Opłata jak zwykłe listy polecone: na stronie adresowej w górze wyraźnie napisać »za pobraniem« *(Nachnahme* lub *Remboursement)* a pobrać się mająca kwota winna być podana w walucie kraju przeznaczenia (oddawczego) tak w liczbach jak i w słowach, a poniżej tego dokładny adres nadawcy. Pobrana należytość zostanie przesłana nadawcy przekazem pocztowym, po odtrąceniu należytości za przekaz, odpowiednio do wysokości kwoty i należytości za pobranie w kwocie 10 h. Za recepis zwrotny opłaca się 25 hal.

Druki. Należytość wynosi do wszystkich miejscowości państwa austryackiego i do Niemiec do 50 gr. 3 h., do 100 gr. 5. h., do 250 gr. 10 h., do 500 gr. 20 h., do 1000 gr. 30 h. Pod opaską nie wolno posyłać listów. Do innych krajów za każde 50 gr. 5 h.

Próby towarów muszą być opłacone i nie mogą więcej ważyć jak 350 gramów. Opłata wynosi do wszystkich krajów monarchii austryackiej i do Niemiec do: 250 gramów 10 h., do 350 gramów 20 hal. Do innych krajów za każde 50 gr. 5 h.

Opłata za pakiety bez podanej wartości, (odszkodowanie do 3 kg. 15 kor., 3—5 kg. — 25 kor., dalszy kg. 5 kor.).

I. do wagi 5 kg.: *a)* na odległość 10 mil geogr. 30 h. *b)* na dalszą odległość 60 h.

II. nad 5 kg.: *a)* za pierwsze 5 kg. jak powyżej pod I. *b)*, za każdy dalszy kilogram lub część tegoż do 10 mil geogr. strefa I. 6 h., od 10—20 mil geogr. strefa 2. 12 h., od 20—50 mil geogr. strefa 3. 24 h., od 50—100 mil geogr. strefa 4. 36 h., od 100—150 mil geogr. strefa 5. 48 h., od 150 mil geogr. strefa 6. 60 h.

Za przesyłki w stosunku do swej wagi przestrzenne lub niekształtne (Sperrgut) ściąga się opłatę o połowę wyższą.

Pakiety i listy pieniężne z podaną wartością:

a) porto:

1. Za listy bez różnicy wagi do 10 mil geogr. 24 h., dalej 18 hal.

2. Za pakiety taka sama, jak i bez podania wartości.

Assekuracye: do 100 kor. 6 h., dalej za każde 300 kor. lub część tychże 6 h., najmniej 12 h.

Za pobraniem należytości wolno wysyłać przesyłki do wszystkich poczt w monarchii austryacko-węgierskiej aż do wysokości 1000 kor.

Listy z pieniędzmi. Pieniądze papierowe, banknoty i gotówka (złoto, srebro i miedź), tudzież papiery wartościowe aż do wagi 250 gramów, mają być przesyłane w formie listu i zapieczętowane pięcioma, a jeżeli się używa urzędowej koperty, dwoma pieczęciami.

Opakowanie innych przesyłek, niż wyżej wymienionych, powinno być mocne i pewne. Przedmioty mniejszej wartości, którym przyciśnięcie nie szkodzi i ani tłuszczu, ani wilgoci z siebie nie wydzielają, mogą być zawinięte w mocny i gruby papier i obwiązane sznurkiem. Przedmioty większej wartości, a szczególnie takie, które mogą być uszkodzone przez wilgoć, tarcie lub przyciśnięcie (n. p. jedwabie), winny być zapakowane w ceratę, pudełka kartonowe lub skrzyneczki, stosownie do wartości i odległości, jaką mają przebyć. Dziczyznę, jeżeli już nie krwawi, można pojedynczo posyłać (n. p. jedna sarna, zając) także bez opakowania. Flaszki z płynami należy opakować w skrzynkach. Beczułki z płynami powinny być mocne i dobrze obite obręczkami. Owoce można także posyłać w mocnych koszykach. Pieczątki na przesyłkach winny być dokładnie odbite i tak umieszczone, aby bez popsucia pieczątki wewnątrz dostać się nie było można. Skrzynki zabite gwoździami, kufry zamknięte, jeżeli wartość nie jest podana, mogą być bez opieczętowania nadane. Niedostatecznie opakowane przesyłki mogą być przez urząd pocztowy tylko wtedy przyjęte, jeżeli nadawca na adresie napisze: »na własną odpowiedzialność« (auf eigene Gefahr), co także na recepisie nadawczym urząd pocztowy uwidocznia. Jeżeli przesyłka taka uszkodzoną zostanie, nadawca nie może się o odszkodowanie upominać. Adres na przesyłce jako też na liście pocztowym winien być dokładnym.

Jeżeli przesyłka zawiera pieniądze papierowe, banknoty lub monetę brzęczącą, ma być na adresie rzeczywista wartość podaną tak w ogólnej sumie jakoteż pojedyncze rodzaje pieniędzy, n. p.: wartość: 5.450 K. 5 h., t. j. $^5/_{1000}$ $^4/_{100}$ $^5/_{10}$ i 5 h. Przy posyłce papierów wartościowych n. p. obligacyi, ma być wymieniona na adresie ilość sztuk i wartość tychże. Jeżeli przesyłka zawiera pieniądze obce, n. p. ruble, to należy wyszczególnić i rodzaj i ilość tychże, i wartość ogólną podać w monecie austryackiej.

Jeżeli przesyłka zawiera oprócz podanych jeszcze inne pieniądze, poczta za nie nie bierze odpowiedzialności. Do każdej przesyłki musi być dołączony adres przesyłkowy, opatrzony marką stemplową na 10 h., który nabywa się po 12 h. za sztukę. Do przesylek za granicę mają być dołączone deklaracye cłowe i deklaracye statystyczne. Przesyłki można także posyłać jako pilne (per expres); w takim razie ma to być na adresie przesyłkowym uwidocznione.

Należytość za przesyłki pilne (per expres), (listy pieniężne, listy wartościowe, pakiety i przesyłki za pobraniem pocztowem) uiszcza się przez przylepienie marek listowych w kwocie 30 h., a 50 h. za pakiety.

Do Rosyi europejskiej można wysyłać pakiety pocztowe *(Postpakete, colis postaux)* do wagi 5 klgr. i do wartości 50.000 franków. Opakowanie takie same jak w kraju, a opłata 1 kor. 75 h. bez różnicy oddalenia, zaś od wartości opłata asekuracyjna za każde 300 franków 10 h. Takie pakiety muszą być przy nadaniu opłacone, a co do rozmiarów nie mogą w zasadzie przekraczać 60 cm. w którymkolwiek kierunku.

Opłata od wartości deklarowanej wynosi w Austro-Węgrzech: do 100 kor. 6 h., zaś nad 100 do 300 kor. 12 h., a za każde dalsze 300 kor. 6 h. więcej. Do Niemiec ta sama opłata, lecz najmniej 12 h. Do innych krajów według specyalnych taryf.

Przekazy pieniężne (Postanweisungen). Opłata wynosi: do 20 kor. 10 h., nad 20 kor. do 100 kor. 20 h., nad 100 kor. do 300 kor. 40 h., nad 300 kor. do 600 kor. 60 h., nad 600 kor. do 1000 kor. 1 kor.

Przekazy pieniężne telegraficzne. Opłata jest ta sama co przy przekazach zwykłych, z dodatkiem opłaty za telegram i za doręczenie telegramu adresatowi w miejscu 30 h., za każde zaś $7\frac{1}{2}$ klm. lub część tychże 1 kor., które ma adresat posłańcowi dopłacić.

Przekazy pieniężne za granicę mogą być przesyłane:

Do Niemiec (1000 kor.) do 40 kor. — 20 h.; każde dalsze 40 kor. — 10 h., Anglii, Stanów Zjednocz. (500 kor.) Za każde 25 kor. — 25 h.

Do wszystkich innych państw konwencyi przekazowej (500 wzgl. 1000 kor.) od 25 do 100 kor. po 25 h. za 25 kor.; od 100—1000 po 25 h. za 50 kor.

Przekazy pieniężne telegraficzne za granicę mogą być przesyłane do wysokości 250 kor. do Anglii i Irlandyi; do 500 kor. do Bulgaryi, Danii i Rumunii, zaś do wysokości 1000 kor. do Belgii. Egiptu (tylko do Aleksandryi, Kairo, Ismailia, Port Said i Suez), Francyi, Holandyi, Japonii, Luxemburgu, Niemiec, Czarnogóry, Norwegii, Portugalii, Serbii, Szwajcaryi, Szwecyi i Tunisu. Opłata wynosi tyle, ile zwykły przekaz kosztuje, z dodatkiem należytości za telegram.

Telegramy.

D. = Pilno. Depesza tak oznaczona ma pierwszeństwo przed innemi prywatnemi; należytość takiej depeszy wynosi potrójną taksę zwykłej depeszy.

Rp. Odpowiedź zapłacona. Należytość zapłaconej odpowiedzi zależy od żądanej ilości słów: — jeżeli się żąda 10 słów, ozna-

cza się pojedynczo *Rp.* — jeżeli mniej lub więcej, w takim razie trzeba oznaczyć n. p. *Rp. 4 słów*, albo *Rp. 15 słów* i t. d. Należytość za odpowiedź można zapłacić najwyżej za 30 słów. Przekaz na zapłaconą odpowiedź jest ważny na sześć tygodni, i może być użyty do dowolnej miejscowości (stacyi telegraficznej).

Rpd. Odpowiedź zapłacona. Należytość taka, jak przy depeszy pilnej.

TC. Depesza kolacyonowana. Należytość wynosi czwartą część taksy nadanej depeszy.

CR. Potwierdzenie wreczenia. Należytość równa jest taksie za depeszę z 10 wyrazów.

PR. Dalsze przesłanie depeszy pocztą jako list polecony. Nadawca depeszy, prócz należytości za depeszę, ma zapłacić 35 h. jako należytość za list polecony.

XP. Posłaniec zapłacony. Należytość za posłańca w Austro-Węgrzech, Bośnii i Hercogowinie według taryf miejscowych.

Depesze tej samej treści z więcej adresami, a te mogą być:

a) do więcej adresatów w tej samej miejscowości;

b) do jednego adresata w tej samej miejscowości, lecz w różnych mieszkaniach.

W jednym i w drugim razie — prócz należytości za ilość wszystkich słów — dopłaca się o jeden raz mniej po 50 h., jak jest adresów, n. p. jeżeli depesza ma cztery adresy, to prócz należytości za ilość słów, dopłaca się trzy razy po 50 h. Po takiem oznaczeniu następuje adres, treść depeszy i podpis.

Oddający depeszę ma prawo żądać legalizacyi swego podpisu ze strony urzędu telegraficznego: jeżli takowemu nie jest znany, to musi się wprzód wylegitymować.

Umieszczenie podpisów jest dowolnem, może być depesza i bez podpisu.

Depesza bez treści jest dozwoloną. Taka depesza musi mieć najmniej dwa słowa w adresie.

Na żądanie nadawcy depeszy, można otrzymać recepis za opłatą 10 h.

Napisana w powyższy sposób depesza zostaje obliczona na wyrazy i ilość tychże daje podstawę do opłaty należytości.

W depeszach europejskich piętnaście, a w pozaeuropejskich dziesięć liter stanowi jedno słowo.

Taryfa opłaty za telegramy do krajów europejskich.

W Austryi i do Niemiec za każde słowo 6 h., nie mniej jak 60 hal.

Do innych krajów taksa ogólna 60 h. i od słowa do: Belgii 21 h.; Danii 21 h.; do Francyi, Korsyki i Monaco 16 h.; do Anglii 26 h.: Włoch 16 h.; Czarnogóry 9 h.; Niederlandów (Holandyi) 19 h.: Norwegii 32 h.: Portugalii 33 h.; Rumunii 9 h.: Rosyi europejskiej 21 h.; Szwecyi 24 h.; Szwajcaryi 9 h.; Serbii 9 h.; Hiszpanii 28 h.; Turcyi europ. 28 h.; Turcyi azyatyckiej i do wysp 40 h.

NALEŻYTOŚCI STEMPLOWE

Skala I.

Weksle i assygnaty

	do K	K. h.
nad	150	—·10
150	300	—·20
300	600	—·40
600	900	—·60
900	1.200	—·80
1.200	1.500	1·00
1.500	1.800	1·20
1.800	2.100	1·40
2.100	2.400	1·60
2.400	2.700	1·80
2.700	3.000	2·—
3.000	6.000	4·—
6.000	9.000	6·—
9.000	12.000	8·—
12.000	15.000	10·—
15.000	18.000	12·—
18.000	21.000	14·—
21.000	24.000	16·—
24.000	27.000	18·—

i t. d., za każde następne 3.000 K o 2 K więcej, licząc kwoty niżej 3.000 za pełne.

Skala II.

Kwity i dokumenty w sprawach prawnych.

	do K.	K. h.
nad	40	—·14
40	80	—·26
80	120	—·38
120	200	—·64
200	400	1·26
400	600	1·88
600	800	2·50
800	1.600	5·—
1.600	2.400	7·50
2.400	3.200	10·—
3.200	4.000	12·50
4.000	4.800	15·—
4.800	6.400	20·—
6.400	8.000	25·—
8.000	9.600	30·—
9.600	11.200	35·—
11.200	12.800	40·—
12.800	14.400	45·—
14.400	16.000	50·—

Nad 16.000 K każde 800 K o 2 K 50 h. więcej, licząc kwoty niżej 800 K za pełne.

Skala III.

Ugody pożyczkowe kontrakty służbowe i kwity za wygrane loteryjne.

	do K.	K. h.
nad	20	—·14
20	40	—·26
40	60	—·38
60	100	—·64
100	200	1·26
200	300	1·88
300	400	2·50
400	800	5·—
800	1.200	7·50
1.200	1.600	10·—
1.600	2.000	12·50
2.000	2.400	15·—
2.400	3.200	20·—
3.200	4.000	25·—
4.000	4.800	30·—
4.800	5.600	35·—
5.600	6.400	40·—
6.400	7.200	45·—
7.200	8.000	50·—

Nad 8.000 K każde dalsze 400 K o 2 K 50 h. więcej, licząc kwoty niżej 400 K za pełne.

DODATEK

do

Dublańskiego Kalendarza Rolniczego

na r. 1904.

„Kontrola najmu“.

Używać jej należy zamiast pomieszczonej w kalendarzu str. 174—185.

Kontrola

Nazwiska robotników należy

Nazwisko robotnika	S	t	y-										
	2 S	4 P	5 W	6 Ś	7 C	8 P	9 S	11 P	12 W	13 Ś	14 C	15 P	16 S

najmu.

przenieść na następną stronę.

czeń												Luty																	
18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Nazwisko robotnika	Luty							Marzec																
	22 P	23 W	24 Ś	25 C	26 P	27 S	28 P	1 W	2 Ś	3 C	4 P	5 S	7 P	8 W	9 Ś	10 C	11 P	12 S	14 P	15 W	16 Ś	17 C	18 P	19 S

Marzec										Kwiecień																			
21	22	23	24	25	26	18	19	30	31	1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23
P	W	S	C	P	C	P	W	Ś	C	P	S	P	W	S	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Nazwisko robotnika	Kwiecień						Maj																	
	25 P	26 W	27 Ś	28 C	29 P	30 S	2 P	3 W	4 Ś	5 C	6 P	7 S	9 P	10 W	11 Ś	12 C	13 P	14 S	16 P	17 W	18 Ś	19 C	20 P	21 S

Maj								Czerwiec																					
23	24	25	26	27	28	30	31	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25
P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Nazwisko robotnika	Czerw.				Lipiec																			
	27	28	29	30	1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23
	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Lipiec						Sierpień																							
25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S
25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Nazwisko robotnika	S.			Wrzesień																				
	29	30	31	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24
	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Wrz.					Październik																								
26	27	28	29	30	1	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29
P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	S	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Nazwisko robotnika	P.	Listopad																						
	31	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26
	P	W	S	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

L.			Grudzień																										
28	29	30	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31
P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Powierzchnia niw, pól itp.

Nazwa folwarku	Nazwa pola, niwy, łąki itp.	Rola	Łąka	Pastwisko	Las
		morgi i sążnie			

majątku ....

Stawy wody		Drogi i pod zabudowaniami		Ogrody, sady		Nieużytki		Ogółem		Uwagi
morgi i sążnie										

Powierzchnia niw.

Notatnik kalendarzowy.

Skrócenia: W = Wschód
Z = Zachód
⊙ = Słońce
☽ = Księżyc.

Liczba ułamkowa oznacza, ile dni od początku, a ile do końca roku.

Styczeń.

366/1. W 8.11 ⊙ Z 3.56 **PIĄTEK 1.** W 2.46 w. ☽ Z 5.52 r.

Styczeń.

365 2. W 8.11 ⊙ Z. 3.57 **SOBOTA 2.** W 3.43 w. ☽ Z 6.50 r.

Styczeń.

364/3. W 8.10 ⊙ Z 3.58 **NIEDZIELA 3.** W. 4.51 w. ☽ Z. 7.48 r.

Pełnia 6.41 r.

363/4. W 8.10 ⊙ Z 3.59 **PONIEDZ. 4.** W 6.06 w. ☽ Z 8.38 r.

362/5. W 8.10 ⊙ Z 4.00 **WTOREK 5.** W 7.25 w. ☽ Z 9.19 r.

Styczeń.

361/6. W 8.10 ⊙ Z 4.02 **ŚRODA 6.** W 8.15 w. ☽ Z 9.54 r.

360/7. W 8.09 ⊙ Z 4.03 **CZWARTEK 7.** W 10.04 w. ☽ Z 10.24 r.

359/8. W 8.09 ⊙ Z 4.04 **PIĄTEK 8.** W 11.21 w. ☽ Z 10.52 r.

Styczeń.

858/9. W 8.08 ☉ Z 4.06 **SOBOTA 9** W —.— ☽ Z 11.19 r.

Ostatnia kwadra 10.04 w.

Styczeń.

357/10. W 8.08 ☉ Z 4.07 **NIEDZIELA** 10. W 12.36 r. ☽ Z 11.46 r.

356/11. W 8.07 ☉ Z 4.08 **PONIEDZ.** 11. W 1.48 r. ☽ Z 0.14 w.

355/12. W 8.06 ☉ Z 4.10 **WTOREK** 12. W 2.57 r. ☽ Z 0.46 w.

Styczeń.

354/13. W 8.06 ⊙ Z 4.11 **ŚRODA 13.** W 4.02 r. ☽ Z 1.22 w.

353/14. W 8.05 ⊙ Z 4.13 **CZWARTEK 14.** W 5.02 r. ☽ Z 2.03 w.

352/15. W 8.04 ⊙ Z 4.14 **PIĄTEK 15.** W 5.56 r. ☽ Z 2.50 w.

Styczeń.

351/16. W 8.03 ⊙ Z 4.16 **SOBOTA 16.** W 6.44 r. ☽ Z 3.42 w.

Styczeń.

350/17. W 8.02 ⊙ Z 4.18 **NIEDZIELA 17.** W 7.25 r. ☽ Z 4.38 w.
Nów 4.40 w.

349/18. W 8.01 ⊙ Z 4,19 **PONIEDZ. 18.** W 8.00 r. ☾ Z 5.38 w.

348/19. W 8.00 ⊙ Z 4.21 **WTOREK 19.** W 8.30 r. ☽ Z 6.39 w.

Styczeń.

345/20. W 7.59 ⊙ Z 4.23 **ŚRODA 20.** W 8.56 r. ☽ Z 7.42 w.

346/21. W 7.58 ⊙ Z 4.24 **CZWARTEK 21.** W 9.20 r. ☽ Z 8.45 w.

345/22. W 7.57 ⊙ Z 4.26 **PIĄTEK 22.** W 9.43 r. ☽ Z 9.49 w.

Styczeń.

344/28. W 7.56 ☉ Z 4.28 **SOBOTA 28.** W 10.05 r. ☽ Z 10.53 w.

Styczeń.

343 24. W 7.55 ⊙ Z 4.30 **NIEDZIELA 24.** W 10.30 r. ☽ Z 11.58 w.

342 25. W 7.53 ⊙ Z 4.32 **PONIEDZ. 25.** W 10.53 r. ☽ Z —.—

Pierwsza kwadra 9.35 w.

341 26. W 7.52 ⊙ Z 4.33 **WTOREK 26.** W 11.21 r. ☽ Z 1.05 r.

Styczeń.

340 27. W 7.51 ⊙ Z 4.35 **ŚRODA** 27. W 11.54 r. ☽ Z 2.13 r.

339/28. W 7.39 ⊙ Z 4.37 **CZWARTEK** 28. W 12.35 w. ☽ 8.21 r.

338/29. W 7.48 ⊙ Z 4.39 **PIĄTEK** 29. W 1.25 w. ☽ Z 4.27 r.

Styczeń.

337 30. W 7.46 ⊙ Z 4.41 **SOBOTA 30.** W 2.25 w. ☽ Z 5.29 r.

Styczeń.

336/31. W 7.45 ☉ Z 4.18 **NIEDZIELA 31.** W 3.35 w. ☽ Z 6.24 r.

Luty.

335/32. W 7.43 ☉ Z 4.44 **PONIEDZ. 1.** W 4.54 w. ☽ Z 7.10 r.

Pełnia 5.27 w.

334/33. W 7.42 ☉ Z 4.46 **WTOREK 2.** W 6.16 w. ☉ Z 7.49 r.

Luty.

333 34. W 7.40 ⊙ Z 4.48 **ŚRODA 3.** W 7.38 w. ☽ Z 8.23 r.

332 35. W 7.38 ⊙ Z 4.50 **CZWARTEK 4.** W 8.59 w. ☽ Z 8.53 r.

331 36. W 7.37 ⊙ Z 4.52 **PIĄTEK 5.** W 10.18 w. ☽ Z 9.21 r.

Luty.

330 37. W 7.35 ☉ Z 4.54 **SOBOTA** 6. W 11.33 w. ☽ Z 9.49 r.

Luty.

329 38. W 7.33 ⊙ Z 4.56 **NIEDZIELA 7.** W — . — ☽ Z 10.18 r.

328 39. W 7.32 ⊙ Z 4.58 **PONIEDZ. 8.** W 12.45 r. ☽ Z 10.49 r.

Ostatnia kwadra 10.50 r.

327 40. W 7.30 ⊙ Z 5.00 **WTOREK 9.** W 1.53 r. ☽ Z 11.24 r.

Luty.

326/41. W 7.28 ⊙ Z 5.02 **ŚRODA 10.** W 2.56 r. ☽ Z 12.03 w.

325/42. W 7.26 ⊙ Z 5.03 **CZWARTEK 11.** W 3.52 r. ☽ Z 12.48 w.

324/43. W 7.24 ⊙ Z 5.05 **PIĄTEK 12.** W 4.41 r. ☽ Z 1.38 w.

Luty.

323 44. W 7.22 ⊙ Z 5.07 **SOBOTA 13.** W 5.24 r. ☽ Z 2.32 w.

Luty.

322 45. W 7.20 ⊙ Z 5.09 **NIEDZIELA 14.** W 6.01 r. ☽ Z 3.30 w.

321 46. W 7.18 ⊙ Z 5.11 **PONIEDZ. 15.** W 6.33 r. ☽ Z 4.31 w.

320/47. W 7.16 ⊙ Z 5.13 **WTOREK 16.** W 7.01 r. ☽ Z 5.33 w.

Nów 11.58 r.

Luty.

319 48. W 7.11 ⊙ Z 5.15 **ŚRODA 17.** W 7.26 r. ☽ Z 6.36 w.

318/49. W 7.12 ⊙ Z 5.17 **CZWARTEK 18.** W 7.49 r. ☽ Z 7.40 w.

317/50. W 7.10 ⊙ Z 5.19 **PIĄTEK 19.** W 8.11 r. ☽ Z 8.44 w.

Luty.

316 51. W 7.08 ☉ Z 5.21 **SOBOTA 20.** W 8.34 r. ☽ Z. 9.48 w.

Luty.

315/52. W 7.06 ⊙ Z 5.23 **NIEDZIELA 21.** W 8.58 r. ☽ Z 10.54 w.

314/53. W 7.04 ⊙ Z 5.24 **PONIEDZ. 22.** W 9.24 r. ☽ Z 12.00 w.

313/54. W 7.03 ⊙ Z 5.26 **WTOREK 23.** W 9.55 r. ☽ Z —.—

Luty.

312 55. W 7.00 ☉ Z 5.28 **ŚRODA 21.** W 10.31 r. ☽ Z 1.06 r.

Pierwsza kwadra 12.02 w.

311 56. W 6.58 ☉ Z 5.30 **CZWARTEK 25.** W 11.15 r. ☽ Z 2.11 r.

310 57. W 6.55 ☽ Z 5.32 **PIĄTEK 26.** W 12.09 w. ☽ Z 3.12 r.

Luty.

309 58. W 6.53 ⊙ Z 5.34 **SOBOTA 27** W 1.11 w. ☽ Z 4.08 r.

Luty.

308/59. W 6.51 ☉ Z 5.36 **NIEDZIELA 28.** W 2.23 w. ☽ Z 1.57 r.

307/60. W 6.49 ☉ Z 5.37 **PONIEDZ. 29.** W 3.42 w. ☽ Z 5.40 r.

Marzec.

306/61. W 6.47 ☉ Z 5.39 **WTOREK 1.** W 5.04 w. ☽ Z 6.06 r.

Marzec.

305 62. W 6.44 ⊙ Z 5.41 **ŚRODA 2.** W 6.27 w. ☽ Z 6.49 r.

Pełnia 3.42 r.

304 63. W 6.42 ⊙ Z 5.43 **CZWARTEK 3.** W 7.49 w. ☽ Z 7.19 r.

303 64. W 6.40 ⊙ Z 5.45 **PIĄTEK 4.** W 9.09 w. ☽ Z 7.48 r.

Marzec.

302 65. W 6.38 ⊙ Z 5.[illegible] — **SOBOTA 5.** W 10.25 w. ☽ Z 8.17 r.

Marzec.

301 66. W 6.35 ⊙ Z 5.49 **NIEDZIELA 6.** W 11.37 w. ☽ Z 8.48 r.

300,67. W 6.33 ⊙ Z 5.50 **PONIEDZ. 7.** W —.— ☽ Z 9.22 r.

299,68. W 6.31 ⊙ Z 5.52 **WTOREK 8.** W 12.44 r. ☽ Z 10.01 r.

Marzec.

298/69. W 6.28 ☉ Z 5.54 **ŚRODA 9.** W 1.44 r. ☽ Z 10.45 r.

Ostatnia kwadra 1.54 r.

297/70. W 6.26 ☉ Z 5.56 **CZWARTEK 10.** W 2.37 r. ☽ Z 11.34 r.

296/71. W 6.24 ☉ Z 5.58 **PIĄTEK 11.** W 3.23 r. ☽ Z 12.27 w.

Marzec.

295 72. W 6.22 ⊙ Z 5.59 **SOBOTA 12.** W 4.02 r. ☽ Z 1.21 w.

Marzec.

294/73. W 6.19 ⊙ Z 6.01 **NIEDZIELA 13.** W 4.35 r ☽ Z 2.23 w.

293/74. W 6.17 ⊙ Z 6.03 **PONIEDZ. 14.** W 5.04 r. ☽ Z 3.25 w.

292/75. W 6.15 ⊙ Z 6.05 **WTOREK 15.** W 5.30 r. ☽ Z 4.28 w.

Marzec.

291/76. W 6.12 ☉ Z 6.07 **ŚRODA 16.** W 5.54 r. ☽ Z 5.31 w.

290/77. W 6.10 ☉ Z 6.08 **CZWARTEK 17.** W 6.16 r. ☽ Z 6.35 w.

Nów 6.33 r.

289/78. W 6.08 ☉ Z 6.10 **PIĄTEK 18.** W 6.39 r. ☽ Z 7.40 w.

Marzec.

288 79. W 6.05 ⊙ Z 6.12 **SOBOTA 19.** W 7.03 r. ☽ Z 8.16 w.

Marzec.

287 80. W 6.03 ⊙ Z 6.14 **NIEDZIELA 20.** W 7.29 r. ☽ Z 9.52 w.

286 81. W 6.00 ⊙ Z 6.15 **PONIEDZ. 21.** W 7.58 r. ☽ Z 10.58 w.

285 82. W 5.58 ⊙ Z 6.17 **WTOREK 22.** W 8.32 r. ☽ Z —.—

Marzec.

284/83. W 5.56 ☉ Z 6.19 **ŚRODA 23.** W 9.12 r. ☽ Z 12.02 r.

283/84. W 5.53 ☉ Z 6.21 **CZWARTEK 24.** W 10.00 r. ☽ Z 1.04 r.

Pierwsza kwadra 10.30 w.

282/85. W 5.51 ☉ Z 6.22 **PIĄTEK 25.** W 11.58 r. ☽ Z 2.01 r.

Marzec.

281/86. W 5.49 ☉ Z 6.23 **SOBOTA 26.** W 12.04 w. ☽ Z 2.50 r.

Marzec.

280/87. W 5.46 ⊙ Z 6.26 **NIEDZIELA** 27. W 1.17 w. ☽ Z 3.33 r.

279/88. W 5.44 ⊙ Z 6.28 **PONIEDZ.** 28. W 2.35 w. ☽ Z 4.11 r.

278/89. W 5.42 ⊙ Z 6.29 **WTOREK** 29. W 3.56 w. ☽ Z 4.44 r.

Marzec.

277/90. W 5.39 ⊙ Z 6.31 **ŚRODA 30.** W 5.17 w. ☽ Z 5.15 r.

276/91. W 5.37 ⊙ Z 6.33 **CZWARTEK 31.** W 6.38 w. ☽ Z 5.44 r.
Pełnia 1.38 w.

Kwiecień.

275/92. W 5.34 ⊙ Z 6.35 **PIĄTEK 1.** W 7.58 w. ☽ Z 6.13 r.

Kwiecień.

274/93. W 5.32 ⊙ Z 6.36 **SOBOTA 2.** W 9.14 w. ☽ Z 6.44 r.

Kwiecień.

273 94. W 5.30 ⊙ Z 6.38 **NIEDZIELA 3.** W 10.26 w. ☽ Z 7.18 r.

272 95. W 5.27 ⊙ Z 6.40 **PONIEDZ. 4.** W 11.31 w. ☽ Z 7.55 r.

271 96. W 5.25 ⊙ Z 6.42 **WTOREK 5.** W —.— ☽ Z 8.38 r.

Kwiecień.

270/97. W 5.23 ⊙ Z 6.43 **ŚRODA 6.** W 12.29 r. ☽ Z 9.26 r.

269/98. W 5.21 ⊙ Z 6.45 **CZWARTEK 7.** W 1.18 r. ☽ Z 10.18 r.

Ostatnia kwadra 6.47 w.

268/99. W 5.18 ⊙ Z 6.47 **PIĄTEK 8.** W 2.00 r. ☽ Z 11.14 r.

Kwiecień.

267/100 W 5.16 ⊙ Z 6.48 **SOBOTA 9.** W 2.36 r. ☽ Z 12.14 w.

Kwiecień.

266/101. W 5.14 ⊙ Z 6.50 **NIEDZIELA 10.** W 3.07 r. ☽ Z 1.15 w.

265/102. W 5.11 ⊙ Z 6.52 **PONIEDZ. 11.** W 3.34 r. ☽ Z 2.17 w.

264/103. W 5.09 ⊙ Z 6.54 **WTOREK 12.** W 3.58 r. ☽ Z 3.20 w.

Kwiecień.

263 104. W 5.07 ⊙ Z 6.55 **ŚRODA 13.** W 4.21 r. ☽ Z 4.24 w.

262 105. W 5.05 ⊙ Z 6.57 **CZWARTEK 14.** W 4.43 r. ☽ Z 5.30 w.

261 106. W 5.02 ⊙ Z 6.59 **PIĄTEK 15.** W 5.07 r. ☽ Z 6.36 w.

Nów 10.47 w.

Kwiecień.

260 107. W 5.00 ⊙ Z 7.01 **SOBOTA 16.** W 5.32 r. ☽ Z 7.43 w.

Kwiecień.

259 108. W 4.58 ⊙ Z 7.02 **NIEDZIELA 17.** W 6.00 r. ☽ Z 8.50 w.

258 109. W 4.56 ⊙ Z 7.04 **PONIEDZ. 18.** W 6.32 r. ☽ Z 9.56 w.

257 110. W 4.54 ⊙ Z 7.06 **WTOREK 19.** W 7.11 r. ☽ Z 10.59 w.

Kwiecień.

256 111. W 4.51 ⊙ Z 7.08 **ŚRODA 20.** W 7.57 r. ☽ Z 11.57 w.

255 112. W 4.49 ⊙ Z 7.09 **CZWARTEK 21.** W 8.51 r. ☽ Z —.—

254 113. W 4.47 ⊙ Z 7.11 **PIĄTEK 22.** W 9.54 r. ☽ Z 12.48 r.

Kwiecień.

253 114. W 4.45 ⊙ Z 7.13 **SOBOTA 23.** W 11.03 r. ☽ Z 1.33 r.
Pierwsza kwadra 5.48 r.

Kwiecień.

252/115. W 4.43 ⊙ Z 7.15 **NIEDZIELA 24.** W 12.18 w. ☽ Z 2.11 r.

251/116. W 4.41 ⊙ Z 7.16 **PONIEDZ. 25.** W 1.36 w. ☽ Z 2.45 r.

250/117. W 4.39 ⊙ Z 7.18 **WTOREK 26.** W 2.54 w. ☽ Z 3.15 r.

Kwiecień.

249/118. W 4.37 ☉ Z 7.20 **ŚRODA 27.** W 4.13 w. ☽ Z 3.43 r.

248/119. W 4.35 ☉ Z 7.21 **CZWARTEK 28.** W 5.31 w. ☽ Z 4.11 r.

247/120. W 4.33 ☉ Z 7.23 **PIĄTEK 29.** W 6.49 w. ☽ Z 4.40 r.

Pełnia 11.30 w.

Kwiecień.

246/121. W 4.31 ⊙ Z 7.25 **SOBOTA 30.** W 8.04 w. ☽ Z 5.12 r.

Maj.

245 122. W 4.29 ⊙ Z 7.27 **NIEDZIELA 1.** W 9.13 w. ☽ Z 5.46 r.

244 123. W 4.27 ⊙ Z 7.28 **PONIEDZ. 2.** W 10.15 w. ☽ Z 6.28 r.

243 124. W 4.25 ⊙ Z 7.30 **WTOREK 3.** W 11.10 w. ☽ Z 7.14 r.

Maj.

242/125. W 4.23 ⊙ Z 7.32 **ŚRODA 4.** W 11.56 w. ☽ Z 8.06 r.

241/126. W 4.21 ⊙ Z 7.33 **CZWARTEK 5.** W —.— ☽ Z 9.02 r.

240/127. W 4.19 ⊙ Z 7.35 **PIĄTEK 6.** W. 12.35 r. ☽ Z 10.01 r.

Maj.

238 128. W 4.17 ☉ Z 7.37 **SOBOTA 7.** W 1.08 r. ☽ Z 11.02 r.

Ostatnia kwadra 12.44 w.

Maj.

238/129. W 4.15 ☉ Z 7.38 **NIEDZIELA 8.** W 1.36 r. ☽ Z 12.04 w.

237/130. W 4.14 ☉ Z 7.40 **PONIEDZ. 9.** W 2.01 r. ☽ Z 1.07 w.

236/131. W 4.12 ☉ Z 7.42 **WTOREK 10.** W 2.25 r. ☽ Z 2.11 w.

Maj.

235 132. W 4.10 ☉ Z 7.43 **ŚRODA 11.** W 2.17 r. ☽ Z 3.15 w.

234 133. W 4.08 ☉ Z 7.45 **CZWARTEK 12.** W 3.10 r. ☽ Z 4.21 w.

233 134. W 4.07 ☉ Z 7.46 **PIĄTEK 13.** W 3.34 r. ☽ Z 5.28 w.

Maj.

232/135. W 4.05 ☉ Z 7.48 **SOBOTA 14.** W 4.01 r. ☽ Z 6.36 w.

Maj.

231/136. W 4.04 ☉ Z 7.50 **NIEDZIELA 15.** W 4.32 r. ☽ Z 7.45 w.
Nów 11.52 r.

230/137. W 4.02 ☉ Z 7.51 **PONIEDZ. 16.** W 5.08 r. ☽ Z 8.51 w.

229/138. W 4.01 ☉ Z 7.53 **WTOREK 17.** W 5.52 r. ☽ Z 9.52 w.

Maj.

228/139. W 3.59 ⊙ Z 7.54 **ŚRODA 18.** W 6.45 r. ☽ Z 10.45 w.

227/140. W 3.58 ⊙ Z 7.56 **CZWARTEK 19.** W 7.46 r. ☽ Z 11.34 w.

226/141. W 3.56 ⊙ Z 7.57 **PIĄTEK 20.** W 8.54 r. ☽ Z —.—

Maj.

225/142. W 3.55 ☉ Z 7.59 **SOBOTA 21.** W 10.07 r. ☽ Z 12.14 r.

Maj.

224/143. W 3.51 ⊙ Z 8.00 **NIEDZIELA** 22. 11.22 r. ☽ Z 12.49 r.

Pierwsza kwadra 11.12 r.

223/144. W 3.52 ⊙ Z 8.01 **PONIEDZ.** 23. W 12.39 w. ☽ Z 1.19 r.

222/145. W 3.51 ⊙ Z 8.03 **WTOREK** 24. W 1.56 w. ☽ Z 1.47 r.

Maj.

221/146. W 3.50 ⊙ Z 8.04 **ŚRODA 25.** W 3.13 w. ☽ Z 2.14 r.

220/147. W 3.49 ⊙ Z 8.06 **CZWARTEK 26.** W 4.29 w. ☽ Z 2.42 r.

219/148. W 3.48 ⊙ Z 8.07 **PIĄTEK 27.** W. 5.44 w. ☽ Z 3.11 r.

Maj.

218/149. W 3.47 ⊙ Z 8.08 **SOBOTA 28.** W 6.55 r. ☽ Z. 3.44 w.

Maj.

217/150. W 3.46 ⊙ Z 8.09 **NIEDZIELA** 29. W. 8.01 w. ☽ Z. 4.21 r.

Pełnia 9.48 r.

216/151. W 3.45 ⊙ Z 8.11 **PONIEDZ.** 30. W 8.59 w. ☽ Z 5.04 r.

215/152. W 3.44 ⊙ Z 8.12 **WTOREK** 31. W 9.50 w. ☽ Z 5.53 r.

Czerwiec.

214 153. W 3.42 ⊙ Z 8.13 **ŚRODA 1.** W 10.33 w. ☽ Z 6.18 r.

213 154. W 3.41 ⊙ Z 8.14 **CZWARTEK 2.** W 11.09 w. ☽ Z 7.46 r.

212 155. W 3.40 ⊙ Z 8.15 **PIĄTEK 3.** W 11.39 w. ☽ Z 8.48 r.

Czerwiec.

211 156. W 3.40 ☉ Z 8.16 **SOBOTA 4.** W — — w. ☽ Z 9.50 r.

Czerwiec.

210/157. W 3.40 ⊙ Z 8.17 **NIEDZIELA 5.** W 12.05 w. ☽ Z 10.53 r.

209/158. W 3.39 ⊙ Z 8.18 **PONIEDZ. 6.** W 12.29 ☽ Z 11.56 r.

Ostatnia kwadra 6.46 r.

208/159. W 3.38 ⊙ Z 8.19 **WTOREK 7.** W 12.52 w. ☽ Z 1.00 r.

Czerwiec.

207/160. W 3.38 ☉ Z 8.20 **ŚRODA 8.** W 1.14 r. ☽ Z 2.05 r.

206/161. W 3.37 ☉ Z 8.21 **CZWARTEK 9.** W 1.23 r. ☽ Z 3.11 r.

205/162. W 3.37 ☉ Z 8.21 **PIĄTEK 10.** W 2.02 r. ☽ Z 4.19 w.

Czerwiec.

204/163. W 3.37 ☉ Z 8.22 **SOBOTA 11** W 2.30 r. ☽ Z 5.27 w.

Czerwiec.

203/164. W 3.36 ⊙ Z 8.23 **NIEDZIELA 12.** W 3.04 r. ☽ Z 6.35 w.

202/165. W 3.36 ⊙ Z 8.24 **PONIEDZ. 13.** W 3.45 r. ☽ Z 7.40 w.

Nów 10.04 r.

201/166. W 3.36 ⊙ Z 8.24 **WTOREK 14.** W 4.34 r. ☽ Z 8.39 w.

Czerwiec.

200/167. W 3.36 ⊙ Z 8.25 **ŚRODA 15.** W 5.33 r. ☽ Z 9.31 w.

199/168. W 3.36 ⊙ Z 8.25 **CZWARTEK 16.** W 6.40 r. ☽ Z 10.15 w.

198/169. W 3.35 ⊙ Z 8.26 **PIĄTEK 17.** W 7.53 r. ☽ Z 10.53 w.

Czerwiec.

197/170. W 3.35 ⊙ Z 8.26 **SOBOTA** 18. W 9.10 r. ☽ Z 11.25 w.

Czerwiec.

196/171. W 3.35 ☉ Z 8.26 **NIEDZIELA 19.** W 10.28 r. ☽ Z 11.53 w.

195/172. W 3.37 ☉ Z 8.27 **PONIEDZ. 20.** W 11.45 r. ☽ Z —.—

Pierwsza kwadra 4.04 w.

194/173. W 3.36 ☉ Z 8.27 **WTOREK 21.** W 1.02 r. ☽ Z 12.20 r.

Czerwiec.

193 174. W 3.36 ⊙ Z 8.27 **ŚRODA 22.** W 2.17 r. ☽ Z 12.47 w.

192 175. W 3.36 ⊙ Z 8.27 **CZWARTEK 23.** W 3.31 r. ☽ Z 1.15 w.

191 176. W 3.36 ⊙ Z 8.27 **PIĄTEK 24.** W 4.42 r. ☽ Z 1.45 w.

Czerwiec.

190/177. W 3.37 ☉ Z 8.27 **SOBOTA 25.** W 5.49 w. ☽ Z 2.19 r.

Czerwiec.

189/178. W 3.37 ☉ Z 8.27 **NIEDZIELA 26.** W 6.50 r. ☽ Z 2.59 w.

188/179. W 3.38 ☉ Z 8.27 **PONIEDZ. 27.** W 7.44 r. ☽ Z 3.45 w.

Pełnia 9.17 r.

187/180. W 3.38 ☉ Z 8.27 **WTOREK 28.** W 8.30 r. ☽ Z 4.37

Czerwiec.

186,181. W 3.39 ⊙ Z 8.27 **ŚRODA 29.** W 9.08 r. ☽ Z 5.31 w.

185 182. W 3,39 ⊙ Z 8,27 **CZWARTEK 30.** W 9.41 r. ☽ Z 6,34 w.

Lipiec.

184 183. W 3.40 ⊙ Z 8.27 **PIĄTEK 1.** W 10.09 r. ☽ Z 7.36 w.

Lipiec.

183/184. W 3.41 ⊙ Z 8.26 **SOBOTA 2.** W 10.34 w. ☽ Z 8.39 r.

Lipiec.

182/185. W 3.44 ☉ Z 8.26 **NIEDZIELA 3.** W 10.57 w. ☽ Z 9.43 r.

181/186. W 3.42 ☉ Z 8.25 **PONIEDZ. 4.** W 11.19 w. ☽ Z 10.46 r.

180/187. W 3.43 ☉ Z 8.25 **WTOREK 5.** W 11.41 w. ☽ Z 11.49 r.

Ostatnia kwadra 11.48 w.

Lipiec.

179, 188. W 3.44 ⊙ Z 8.24 **ŚRODA 6.** W — — r. ☽ Z 12.54 w.

178 189. W 3.45 ⊙ Z 8.24 **CZWARTEK 7.** W 12.05 r. ☽ Z 2.00 r.

177 190. W 3.46 ⊙ Z 8.23 **PIĄTEK 8.** W 12.31 r. ☽ Z 3.07 r.

Lipiec.

176/191. W 3.47 ⊙ Z 8.22 **SOBOTA 9.** W 1.01 r. ☽ Z 4.14 r.

Lipiec.

175/192. W 3.48 ☉ Z 8.22 **NIEDZIELA** 10. W 1.37 r. ☽ Z 5.21 r.

174/193. W 3.49 ☉ Z 8.21 **PONIEDZ.** 11. W 2.22 r. ☽ Z 6.24 r.

173/194. W 3.50 ☉ Z 8.20 **WTOREK** 12. W 3.16 r. ☽ Z 7.21 r.

Lipiec.

172/195. W 3.51 ⊙ Z 8.19 **ŚRODA 13.** W 4.20 r. ☽ Z 8.10 r.

Nów 6.21 w

171/196. W 3.52 ⊙ Z 8.18 **CZWARTEK 14.** W 5.33 r. ☽ 8.51 r.

170/197. W 3.53 ⊙ Z 8.17 **PIĄTEK 15.** W 6.51 w. ☽ Z 9.26 r.

Lipiec.

169/198. W 3.55 ⊙ Z 8.16 SOBOTA 16. W 8.11 w. ☽ Z 9.57 r.

Lipiec.

168/199. W 3.56 ☉ Z 8.15 **NIEDZIELA 17.** W 9.31 w. ☽ Z 10.26 r.

167/200. W 3.57 ☉ Z 8.14 **PONIEDZ. 18.** W 10.49 w. ☾ Z 10.53 r.

166/201. W 3.59 ☉ Z 8.13 **WTOREK 19.** W 12.06 r. ☽ Z 11.20 w.

Pierwsza kwadra 9.42 w.

Lipiec.

165/202. W 4.00 ⊙ Z 8.11 **ŚRODA 20.** W 1.20 r. ☽ Z 11.49 r.

164/203. W 4.01 ⊙ Z 8.10 **CZWARTEK 21.** W 2.32 r. ☽ Z —.—

163/204. W 4.03 ☽ Z 8.09 **PIĄTEK 22.** W 3.40 w. ☽ Z 12.22 r.

Lipiec.

162 205. W 4.04 ☉ Z. 8.07 **SOBOTA 23.** W 1.12 w. ☽ Z 12.59 r.

Lipiec.

161/206. W 4.06 ⊙ Z 8.06 **NIEDZIELA 24.** W 5.38 w. ☽ Z 1.42 r.

160/207. W 4.07 ⊙ Z 8.05 **PONIEDZ. 25.** W 6.27 w. ☽ Z 2.31 r.

159/208. W 4.08 ⊙ Z 8.03 **WTOREK 26.** W 7.08 w. ☽ Z 3.26 r.

Lipiec.

158/209. W 4.10 ☉ Z 8.02 **ŚRODA 27.** W 7.13 w. ☽ Z 4.24 r.

Pelnia 10.35 r.

157/210. W 4.11 ☉ Z 8.00 **CZWARTEK 28.** W 8·12 w. ☽ Z 5.25 r.

156/211. W 4.13 ☉ Z 7.59 **PIĄTEK 29.** W 8.38 w. ☽ Z 6.28 r.

Lipiec.

155/212. W 4.14 ⊙ Z 7.57 **SOBOTA 30.** W 9.02 r. ☽ Z 7.31 w.

Lipiec.

154 213. W 4.16 ☉ Z 7.55 **NIEDZIELA 31.** W 9.24 w. ☽ Z 8.34 r.

Sierpień.

153 214. W 4.18 ☉ Z 7.54 **PONIEDZ. 1.** W 9.46 w. ☽ Z 9.37 r.

152 215. W 4.19 ☉ Z 7.52 **WTOREK 2.** W 10.09 w. ☉ Z 10.41 r.

Sierpień.

151/216. W 4.21 ⊙ Z 7.50 **ŚRODA 3.** W 10.33 w. ☽ Z 11.45 r.

150/217. W 4.22 ⊙ Z 7.48 **CZWARTEK 4.** W 11.00 r. ☽ Z 12.50 w.

Ostatnia kwadra 2.56 r.

149/218. W 4.24 ⊙ Z 7.47 **PIĄTEK 5.** W 11.33 r. ☽ Z 1.56 w.

Sierpień.

148/219. W 4.25 ⊙ Z 7.45 **SOBOTA 6.** W —.— w. ☽ Z 3.02 r.

Sierpień.

147/220. W 4.27 ☉ Z 7.43 **NIEDZIELA 7.** W 12.13 ☽ Z 4.05 r.

146/221. W 4.29 ☉ Z 7.41 **PONIEDZ. 8.** W 1.01 r. ☽ Z 5.04 r.

145/222. W 4.30 ☉ Z 7.39 **WTOREK 9.** W 1.59 r. ☽ Z 5.57 r.

Sierpień.

144 223. W 4.32 ☉ Z 7.37 **ŚRODA 10.** W 3.07 r. ☽ Z 6.43 w.

143 224. W 4.33 ☉ Z 7.35 **CZWARTEK 11.** W 4.23 r. ☽ Z 7.22 w.

Nów 1.52 w.

142 225. W 4.35 ☉ Z 7.33 **PIĄTEK 12.** W 5.44 r. ☽ Z 7.56 w.

Sierpień.

141 226. W 4.37 ☉ Z 7.31 **SOBOTA 13.** W 7.07 r. ☽ Z 8.26 w.

Sierpień.

140/227. W 4.38 ☉ Z 7.29 **NIEDZIELA 14.** W 8.29 r. ☽ Z 8.56 w.

139/228. W 4.40 ☉ Z 7.27 **PONIEDZ. 15.** W 9.49 r. ☽ Z 9.24 w.

138/229. W 4.42 ☉ Z 7.25 **WTOREK 16.** W 11.06 r. ☽ Z 9.53 w.

Sierpień.

137/230. W 4.44 ☉ Z 7.23 **ŚRODA 17.** W 12.20 r. ☽ Z 10.25 r.

136/231. W 4.45 ☉ Z 7.21 **CZWARTEK 18.** W 1.31 r. ☽ Z 11.01 r.

Pierwsza kwadra 5.21 r.

135/232. W 4.47 ☉ Z 7.19 **PIĄTEK 19.** W 2.36 r. ☽ Z 11.42 r.

Sierpień.

134/233. W 4.49 ⊙ Z 7.17 **SOBOTA** 20. W 3.33 r. ☽ Z —.— r.

Sierpień.

133/234. W 4.50 ☉ Z 7.15 **NIEDZIELA 21.** W 4.24 w. ☽ Z 12.29 r.

132/235. W 4.52 ☉ Z 7.13 **PONIEDZ. 22.** W 5.07 w. ☽ Z 1.21 r.

131/236. W 4.53 ☉ Z 7.10 **WTOREK 23.** W 5.43 w. ☽ Z 2.18 r.

Sierpień.

130/237. W 4.55 ⊙ Z 7.08 **ŚRODA 24.** W 6.15 w. ☽ Z 3.18 r.

129/238. W 4.57 ⊙ Z 7.06 **CZWARTEK 25.** W 6.42 w. ☽ Z 4.19 r.

128/239. W 4.59 ⊙ Z 7.04 **PIĄTEK 26.** W 7.07 w. ☽ Z 5.22 r.

Pełnia 1.57 r.

Sierpień.

127/240. W 5.00 ⊙ Z 7.02 **SOBOTA 27.** W 7.30 w. ☽ Z 6.25 r.

Sierpień.

126/241. W 5.02 ☉ Z 6.59 **NIEDZIELA 28.** W 7.52 r. ☽ Z 7.29 w.

125/242. W 5.04 ☉ Z 6.57 **PONIEDZ. 29.** W 8.14 r. ☽ Z 8.32 w.

124/243. W 5.05 ☉ Z 6.55 **WTOREK 30.** W 8.38 r. ☽ Z 9.35 w.

Sierpień.

123/244. W 5.07 ⊙ Z 6.53 **ŚRODA 31.** W 9.04 w. ☽ Z 10.39 r.

Wrzesień.

122/245. W 5.09 ⊙ Z 6.50 **CZWARTEK 1.** W 9.33 w. ☽ Z 11.44 r.

121/246. W 5.10 ⊙ Z 6.48 **PIĄTEK 2.** W 10.09 w. ☽ Z 12.48 r

Wrzesień.

120/247. W 5.12 ☉ Z 6.46 **SOBOTA 4.** W 10.52 r. ☽ Z 1.51 w.

Ostatnia kwadra 3.52 r.

Wrzesień.

119/248. W 5.13 ⊙ Z 6.43 **NIEDZIELA** 4. W 11.43 r. ☽ Z 2.50 w.

118/249. W 5.15 ⊙ Z 6.41 **PONIEDZ.** 5. W —.— ☽ Z 3.44 w.

117/250. W 5.17 ⊙ Z 6.39 **WTOREK** 6. W 12.45 w. ☽ Z 4.32 w.

Wrzesień.

116/251. W 5.18 ⊙ Z 6.36 **ŚRODA 7.** W 1.56 w. ☽ Z 5.14 w.

115/252. W 5.20 ⊙ Z 6.34 **CZWARTEK 8.** W 3.13 w. ☽ Z 5.50 w.

114/253. W 5.22 ⊙ Z 6.32 **PIĄTEK 9.** W .435 w. ☽ Z 6.28 w.

Nów 9.36 w.

Wrzesień.

113 254. W 5.23 ⊙ Z 6.29 **SOBOTA 10.** W 5.38 w. ☽ Z 6.53 w.

Wrzesień.

112/255. W 5.25 ☉ Z 6.27 **NIEDZIELA 11.** W 7.21 w. ☽ Z 7.22 w.

111/257. W 5.27 ☉ Z 6.25 **PONIEDZ. 12.** W 8.43 w. ☽ Z 7.52 w.

110/257. W 5.29 ☉ Z 6.22 **WTOREK 13.** W 10.02 w. ☽ Z 8.24 w.

Wrzesień.

109/258. W 5.30 ☉ Z 6.20 **ŚRODA 14.** W 11.16 w. ☽ Z 9.00 w.

108/259. W 5.32 ☉ Z 6.18 **CZWARTEK 15.** W 12.25 r. ☽ Z .940 w

107/260. W 5.30 ☉ Z 6.15 **PIĄTEK 16.** W 1.27 r. ☽ Z 10.26

Pierwsza-kwadra 4.06 w.

Wrzesień.

106 261. W 5.35 ☉ Z 6.13 **SOBOTA 17.** W 2.21 r. ☽ Z 11.17 w.

Wrzesień.

105 262. W 5.37 ☉ Z 6.10 **NIEDZIELA 18.** W 3.07 r. ☽ Z —.—

104 263. W 5.39 ☉ Z 6.08 **PONIEDZ. 19.** W 3.46 r. ☽ Z 12.12 r.

103 264. W 5.40 ☉ Z 6.06 **WTOREK 20.** W 4.18 r. ☽ Z 1.11 r.

Wrzesień.

102/265. W 5.42 ☉ Z 6.03 **ŚRODA 21.** W 4.46 r. ☽ Z 2.12 r.

101/266. W 5.44 ☉ Z 6.01 **CZWARTEK 22.** W 5.12 r. ☽ Z 3.14 r.

100/267. W 5.45 ☉ Z 5.58 **PIĄTEK 23.** W 5.35 r. ☽ Z 4.17 r.

Wrzesień.

99 268. W 5.47 ⊙ Z 5.56 **SOBOTA 24.** W 5.57 r. ☽ Z 5.20 w.

Pełnia 6.43 w.

Wrzesień.

98/269. W 5.49 ☉ Z 5.54 **NIEDZIELA 25.** W 6.19 r. ☽ Z 6.24 r.

97/270. W 5.50 ☉ Z 5.51 **PONIEDZ. 26.** W 6.42 r. ☽ Z 7.28 r.

96/271. W 5.52 ☉ Z 5.49 **WTOREK 27.** W 7.07 r. ☽ Z 8.32 r.

Wrzesień.

95/272. W 5.54 ☉ Z 5.47 **ŚRODA 28.** W 7.36 r. ☽ Z 9.36 r.

94/273. W 5.56 ☉ Z 5.44 **CZWARTEK 29.** W 8.09 r. ☽ Z 10.40 r.

93/274. W 5.57 ☉ Z 5.42 **PIĄTEK 30.** W 8.48 r. ☽ Z 11.42 r.

Październik.

92 275. W 5.59 ☉ Z 5.40 **SOBOTA 1.** W 9.36 r. ☽ Z 12.42 w.

Październik.

91/276. W 6.00 ☉ Z 5.37 **NIEDZIELA 2.** W 10.31 r. ☽ Z 1.37 w.

Ostatnia kwadra 2.46 r.

90/277. W 6.02 ☉ Z 5.35 **PONIEDZ. 3.** W 11.36 r. ☽ Z 2.25 w.

89/278. W 6.04 ☉ Z 5.33 **WTOREK 4.** W —.— r. ☽ Z 3.08 w.

Październik.

88/279. W 6.06 ⊙ Z 5.30 ŚRODA 5. W 12.48 r. ☽ Z 3.45 w.

87/280. W 6.07 ⊙ Z 5.28 CZWARTEK 6. W 2.07 r. ☽ Z 4.18 w.

86/281. W 6.09 ⊙ Z 5.26 PIĄTEK 7. W 3.26 r. ☽ Z 4.40 w.

Październik.

85 282. W 6.11 r. ⊙ Z 5.23 **SOBOTA 8.** W 4.49 r. ☽ Z 5.18 w.

Październik.

84/283. W 6.13 ⊙ Z 5.21 **NIEDZIELA 9.** W 6.12 r. ☽ Z 5.48 w.

Nów 6.18 r.

83/284. W 6.14 ⊙ Z 5.19 **PONIEDZ. 10.** W 7.34 r. ☽ Z 6.19 w.

82/285. W 6.16 ⊙ Z 5.16 **WTOREK 11.** W 8.53 r. ☽ Z 6.54 w.

Październik.

81/286. W 6.18 ⊙ Z 5.14 **ŚRODA 12.** W 10.07 r. ☽ Z 7.33 w.

80/287. W 6.20 ⊙ Z 5.12 **CZWARTEK 13.** W 11.14 r. ☽ Z 8.18 w.

79/288. W 6.22 ⊙ Z 5.10 **PIĄTEK 14.** W. 12.13 w. ☽ Z 9.08 w.

Październik.

78.289. W 6.23 ☉ Z 5.07 **SOBOTA 15.** W 1.03 w. ☽ Z 10.03 w.

Październik.

77/290. W 6.25 ⊙ Z 5.05 **NIEDZIELA 16.** 1.45 w. ☽ Z 11.02 w.

Pierwsza kwadra 6.48 r.

76/291. W 6.27 ⊙ Z 5.03 **PONIEDZ. 17.** W 2.20 w. ☽ Z —.—

75/292. W 6.29 ⊙ Z 5.01 **WTOREK 18.** W 2.50 w. ☽ Z 12.03 r.

Październik.

74/293. W 6.31 ⊙ Z 4.59 **ŚRODA 19.** W 3.16 w. ☽ Z 1.00 r.

73/294. W 6.32 ⊙ Z 4.57 **CZWARTEK 20.** W 3.40 w. ☽ Z 2.08 r.

72/295. W 6.34 ⊙ Z 4.55 **PIĄTEK 21.** W 4.02 w. ☽ Z 3.11 r.

Październik.

71 296. W 6.36 ⊙ Z 4.52 **SOBOTA 22.** W 4.24 w. ☽ Z 4.14 r.

Październik.

70/297. W 6.38 ⊙ Z 4.50 **NIEDZIELA 23.** W 4.47 w. ☽ Z 5.18 r.

69/298. W 6.40 ⊙ Z 4.48 **PONIEDZ. 24.** W 5.12 w. ☽ Z 6.23 r.

Pełnia 11.49 r.

68/299. W 6.41 ⊙ Z 4.46 **WTOREK 25.** W 5.39 w. ☽ Z 7.28 r.

Październik.

67 300. W 6.43 ☉ Z 4.44 **ŚRODA 26.** W 6.10 w. ☽ Z 8.33 r.

66 301. W 6.45 ☉ Z 4.42 **CZWARTEK 27.** W 6.47 w. ☽ Z 9.37 r.

65 302. W 6.47 ☉ Z 4.40 **PIĄTEK 28.** W 7.32 w. ☽ Z 10.38 r.

Październik.

64 303. W 6.49 ⊙ Z 4.38 **SOBOTA 29.** W 8.25 w. ☽ Z 11.34 r.

Październik.

63/304. W 6.51 ☉ Z 4.36 **NIEDZIELA 30.** W 9.26 w. ☽ Z 12.24 w.

62/305. W 6.53 ☉ Z 4.34 **PONIEDZ. 31.** W 10.33 w. ☽ Z 1.12 w.

Listopad.

61/306. W 6.55 ☉ Z 4.32 **WTOREK 1.** W 11.46 w. ☽ Z 1.45 w.

Ostatnia kwadra 12.07 r.

Listopad.

60/307. W 6.56 ⊙ Z 4.30 **ŚRODA 2.** W —.— r. ☽ Z 2.18 w.

59/308. W 6.58 ⊙ Z 4.28 **CZWARTEK 3.** W 1.03 r. ☽ Z 2.48 w.

58/307. W 7.00 ⊙ Z 4.27 **PIĄTEK 4.** W 2.22 r. ☽ Z 3.17 w.

Listopad.

57 810. W 7.02 ⊙ Z 4.25 **SOBOTA 5.** W 3.43 r. ☽ Z 3.45 w.

Listopad.

56/311. W 7.04 ⊙ Z 4.23 **NIEDZIELA 6.** W 5.04 r. ☽ Z 4.14 w.

55/312. W 7.06 ⊙ Z 4.21 **PONIEDZ. 7.** W 6.24 r. ☽ Z 4.47 w.

Nów 4.30 w.

54/313. W 7.07 ⊙ Z 4.20 **WTOREK 8.** W 7.42 r. ☽ Z 5.24 w.

Listopad.

53 314. W 7.09 ☉ Z 4.18 **ŚRODA 9.** W 8.54 r. ☽ Z 6.06 w.

52 315. W 7.11 ☉ Z 4.16 **CZWARTEK 10.** W 9.59 r. ☽ Z 6.54 w.

51 316. W 7.13 ☉ Z 4.15 **PIĄTEK 11.** W 10.55 r. ☽ Z 7.48 w.

Listopad.

50/317. W 7.15 ☉ Z 4.13 **SOBOTA 12** W 11.42 r. ☽ Z 8.48 w.

Listopad.

49/318. W 7.17 ☉ Z 4.12 **NIEDZIELA 13.** W 12.21 w. ☽ Z 9.49 w.

48/319. W 7.18 ☉ Z 4.10 **PONIEDZ. 14** W 2.53 w. ☽ Z 10.52 w.

47/320. W 7.20 ☉ Z 4.08 **WTOREK 15.** W 1.20 w. ☽ Z 11.55 w.

Pierwsza kwadra 1.29 r.

Listopad.

46 321. W 7.22 ⊙ Z 4.07 **ŚRODA 16.** W 1.44 w. ☽ Z —.— w.

45 322. W 7.24 ⊙ Z 4.06 **CZWARTEK 17.** W 2.07 w. ☽ Z 12.58 r.

44 323. W 7.26 ⊙ Z 4.04 **PIĄTEK 18.** W 2.29 w. ☽ Z 2.02 r.

Listopad.

43 324. W 7.27 ⊙ Z 4.03 **SOBOTA 19.** W 2.51 w. ☽ Z 3.06 r.

Listopad.

42/325. W 7.29 ☉ Z 4.02 **NIEDZIELA 20.** W 3.14 w. ☽ Z 4.10 r.

41/326. W 7.31 ☉ Z 4.01 **PONIEDZ. 21.** W 3.40 w. ☽ Z 5.16 r.

40/327. W 7.33 ☉ Z 3.59 **WTOREK 22.** W 4.10 w. ☽ Z 6.22 r.

Listopad.

30/328. W 7.34 ⊙ Z 3.58 **ŚRODA 23.** W 4.46 w. ☽ Z 7.28 r.

Pełnia 4.05 r.

38/329. W 7.36 ⊙ Z 3.57 **CZWARTEK 24.** W 5.28 w. ☽ Z 8.31 r.

37/330. W 7.38 ⊙ Z 3.56 **PIĄTEK 25.** W 6.19 w. ☽ Z 9.30 r.

Listopad.

36 331. W 7.39 ⊙ Z. 3.55 **SOBOTA 26.** W 7.18 w. ☽ Z 10.23 r.

Listopad.

35 332. W 7.41 ☉ Z 3.51 **NIEDZIELA 27.** W 8.24 w. ☽ Z 11.09 r.

34 333. W 7.43 ☉ Z 3.53 **PONIEDZ. 28.** W 9.35 w. ☽ Z 11.49 r.

33 334. W 7.44 ☉ Z 3.52 **WTOREK 29.** W 10.50 w. ☽ Z 12.23 w.

Listopad.

32/335. W 7.46 ⊙ Z 3.52 **ŚRODA 30.** W —.— w. ☾ Z 12.53 w.
Ostatnia kwadra 8.32 r.

Grudzień.

31/336. W 7.47 ⊙ Z 3.51 **CZWARTEK 1.** W 12.07 r. ☾ Z 1.21 w.

30/337. W 7.48 ⊙ Z 3.50 **PIĄTEK 2.** W 1.24 r. ☾ Z 1.48 w.

Grudzień.

29 338. W 7.50 ⊙ Z 3.50 SOBOTA 3. W 2.42 r. ☽ Z 2.15 w.

Grudzień.

28/339. W 7.51 ☉ Z 3.49 **NIEDZIELA** 4. W 4.00 r. ☽ Z 2.44 w.

27/340. W 7.52 ☉ Z 3.48 **PONIEDZ.** 5. W 5.17 r. ☽ Z 3.17 w.

26/341. W 7.54 ☉ Z 3.48 **WTOREK** 6. W 6.32 r. ☽ Z 3.56 w.

Grudzień.

25 342. W 7.55 ☉ Z 3.48 **ŚRODA 7.** W 7.41 r. ☽ Z 4.41 w.

Nów 4.40 r.

24 343. W 7.5? ☉ Z 3.47 **CZWARTEK 8.** W 8.42 r. ☽ Z 5.33 w.

23 344. W 7.58 ☉ Z 3.47 **PIĄTEK 9.** W 9.34 r. ☽ Z 6.31 w.

Grudzień.

22 345. W 7.59 ⊙ Z 3.47 **SOBOTA 10.** W 10.17 r. ☽ Z 7.32 w.

Grudzień.

21/316. W 8.00 ☉ Z 3.47 **NIEDZIELA 11.** W 10.53 r. ☽ Z 8.35 w.

20/347. W 8.01 ☉ Z 3.47 **PONIEDZ. 12.** W 11.23 r. ☽ Z 9.39 w.

19/348. W 8.02 ☉ Z 3.46 **WTOREK 13.** W 11.49 r. ☽ Z 10.43 w.

Grudzień.

18/349. W 8.03 ☉ Z 3.46 **ŚRODA 14.** W 12.12 w. ☽ Z 11.47 w.

Pierwsza kwadra 11.00 w.

17/350. W 8.04 ☉ Z 3.47 **CZWARTEK 15.** W 12.35 w. ☽ Z —.—

16/351. W 8.05 ☽ Z 3.47 **PIĄTEK 16.** W 12.55 w. ☽ Z 12.50 r.

Grudzień.

15/352. W 8.05 ⊙ Z 3.47 **SOBOTA 17.** W 1.18 w. ☽ Z 1.54 r.

Grudzień.

14/353. W 8.06 ⊙ Z 3.47 **NIEDZIELA 18.** W 1.42 w. ☽ Z 2.59 r.

13/354. W 8.07 ⊙ Z 3.47 **PONIEDZ. 19.** W 2.10 w. ☽ Z 4.05 r.

12/355. W 8.07 ⊙ Z 3.48 **WTOREK 20.** W 2.42 w. ☽ Z 5.11 r.

Grudzień.

11/356. W 8.08 ⊙ Z 3.48 **ŚRODA 21.** W 3.21 w. ☽ Z 6.16 r.

10/357. W 8.08 ⊙ Z 3.49 **CZWARTEK 22.** W 4.09 w. ☽ Z 7.19 r.

Pełnia 6.55 w.

9/358. W 8.09 ⊙ Z 3.49 **PIĄTEK 23.** W. 5.06 w. ☽ Z 8.16 r.

Grudzień.

8/359. W 8.09 ⊙ Z 3.50 **SOBOTA 24.** W 6.11 w. ☽ Z. 9.07 r.

Grudzień.

7/360. W 8.10 ⊙ Z 3.51 **NIEDZIELA 25.** W 7.23 w. ☽ Z 9.50 r.

6/361. W 8.10 ⊙ Z 3.51 **PONIEDZ. 26.** W 8.38 w. ☽ Z 10.27 r.

5/363. W 8.10 ⊙ Z 3.52 **WTOREK 27.** W 9.55 w. ☽ Z 10.58 r.

Grudzień.

4/363. W 8.10 ⊙ Z 3.53 **ŚRODA 28.** W 11.13 w. ☽ Z 11.26 r.

3/364 W 8.11 ⊙ Z 3.54 **CZWARTEK 29.** W —.— r. ☽ Z 11.53 r.

Ostatnia kwadra 4.40 w.

2/365. W 8.11 ⊙ Z 3.55 **PIĄTEK 30.** W 12.03 r. ☽ Z 12.20 r.

Grudzień.

1 366. W 8.11 ☉ Z 3.56 **SOBOTA 31.** W 12.14 w. ☽ Z 12.48 r.

Dzienniczek kasowy.

Przychód		Data	Wyszczególnienie	Rozchód	
K	h			K	h

Dzienniczek kasowy.

Przychód		Data	Wyszczególnienie	Rozchód	
K	h			K	h

Dzienniczek kasowy.

Przychód		Data	Wyszczególnienie	Rozchód	
K	h			K	h

Dzienniczek kasowy.

Przychód		Data	Wyszczególnienie	Rozchód	
K	h			K	h

Dzienniczek kasowy.

Przychód		Data	Wyszczególnienie	Rozchód	
K	h			K	h

Dzienniczek kasowy.

Przychód		Data	Wyszczególnienie	Rozchód	
K	h			K	h

Dzienniczek kasowy.

Przychód		Data	Wyszczególnienie	Rozchód	
K	h			K	h

Dzienniczek kasowy.

Przychód		Data	Wyszczególnienie	Rozchód	
K	h			K	h

Zasługi

Nazwisko	Gotówką		Pszenicy	Żyta	Jęczmienia
	K	h			

o r d y n a r y a.

Kukurydzy	Grochu	Pod kartofle			Drzewa

Zasługi i

Nazwisko	Gotówką		Pszenicy	Żyta	Jęczmienia
	K	h			

ordynarya.

Kukurydzy	Grochu	Pod kartofle			Drzewa

Zasługi i

Nazwisko	Gotówką		Pszenicy	Żyta	Jęczmienia
	K	h			

ordynarya.

Kukurydzy	Grochu	Pod kartofle			Drzewa

Kontrola

Nazwiska robotników należy

Nazwisko robotnika	S	t	y-											
	2 P	3 S	5 P	6 W	7 S	8 C	9 P	10 S	12 P	13 W	14 Ś	15 C	16 P	17 S

n a j m u.

przenieść na następną stronę.

c z e ń												Luty																	
19 P	20 W	21 Ś	22 C	23 P	24 S	26 P	27 W	28 Ś	29 C	30 P	31 S	2 P	3 W	4 Ś	5 C	6 P	7 S	9 P	10 W	11 Ś	12 C	13 P	14 S	16 P	17 W	18 Ś	19 C	20 P	21 S
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Nazwisko robotnika	Luty						Marzec																	
	23	24	25	26	27	28	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21
	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Marzec								Kwiecień																					
23 P	24 W	25 Ś	26 C	27 P	28 S	30 P	31 W	1 Ś	2 C	3 P	4 S	6 P	7 W	8 Ś	9 C	10 P	11 S	13 P	14 W	15 Ś	16 C	17 P	18 S	20 P	21 W	22 Ś	23 C	24 P	25 S

Nazwisko robotnika	Kwiecień				Maj																			
	27 P	28 W	29 Ś	30 C	1 P	2 S	4 P	5 W	6 Ś	7 C	8 P	9 S	11 P	12 W	13 Ś	14 C	15 P	16 S	18 P	19 W	20 Ś	21 C	22 P	23 S

Maj						Czerwiec																							
25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Nazwisko robotnika	C.		L i p i e c																					
	29 P	30 W	1 Ś	2 C	3 P	4 S	6 P	7 W	8 Ś	9 C	10 P	11 S	13 P	14 W	15 Ś	16 C	17 P	18 S	20 P	21 W	22 Ś	23 C	24 P	25 S

Lipiec					Sierpień																								
27	28	29	30	31	1	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	S	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Nazwisko robotnika	S.	Wrzesień																						
	31 P	1 W	2 Ś	3 C	4 P	5 S	7 P	8 W	9 Ś	10 C	11 P	12 S	14 P	15 W	16 Ś	17 C	18 P	19 S	21 P	22 W	23 Ś	24 C	25 P	26 S

W.			Październik																										
28	29	30	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31
P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S	P	W	Ś	C	P	S

Nazwisko robotnika	Listopad																						
	2 P	3 W	4 Ś	5 C	6 P	7 S	9 P	10 W	11 Ś	12 C	13 P	14 S	16 P	17 W	18 Ś	19 C	20 P	21 S	23 P	24 W	25 Ś	26 C	27 P	28 S

L.	Grudzień																										
30	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	28	29	30	31
P	W	S	C	P	S	P	W	S	C	P	S	P	W	S	C	P	S	P	W	S	C	P	S	P	W	S	C

Powierzchnia niw, pól itp.

Nazwa folwarku	Nazwa pola, niwy, łąki itp.	Rola		Łąka		Pastwisko		Las	
		morgi i sążnie							

majątku

Stawy wody		Drogi i pod zabudowaniami		Ogrody, sady		Nieużytki		Ogółem		Uwagi
morgi i sążnie										

Powierzchnia niw, pól itp.

Nazwa folwarku	Nazwa pola, niwy, łąki itp.	Rola		Łąka		Pastwisko		Las	
		morgi i sążnie							

majątku

Stawy wody		Drogi i pod zabudowaniami		Ogrody, sady		Nieużytki		Ogółem		Uwagi
morgi i sążnie										

Powierzchnia niw, pól itp.

Nazwa folwarku	Nazwa pola, niwy, łąki itp.	Rola		Łąka		Pastwisko		Las	
		morgi i sążnie							

majątku ....

Stawy wody		Drogi i pod zabudowaniami		Ogrody, sady		Nieużytki		Ogółem		**Uwagi**
morgi i sążnie										

Zmianowania

Zmianowania

Preliminarz szczegółowy

Zmianowanie	Dział	Ozimina			Jarzyna					
		Pszenica	Żyto	Rzepak	Jęczmień	Owies	Groch	Wyka	Bobik	
Razem morgów										
Wysiew. mórg										
Potrzeba na obs. q										

obsiewów na rok 19...

Okopowe				Pasze						Sterkoryzacya	
Kartofle	Marchew	Buraki past.	Buraki cukr.	Koniczyna czerw.	Koniczyna biała		Kapusta		Ugór	Obornika	

Preliminarz szczegółowy

Zmianowanie	Dział	Ozimina			Jarzyna					
		Pszenica	Żyto	Rzepak	Jęczmień	Owies	Groch	Wyka	Bobik	
Razem morgów										
Wysiew. mórg										
Potrzeba na obs. q										

obsiewów na rok 19.........

Kartofle	Okopowe			Pasze			Kapusta		Ugór	Sterkoryzacya	
	Marchew	Buraki past.	Buraki cukr.	Koniczyna czerw.	Koniczyna biała					Obornika	

Zasiewy, nawo-

Nazwa pola lub niwy	Wielkość		Obsiano		Nawieziono bezpośre-dnio czem	Ile lat temu nawiez. oborn.
	morg.	sąż.	dnia	czem		

żenie i zbiory.

Wysiano		Zebrano		Zwieziono do stodoły, stogu (nazwa, liczba)	Wymłócono		Uwagi w notatniku ...... s. d.
q.	kg.	kóp, wozów	snop.		q.	kg.	

Zasiewy, nawo-

Nazwa pola lub niwy	Wielkość		Obsiano		Nawieziono bezpośrednio czem	Ile lat temu nawiez. oborn.
	morg.	sąż.	dnia	czem		

żenie i zbiory.

Wysiano		Zebrano		Zwieziono do stodoły, stogu (nazwa, liczba)	Wymłócono		Uwagi w notatniku z d.
q.	kg.	kóp, wozów	snop.		q.	kg.	

Zasiewy, nawo-

Nazwa pola lub niwy	Wielkość		Obsiano		Nawieziono bezpośrednio czem	Ile lat temu nawiez. oborn.
	morg.	sąż.	dnia	czem		

żenie i zbiory.

Wysiano		Zebrano		Zwieziono do stodoły, stogu (nazwa, liczba)	Wymłócono		Uwagi w notatniku z d.
q.	kg.	kóp, wozów	snop.		q.	kg.	

Nawoże-

Data	Nazwa pola, niwy lub łąki	Wielkość morgów	Obornika		Gnojówki
			z gnojowni	z pod inwentarza	

nie pól.

Kompostu	Saletry	Superfosfatu, mąki kostnej itp.	Tomasyny	Kaintu	Uwagi

Omłoty

Liczba porz.	Gatunek zboża	Data	Pole, niwa	Omłócono	
				kóp	snopów
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

próbne.

Zebrano			Wypada z morga		Waga korca lub hektolitr.
ziarna celnego	ziarna pośledn.	słomy i plew	ziarna	słomy	
kilogramów			kilogramów		kg.

Preliminarz ziarna

Gatunek zboża	L. p. próbnego omłotu	Zebrano kóp = k. lub z morgów = m.	Spodziewany zbiór ziarna celnego	Spodziewany zbiór ziarna pośledn.	Spodziewany zbiór słomy
		q.	q.	q.	x.

na rok 19.........

Potrzeby folwarku				Razem		Zbywa		Brakuje	
Wysiew	Ordynarya	Obroki i pasze							
		cel.	poś.	cel.	poś.	cel.	poś.	cel.	poś.
q.	q.	q.	q.	q.	q.	q.	q.	q.	q.

Omłoty zboża.

Gatunek zboża	Data omłotu	Omłócono	Z niwy, pola	Zebrano ziarna		Uwagi
				celn.	pośl.	
		kóp, wozów		q.		

Omłoty zboża.

Gatunek zboża	Data omłotu	Omłócono		Z niwy, pola	Zebrano ziarna		**Uwagi**
					celn.	pośl.	
		kóp,	wozów		q.		

Omłoty zboża.

Gatunek zboża	Data omłotu	Omłócono		Z niwy, pola	Zebrano ziarna		Uwagi
					celn.	pośl.	
		kóp,	wozów		q.		

Omłoty zboża.

Gatunek zboża	Data omłotu	Omłócono		Z niwy, pola	Zebrano ziarna		Uwagi
		kóp,	wozów		celn.	pośl.	
					q.		

Wysłano do młyna			Odebrano ze młyna					
Data	Co posłano	Kilogramów	Data	Mąki	Kaszy	Otrąb	Osypki	Uwagi
				kilogramów				

Wysłano do młyna | **Odebrano ze młyna**

Data	Co posłano	Kilogramów	Data	Mąki	Kaszy	Otrąb	Osypki	Uwagi
				kilogramów				

Zbiór siana

Data	Nazwa łąki lub pola	Prze-strzeń	Siano łąkowe	Potraw

z łąk i pól.

Koniczyna			Ogółem	Uwagi co do nawożenia, stanu pogody podczas sprzętu, rozwoju roślin, kiedy koszono

Zbiór siana

Data	Nazwa łąki lub pola	Przestrzeń	Siano łąkowe	Potraw

z łąk i pół.

Koniczyna			Ogółem	Uwagi co do nawożenia, stanu pogody podczas sprzętu, rozwoju roślin, kiedy koszono

Stan inwen-

Gatunek zwierząt		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj
		Sztuk				
Bydło	Buhaje					
	Krowy					
	Jałówki cielne					
	Jałownik					
	Cielęta					
	Woły opasowe					
	Woły robocze					
	Razem					
Konie	Robocze					
	Wierzchowe					
	Wyjazdowe					
	Źrebięta					
	Ogiery					
	Razem					
Owce	Tryki					
	Maciory					
	Skopy					
	Roczniki					
	Jagnięta					
	Razem					
Świnie	Knury					
	Maciory					
	Wieprzki					
	Prosięta knur.					
	Loszki					
	Karmniki					
	Razem					

tarza żywego.

Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Paździer.	Listopad	Grudzień
Sztuk						

Próbne ważenie

Gatunek zwierząt	Numer lub nazwa	Ważone dnia			
		waży w kilogramach			

inwentarza.

Ważone dnia						
waży w kilogramach						

Próbne ważenie

Gatunek zwierząt	Numer lub nazwa	Ważone dnia			
		waży w kilogramach			

inwentarza.

Ważone dnia						
Waży w kilogramach						

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	litrów											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	l i t r ó w											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Pld.	W.	Razem	R.	Pld.	W.	Razem	R.	Pld.	W.	Razem
	litrów											

Udoje próbne.

Dzień		L.				L.				L.			
		R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
		litrów											

Udoje próbne.

Dzień	L				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	w litrów											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	litrów											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	w litrów											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	l i t r ó w											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	litrów											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	w litrów											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	l i t r ó w											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	litrów											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Pld.	W.	Razem	R.	Pld.	W.	Razem	R.	Pld.	W.	Razem
	l i t r ó w											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	litrów											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	w litrów											

Udoje próbne.

Dzień	L.				L.				L.			
	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem	R.	Płd.	W.	Razem
	litrów											

Ogólny udój

Dzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
	dzienny udój całej obory w litrach					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
Do przen.						

mleka.

Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Paździer.	Listopad	Grudzień
dzienny udój całej obory w litrach					

Ogolny udój

Dzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
	dzienny udój całej obory w litrach					
Z przen						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Razem						

mleka.

Lipiec		Sierpień	Wrzesień	Paździer,	Listopad	Grudzień
dzienny udój całej obory w litrach						

Stanowienie i cielenie się krów.

Liczba krowy	1-y raz	2-i raz	3-i raz	4-y raz	Powinna się ocielić dnia	Nie doi się od dnia	Przybyła: Jałówka=J, Byczek=B, dnia	Uwagi
	stanowiona buhajem L.							
	d n i a							

Udój mleka za ostatnie dwa lata.

Liczba krowy	Udój rocz. w 190 r. litr.	Zaczęła się doić dnia	Przestała się doić dnia	Doiła się przez dni	Udój rocz. w 190 r. litr.	Zaczęła się doić dnia	Przestała się doić dnia	Doiła się przez dni

Stanowienie i cielenie się krów

Liczba krowy	1-y raz	2-y raz	3-y raz	4-y raz	Powinna się ocielić dnia	Nie doi się od dnia	Przybyła: jałówka=J, Byczek=B, dnia	Uwagi
	stanowiona buhajem L. .... dnia							

Udój mleka za ostatnie dwa lata.

Liczba krowy	Udój rocz. w 190.... r. litr.	Zaczęła się doić dnia	Przestała się doić dnia	Doiła się przez dni	Udój rocz. w 190.... r. litr.	Zaczęła się doić dnia	Przestała się doić dnia	Doiła się przez dni

Przybytek inwen-

Data	Od kogo kupiono? lub chowu własnego	BYDŁO						KONIE		
		Buhaje	Krowy		Woły	Cielęta	Wagi kg. ogółem	Wyjazd.	Robocze	Źrebięta

tarza żywego.

ŚWINIE					OWCE							
Knury	Maciory	Prosięta	Karmniki	Wagi kg. ogółem	Tryki	Maciory		Skopy		Jagnięta	Sztuk ogół.	Wagi kg. ogółem
						l.	l.	l.	l.			

Przybytek inwen-

Data	Od kogo kupiono? lub chowu własnego	BYDŁO						KONIE		
		Buhaje	Krowy		Woły	Cielęta	Wagi kg. ogółem	Wyjazd.	Robocze	Źrebięta

tarza żywego.

ŚWINIE					OWCE								
Knury	Maciory	Prosięta	Karmniki	Wagi kg. ogółem	Tryki	Maciory		Skopy		Jagnięta	Sztuk ogół.	Wagi kg. ogółem
						l.	l.	l.	l.			

Ubytek inwen-

Data	Komu sprzedano? lub rodzaj śmierci	BYDŁO						KONIE		
		Buhaje	Krowy		Woły	Cielęta	Wagi kg. ogółem	Wyjazd.	Robocze	Źrebięta

tarza żywego.

ŚWINIE					OWCE							
Knury	Maciory	Prosięta	Karmniki	Wagi kg. ogółem	Tryki	Maciory		Skopy		Jagnięta	Sztuk ogół.	Wagi kg. ogółem
						1.	1.	1.	1.			

Ubytek inwen-

Data	Komu sprzedano? lub rodzaj śmierci	BYDŁO						KONIE		
		Buhaje	Krowy		Woły	Cielęta	Wagi kg. ogółem	Wyjazd.	Robocze	Źrebięta

tarza żywego.

ŚWINIE					OWCE							
Knury	Maciory	Prosięta	Karmniki	Wagi kg. ogółem	Tryki	Maciory		Skopy		Jagnięta	Sztuk ogół.	Wagi kg. ogółem
						l.	l.	l.	l.			

Dawki paszy dzienne.

Gatunek zwierząt	Sztuk	Waga ogółem	Okres czasu żywienia		Przez dni	Gatunek		
			od	do		w kilo-		

Preliminarz paszy na rok 190......

potrzeba na cały rok.

paszy				Gatunek paszy							
gramach							w q.				

Dawki paszy dzienne.

Gatunek zwierząt	Sztuk	Waga ogółem	Okres czasu żywienia		Przez dni	Gatunek			
			od	do			w kilo-		

Preliminarz paszy na rok 190 ....

potrzeba na cały rok.

paszy							Gatunek paszy						
gramach							w q.						

Inwentarz martwy.

Wyszczególnienie	Było na początku roku	Jest w końcu roku	Wartość sztuki		Wartość ogółem	
	sztuk		K.	gr.	K.	gr.
Arfy do przesiew. piasku						
Barcze do wozów . . .						
Beczki do wozów . . .						
» do kapusty . . .						
Bryczki parokonne . . .						
» jednokonne . .						
Brony łąkowe						
» żelazne						
» drewniane . . .						
Cebry do mleka						
Cecha do znaczenia . .						
» do wypalania . .						
Chomonta fornalskie . .						
» wyjazdowe . .						
Czapraki						
Dery						
Drabiny na wozy . . .						
» zwykłe						
Drapacze						
Drągi żelazne						
Ekstyrpatory						
Gniotowniki						
Grabie konne						
» ręczne						
Gwichty						

Inwentarz martwy.

Wyszczególnienie	Było na początku roku	Jest w końcu roku	Wartość sztuki		Wartość ogółem	
	sztuk		K.	gr.	K.	gr.
Haki do gnoju						
Jarzma na woły						
Kłódki						
Klucze do muter						
Kosy ręczne						
Kosiarki						
Kowadła						
Kubełki do wody						
Kultywatory						
Latarnie						
Lewary						
Linki do siana						
Luśnie z nalustkami . .						
Łańcuszki na konie . .						
Łańcuchy do drzewa . .						
Maźnice do smoły . . .						
Miary do zboża						
Miechy kowalskie . . .						
Młocarnie						
Młoty do kamieni . . .						
Młynki do czyszczenia .						
» do mlenia . . .						
Motyki						
Mundsztuki						
Narzędzia kowalskie . .						

Inwentarz martwy.

Wyszczególnienie	Było na początku roku	Jest w końcu roku	Wartość sztuki		Wartość ogółem	
	sztuk		K.	gr.	K.	gr.
Narzędzia stolarskie . .						
» tokarskie . . .						
Nosidła do gnoju . . .						
Obsypywacze						
Oskardy						
Pilniki						
Piły trackie						
» ręczne						
Płachty do zboża . . .						
Pługi drewniane						
» żelazne						
» przegonowe . . .						
Pługi						
Pogłębiacze						
Popręgi						
Półszorki						
Przetaki						
Przetrząsacze						
Radła						
Sanki wyjazdowe . . .						
Saneczki do pługów . .						
Sanie robocze						
Sieczkarnie						
Siekiery						
Siewniki						

Inwentarz martwy.

Wyszczególnienie	Było na początku roku	Jest w końcu roku	Wartość sztuki		Wartość ogółem	
	sztuk		K.	gr.	K.	gr.
Sikawki						
Siodła						
Sita						
Skrzynie do kartofli . .						
Spychacze do siana . .						
Śrubsztaki						
Stołki do doju						
Szatkownice do kapusty						
Szkopki do doju						
Szle parciane						
Szpadle i łopaty						
Szufle do zboża						
Taczki do zboża						
» grabarskie . . .						
Uzdzienice						
Wagi dziesiętne						
» belkowe						
Walce żelazne						
» drewniane . . .						
Wialnie						
Widły do siana						
» do gnoju						
Włóki						
Worki do zboża						
Wozy na żelaz. osiach .						

Inwentarz martwy.

Wyszczególnienie	Było na początku roku	Jest w końcu roku	Wartość sztuki		Wartość ogólem	
	sztuk		K.	gr.	K.	gr.
Wozy na drewn. osiach						
Znaczniki						
Żniwiarki						

Inwentarz martwy.

Wyszczególnienie	Było na początku roku	Jest w końcu roku	Wartość sztuki		Wartość ogółem	
	sztuk		K.	gr.	K.	gr.

L.	PRZYCHÓD	K.	gr.
	Z czynszów, dzierżaw		
	Z ziemiopłodów: zboże		
	nasiona, koniczyna . .		
	okopowe		
	Za sprzedane zwierzęta: konie .		
	bydło . .		
	owce . .		
	świnie . .		
	Za nabiał		
	Za drób		
	Z ogrodu		
	Za drzewo		
	Za ściółkę		
	Z		
	Z		
	Z		
	Z		
	Z		
	Z		
	Nadzwyczajne		
	Wartość budynków z końc. roku		
	» inwent. żyw. » »		
	» » martw. » »		
	» zapasów w produktach		
	Przychód ogółem . .		
	Rozchód		
	Zysk		

ROCZNY.

L.	ROZCHÓD	K.	gr.
	Podatki		
	Melioracye		
	Zarząd		
	Pensye i najem		
	Kupno inwentarza żywego . . .		
	Kupno nasion		
	Kupno nawozów		
	Kupno machin i narzędzi . .		
	Kupno materyałów rzemieśl. . .		
	Zapłata rzemieślników		
	Utrzymanie ogrodów		
	Utrzymanie drobiu		
	Utrzymanie mleczarni		
	....		
	....		
	....		
	....		
	Nadzwyczajne		
	Wartość budowli w pocz. roku .		
	» inwent. żyw. » »		
	» » martw. » »		
	» zapasów w produktach		
	Rozchód ogółem . .		

Spłaciłem w r. 19

Nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	K.	gr.

Winien jestem.

Nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	K.	gr.
1	Winien jestem w końcu r. 19......		
2	Zaciągnięto pożyczkę od		
3	Wzięto na kredyt		

ADRESY.

Nazwisko	Miejsce zamieszkania	Stacya pocztowa i kolejowa

ADRESY.

Nazwisko	Miejsce zamieszkania	Stacya pocztowa i kolejowa

Uwagi i wskazówki co do uprawy gleby i roślin

przez prof. J. M. Pomorskiego.

Chcąc podnieść swe gospodarstwo przez ulepszenie produkcyi rolnej, *rolnik winien przedewszystkiem rozważyć następujące punkty:*

1. Jak uregulowane są stosunki wilgotności gleby? Czy nie jest ona za wilgotną? a więc czy poziom wody gruntowej nie jest za wysokim? Czy woda gruntowa i powierzchniowa mają należyty odpływ? Uregulowanie wilgotności gleby jest podstawą racyonalnego rolnictwa i gdzie mamy jakieś nieprawidłowości pod tym względem, działalność naszą zaczynać musimy od melyoracyi.

Odwodnienie uskutecznić możemy za pomocą 1. drenowania, 2. rowów otwartych, 3. uprawy i systemu rowów według metody Korzybskiego.

Drenowanie jest najlepszym sposobem odwodnienia, najdroższym w założeniu, lecz najtańszym w utrzymaniu. Rowy otwarte mniej kosztują na razie, lecz utrzymanie ich jest drogiem. Powodują stratę znacznej części powierzchni użytkowej pola i przyczyniają się do zachwaszczania pola. Metoda Korzybskiego orki w kierunku długiego spadku pola i rowów rozorywanych posiada wyższość nad rowami otwartymi i doskonale odprowadza wodę powierzchniową. Wymaga podobnie jak inne sposoby odwodnienia — przeprowadzenia niwelacyi pól.

Przy drenowaniu, rurki ssące zakłada się w liniach: odległych od siebie na 10—35 m. zależnie od zwięzłości gleby; nie dłuższych nad 200 m. Muszą mieć spad 0.2—0.3 m. na 100 m. bieżących. Głębokość drenów 1.2—1.5 m. Wyloty drenów zbierających powinny być zabezpieczone od zanieczyszczania się i włażenia żab. Drenowanie nie powinno przechodzić blisko drzew. Na polu drenowanem nie powinno się uprawiać w 1-ym roku buraków i rzepaku, celem uniknięcia zatkania drenów przez korzenie.

Zależnie od gęstości potrzebnej sączków, drenowanie kosztuje w Galicyi 70—140 koron mórg.

Rowy mogą mieć mniejszy spadek jak dreny. Łąki i torfowiska odwadnia się zwykle rowami, dając je w odległości 20—50 m. Spód rowu powinien mieć przynajmniej 30 cm. szerokości. Rowy nie powinny się stykać jedne z drugimi pod ostrym kątem. Rowy do głębokości 15 cm. kopie się o prostopadłych ścianach. Nachylenie ścian rowu zależy od gatunku gleby i szybkości prądu. Daje się szerokość wierzchu rowu równą:

przy glebach torfowych, murszach	2	do	7	szerok. dna rowu
» » piaszczystych	4	»	7	» » »
» » glinkowatych	3	»	5	» » »
» » ciężkich gliniastych	$1^1/_2$	»	3	» » »

Głębokość rowu zależy od tego, do jakiego stopnia chcemy obniżyć poziom wody gruntowej.

Poziom wody gruntowej wynosić powinien:

dla łąk	0.50—0.75	od naziomu
dla pól uprawnych	0.75—1.25	» »
w ogrodach	1.00—2.30	» »

2. Czy dba dostatecznie o utrzymanie i podniesienie żyzności gleby. Żyzność gleby polega na tem, jak wielkie są w niej za-

soby pokarmów roślinnych, a następnie, o ile te pokarmy są dostępne dla roślin. Ten drugi wzgląd jest bardzo ważnym, i z tego powodu, analiza chemiczna gleby, nie będąca w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaka część składników gleby może być łatwo przez rośliny pobraną, daje nam tylko ogólnikowy obraz zasobów gleby, ale nie może być miarą żyzności gleby. Tylko w wyjątkowych wypadkach dostarcza nam jakichś wskazówek czem ziemię nawozić trzeba. Jeśli weźmiemy pod uwagę warstwę roli głęboką tylko na 20 cm., to znajdujemy na naszych glinkach, na morgu masę ziemi ważącą około 15.000 q. i zawierającą przy przeciętnym składzie ziemi 1.500 kg. kwasu fosforowego, 1.500 kg. azotu, a do 15.000 kg. potasu. Wobec tych liczb, niezmiernie małemi wydadzą się nam te, które wyciąga z ziemi największy chociażby plon. N. p. plon pszenicy z 16 q. ziarna i 40 q. słomy, zabiera przeciętnie 54 kg. azotu, 22 kg. kwasu fosforowego i 26 kg. potasu z morga ziemi. Na ileżby to plonów wystarczyło, gdyby cały zasób gleby był łatwo pobieralnym! A że tak nie jest przekonywa nas praktyka — musimy ziemię nawozić, wzmagać jej zasoby przez obornik, nawozy kupne i t. p. Jest to środek łatwiejszy do zastosowania, prędzej działający, ale rolnik powinien obok niego nie zapominać o środkach innych, mających na celu uruchomienie skarbów gleby. Do nich należą: przedewszystkiem uprawa, wszelkie melyoracye polegające głównie na uregulowaniu stosunków wilgotności i przewiewności gleby. Jeśli potrafimy udostępnić większą ilość martwych zasobów gleby, tem samem ograniczamy potrzebę nawożenia.

Żyzność gleb.

To co mienimy dobrocią, żyznością gleby, polega na dostarczaniu roślinom obfitości pokarmów i odpowiednich warunków fizykalnych. Żyzność gleby może byc naturalną albo też nabytą. Nabywa żyzności gleba przez uprawę — nawożenie — uprawę roślin wzbogacających glebę. Nabyć żyzności trwałej gleba odrazu nie może. Nagromadza się ona powoli, można ją utrzymywać, można ją i zniszczyć przez brak starania. Wpływ uprawy na żyzność gleby polega na uruchomieniu zasobów istniejących już w roli. Im rola jest z natury żyźniejszą, tem więcej możemy osiągnąć odpowiednią uprawą, ale tylko do pewnego stopnia, na ile bogactwo ziemi pozwala.

Mechaniczna uprawa gleby.

Pług, oprócz wymieszywania gleby, ułatwia dostęp powietrza do gleby, ułatwia wsiąkanie wody, ułatwia rozwój korzeni roślin. Ale pług wzmaga parowanie, suszy więc rolę silniej jak radło, ekstyrpator, kultywator i t. p. Zasadą powinno być uzyskanie odpowiedniego stanu roli możliwie najmniejszą liczbą orek. W letniej porze za pługiem powinna iść zaraz brona.

Głębokość orki zależy od rodzaju gleby, siły nawozowej gleby i t. p. W większości wypadków, lecz nie wszędzie, dążenie do pogłębienia orki będzie racyonalnem. Pogłębienie orki jest kosztownem, bo wymaga liczniejszego sprzężaju, droższych narzędzi — pogłębienie orki powinno być przedsiębranem powoli i pod zimę. Orkę do 10 cm. nazywamy płytką; 10—20 cm. jest głębokość normalna; powyżej 20 cm. nazywamy orkę głęboką. W glebie średnio zwięzłej z wykluczeniem bardzo spoistych

glin zarówno jak i skrajnych piaszczystych gleb potrzebna siła pociągowa na 100 cm.[2] przekroju skiby wynosi:

Głębokość orki:	0.15—0.20	0.21—0.30	0.31—0.35 cm.
Potrzebna siła pociągowa kilogramometrów	30—35	40—45	50—55

(75 kilogramometrów=1 koń parowy).

Jeden pług zorze średnio (według Kraffta):

Przy podorywce ścierni	6—10 cm.	—	0.30—0.70 ha
	15—18 »	—	0.20—0.30 »
» zwyklej orce	15—18 »	—	0.20—0.50 »
» głębokiej orce	20—30 »	—	0.30—0.50 »
» orce z kopaniem bruzdy (4 konie, 8 ludzi z łopatami)	30—40 »	—	0.25—0.50 »

Przy zaprzęgu wołami wydajność roboty do 25% mniejsza.

Pług parowy dwumaszynowy	30—40 cm.	—	4 ha
	15—21 »	—	5.6 »

Do orki miejsc górzystych nadają się specyalnie pługi z odkładnicą odwracaną. — Oprócz narzędzi tego typu budowanych przez firmy zamiejscowe, zwracamy uwagę na pługi odwracane, tanie i praktyczne, budowane w okolicy Stryja. (Informacyi udzielić może Stryjski Oddział c. k. Tow. Gospodarskiego.)

Kultywatory, ekstyrpatory, grubery, drapacze i t. p. narzędzia robią na 1 m. szerokości narzędzia 1.5 do 2 ha na 10 godzin pracy.

Zjawiskiem niemal powszechnem jest to, że pługi wychodzące z fabryki orzą zrazu doskonale, a potem coraz gorzej. Szczególniej po poprawkach robionych przez nieumiejętnych kowali. Dzieje się to wskutek wadliwego ustawienia korpusów, lemieszy pługów, a też często wskutek skrzywienia ramy do której korpusy są przymocowywane.

Aby módz pług wieloskibowy skutecznie poprawić należy wtedy, kiedy jeszcze jest nowy:

1. Zbić sobie z łat mocną formę ramy.

2. Na desce wyheblowanej naznaczyć przybitemi listewkami położenie lemieszy i oznaczyć na niej pionem punkty, które mają przypadać pod kąty ramy.

3. Do deski przymocować słupki odpowiednio wysokie, na punktach przypadających pod końce ramy, kiedy lemiesze są prawidłowo ustawione na desce.

Posiadając taki szablon należy sprawdzać kształty pługa i doprowadzać do pierwotnego stanu. Samo się rozumie, że dla dobrej orki potrzeba, aby lemiesz był odpowiedniego kształtu (wyklepywanie na specyalnych kowadełkach) dobrze i gładko połączony z odkładnicą i dobrze ustawiony t. j. nie nadto zagłębiony i nie wysunięty w pole.

Brona powstrzymuje utratę wilgoci, choć wysusza wierzchnią warstwę roli. Bronowanie orki na zimę jest nieracyonalnem — gdyż przez to zatrzymuje się mniej śniegu na powierzchni roli, a zarazem mróz nie wywiera na zrównane skiby tak silnego działania. Bronowanie zbytnio rolę rozpylające jest niebezpiecznem ze względu na wytwarzanie skorupy, wskutek każdego, nieco większego deszczu. Z tego względu, jak również i dla bardzo ważnego dla ozimin przykrycia śniegiem, korzystniejszem jest umiarkowanie zbryloną powierzchnia.

Na uwagę zasługują brony talerzowe, krające powierzchnię

roli i brony sprężynowe (Osborne'a). Mogą one zastępować wieloskibowe pługi przy uprawie ściernisk.

Włóczka. Każde gospodarstwo powinno mieć brony lżejsze i cięższe, do rozmaitych celów służące.

Para koni w bronach robi w 10 godzinach 1.7 do 2.3 ha
Przy lekkim gruncie » » » » 2.3 » 3.0 »
Włóką zrobić można » » » 4.0 »

Włóka. Narzędzie u nas mało znane, naśladujące działanie brony odwróconej. Włóka nie ma zębów, lecz połączone łańcuszkami poprzeczne beleczki żelazne lub drewniane. Włóka rozbija bryły lepiej jak brona. Wyrównuje lepiej powierzchnię, wzrusza doskonale wytworzoną skorupę i wymaga mniej siły pociągowej jak brona. Jest szczególnie przydatną na wiosnę dla wzruszenia roli oraz wyrównania jej pod siewnik, dla niszczenia wytworzonej skorupy.

Walec. Jego działanie jest wręcz przeciwne bronie. Zwiększa utratę wilgoci — przez wzmożenie parowania, lecz czasowo, wierzchnie warstwy mogą być wilgotniejsze kosztem warstw spodnich. Walec powoduje ugniecenie warstw ziemi; używamy go więc tam gdzie nam chodzi o przyspieszenie uleżenia się ziemi. Ze względu na wysuszenie ziemi, dobrze jest po zwalcowaniu wzruszyć wierzchnią warstewkę roli za pomocą włóki lub lekkiej brony.

Działanie walca na 1 m. szerokości w 10 godzinach około 2 ha.

Narzędzia służące do upraw posiewnych. Oprócz narzędzi sprzężajnych jak bron, radełek, pielników i t. p. zwrócić uwagę należy na podobnież narzędzia ręczne. Szczególniej amerykańskie (Planet Junior) budowane bardzo silnie i zużywające względnie mało siły. Przy używanych u nas narzędziach do upraw posiewnych, szczególniej buraków, popełnianym bywa często ten błąd, że się zbyt prędko roślinę wysoko obsypuje, a przez to następne roboty nie mogą być odpowiednio skutecznymi.

Pielniki i radełka jednorzędowe robią dziennie 1 — 1.2 ha.

Nawożenie.

Powszechny system nawożenia, oparty na oborniku bez dokupna pasz i ściółki jest co do swej treści wzbogacaniem ziemi w części organiczne i azot w miarę uprawy roślin motylkowych. Co do składników popiołowych jest on tylko skupianiem pokarmów roślinnych na pewien punkt, lecz to co ziemia dostanie jednego roku oddaje roślinom przez szereg lat. Każdy system nawożenia jest do pewnego stopnia uruchomiającym zasoby naturalne gleby, a więc n. p. wapnowanie, gipsowanie, a też saletrowanie, kainitowanie i t. p. Wszystkie te ciała dodane ziemi wycieśniają inne związki. Każde nawożenie środkami zakupywanymi z zewnątrz gospodarstwa, czy to w formie karmy dla bydła, czy ściółki, czy też wreszcie w postaci nawozów kupnych wzbogacaniem jest gleby, podniesieniem naturalnych warunków jej żyzności. Tego rodzaju nawożenie pomnaża zawsze kapitały ziemi, ale błędnym byłby rachunek, w którym byśmy obliczali wartość wzmożenia żyzności ziemi ilością pieniędzy wydanych na zakupno środków nawozowych. Trzeba bowiem rozróżniać w zasobach pokarmów roślinnych w glebie zapas i kapitał obrotowy. Nawozy wzbogacają ową cenniejszą część mianowicie kapitał obrotowy, lecz

niezużyty, większy ich zapas przechodzi w formę zapasową — mniej wartościową.

Każde nawożenie jest zbytecznem jeśli bez niego da się osiągnąć równie wysoki plon. Nawożenie jest uzupełnieniem braków roli. Zawsze więc musi być brane pod uwagę to co roślina znaleźć w glebie może. Brak gleby pod względem jakiegoś pokarmu roślinnego może być stały (trwały) tj. ziemia nie może dać dostatecznej ilości pokarmu roślinie, i czasowy, przejściowy, roślinie brakuje pokarmu tylko w pewnym okresie życia i przechodzi później, czy to wskutek tego, że roślina potrzebuje tylko w tym pierwszym okresie większych ilości pewnego pokarmu, czy też, że w glebie, może w innej porze roku, odbywają się procesy uruchomiające znaczniejszą część kapitału zapasowego.

Nawożenie działać może korzystnie pośrednio przez pobudzenie rośliny do obfitszego wytworzenia korzeni. Przez to potęgują się zdolności pobierania pokarmów przez roślinę i tem tłomaczyć sobie należy często korzystne oddziaływania małych dawek pewnego, jednostronnego nawozu danego w pierwszym okresie rozwoju rośliny, nawet na glebach, nie cierpiących na brak danego pokarmu. Takiem n. p. jest często działanie superfosfatu na buraki cukrowe.

Przeciętny skład chemiczny nawozów (według E. Wolffa).

Rodzaj nawozu	Wody	Mat. organicz.	Azotu ogółem	Azotu amonjak.	Kw. fosfor. ogółem	Kw. fosfor. rozp. w wodzie	Tlenku potas.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnowego	Kwasu siarkowego	Chloru i fluoru
I. Odchody zwierzęce.	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Świeży obornik (wraz ze ściółką) koński	713	254	5.8	2.0	2.8	—	5.3	2.1	1.4	0.7	0.4
Świeży obornik (wraz ze ściółką) bydlęcy	775	203	3.4	1.0	1.6	—	4.0	3.1	1.1	0.6	1.0
Świeży obornik (wraz ze ściółką) owczy	646	318	8.3	2.2	2.3	—	6.7	3.3	1.8	1.5	1.7
Świeży obornik świński	724	250	4.5	0.8	1.9	—	6.0	0.8	0.9	0.8	1.7
Obornik świeży przeciętnie	750	212	3.9	1.2	1.8	—	4.5	4.9	1.2	1.0	1.3
Obornik średnio przegniły przecięt.	750	192	5.0	1.1	2.6	—	6.3	7.0	1.8	1.6	1.9
Obornik bardzo przegniły przeciętnie	790	145	5.8	1.2	3.0	—	5.0	8.8	1.8	1.3	1.6
Gnojówka (z gnojowni)	982	7	1.5	1.3	0.1	—	4.9	0.3	0.4	0.7	1.2

Rodzaj nawozu	Wody	Mat. organicz.	Azotu ogółem	Azotu Amonjak.	Kw. fosfor. ogółem	Kw. fosfor. rozp. w wodzie	Tlenku potas.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnowego	Kwasu siarkowego	Chloru i fluoru
	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Ludzkie odchody stałe świeże	772	196	13.0	0.0	11.6	0.0	4.0	6.2	3.6	0.8	0.4
Ludzki mocz świeży	995	33	8.0	0.0	1.6	1.6	1.9	0.2	0.2	0.4	5.0
Mieszanina obydwu w stanie świeżym	937	49	8.5	0.0	2.6	1.4	2.1	0.8	0.6	0.5	4.0
Ludzkie odchody z dołów kloacznych	964	27.7	3.7	1.1	1.6	—	1.5	1.0	0.6	0.4	4.5
Ludzkie odchody z klozetów	923	55.4	7.5	4.3	2.7	1.2	2.9	1.8	0.9	0.5	—
Ludzkie odchody wymięszane ze śmieciami	523	151	5.6	2.7	5.5	1.3	4.3	17.9	3.2	6.1	3.0
Ludzkie odchody wymięszane z proszkiem torfow.	824	144	8.3	2.4	3.7	1.3	3.4	0.6	0.8	—	3.1
Świeże odchody kaczek	566	262	10.0	—	14.0	—	6.2	17.0	3.5	3.5	—
Świeże odchody gęsi	771	134	5.5	—	5.4	—	9.5	8.4	2.0	1.4	—
Świeże odchody kur	560	255	16.3	—	15.4	—	8.5	24.0	7.4	4.5	—
Świeże odchody gołębi	519	308	17.6	—	17.8	—	10.0	16.0	5.0	3.3	—
2. Sztuczne nawozy i sole.	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Superfosfat z fosforytów	10.0	—	—	—	19.0	18.0	—	23.0	—	26.0	—
Superfosfat z kości	13.0	23.8	0.5	—	20.0	19.0	0.1	24.4	0.7	17.5	—
„ z węgli kostnych	15.0	7.0	0.25	—	16.0	15.0	—	25.0	0.7	22.0	—
Żużle Thomasa (*rozp. w kw. cytr.)	—	—	—	—	17.5	13.0*	—	48.3	4.9	0.3	15.2
Mąka kostna	6.0	30.3	4.0	—	21.0	—	0.2	31.3	1.0	0.1	—
„ „ parzona	—	—	3.5	—	20	—	—	—	—	—	—
„ „ preparowana	—	—	1.5-2	—	16	10-14	—	—	—	—	—
Węgiel kostny	8.0	8.0	0.7	—	25.0	—	0.1	40.0	1.1	0.1	—
Popiół kostny	6.0	3.0	—	—	35.4	—	0.3	46.0	1.2	0.4	—
Mączka rogowa	8.5	68.5	10.2	—	5.5	—	—	6.6	0.3	0.9	—
Saletra chilijska	2.6	—	15.5	—	—	—	—	0.4	—	0.7	1.1
Siarkan amonowy	4.0	—	20.5	—	—	—	—	0.5	—	58.0	1.4
Kainit kałuski	16.5	—	—	—	—	—	9-12	0.5	11.5	23.5	25.0
40% sól potasowa	9.6	—	—	—	—	—	40.4	1.0	2.3	5.0	36.5

Rodzaj nawozu	Wody	Mat. organicz.	Azotu ogółem	Azotu Amonjak.	Kw. fosfor. ogółem	Kw. fosfor. rozp. w wodzie	Tlenku potas.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnowego	Kwasu siarkowego	Chloru i fluoru
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Skoncentrowany nawóz bydlęcy (t. zw. Rinder guano)	12.5	53.9	3.3	—	4.5	—	1.5	1.9	1.8	—	—
Fosforan potasowy	—	—	—	—	43	—	26	—	—	—	—
Gips	20.0	—	—	—	—	—	—	31.0	0.1	44.0	—
» fosfatowy	18.6	—	—	—	5.7	—	—	18.4	0.3	25.4	2.5
Fosforan wapniowy	27.7	12.6	1.5	—	19.5	—	0.1	29.3	1.0	1.2	—
3. Odpadki, popioły itp.											
Wapno satur. z cukrowni	43.3	15.3	0.4	—	1.2	—	0.2	21.6	0.3	0.3	—
Błoto osadowe z kanalizacyi	8.0	29.0	3.0	—	1.3	1.0	0.6	20.0	—	—	—
Odpadki z garbarni	63.3	17.9	1.4	—	1.3	—	—	13.2	0.3	—	—
Pył i odpadki wełny	10.0	56.0	5.2	—	1.3	—	0.3	1.4	0.3	0.5	—
Mączka ze krwi	13.4	78.4	11.8	—	1.2	—	0.7	0.8	0.2	0.6	—
Pudretta	86.0	—	7.4	—	2.7	—	2.7	—	—	18.0	—
Popiół z drzew liściastych	5.0	5.0	—	—	3.5	—	10.0	30.0	5.0	1.6	0.3
Popiół z drzew iglastych	5.0	5.0	—	—	2.5	—	6.0	35.0	6.0	1.6	0.3
Popiół z węgla brunatnego	—	—	—	—	0.6	—	0.7	16.0	1.9	10.4	—
Popiół z węgla kamiennego	—	—	—	—	0.2	—	0.2	3.5	0.8	1.0	—
Popiół z torfu	5.0	—	—	—	1.2	—	0.5	45.7	0.5	4.4	0.6
Sadze z drzewa	5.0	71.8	1.3	—	0.4	—	2.4	10.0	1.5	0.3	—
» z węgli kamiennych	5.0	66.9	2.4	—	0.4	—	0.1	4.0	1.5	1.7	—
Proszek z padliny	5.7	56.9	6.5	—	13.9	—	0.3	18.2	0.4	1.0	—
Chrabąszcze świeże	70.6	24.6	3.5	—	0.6	—	0.5	0.1	0.1	—	—
Guano rybie	9.8	56.2	8.5	—	13.8	—	0.3	16.0	0.9	0.5	—
» Fray Bentos	8.0	49.1	5.8	—	17.4	—	0.3	22.3	—	0.2	—

Gospodarstwo obornikowe.

Za podstawę do oceny systemu nawożenia obornikowego — należy brać w rachubę ilość utrzymywanego inwentarza w stosunku do przestrzeni nawożonej, a lepiej jeszcze ilość paszy i ściółki używanej w stosunku do przestrzeni, redukując odpowiednio użytki pastwiskowe. Licząc wagę żywą bydła rogatego sztuki dorosłej na 500 kg.; jałownika 250 kg.; cielęcia 125 kg.; owcy 50 kg. i redukując ze względu na stratę nawozu liczbę bydląt pociągowych do połowy, uważać możemy, że w naszych warunkach:

produkcya obornika jest:	jeśli 1 sztuka bydła przypada na:
bardzo słaba	8 i mniej morgów
słaba	6 — 8 »
normalna	4 — 6 »
silna	mniej niż 4 morgi.

Obliczenia ilości obornika: Przyjmując przeciętną wagę zwierząt i dobre żywienie, ilość wyprodukowanego, średnio rozłożonego obornika w roku wynosi:

Krowa utrzymywana na stajni przez rok cały daje około	120 q — czyli około		20 fur obornika
Krowa utrzymywana w lecie na pastwisku daje około	75 q —	» »	12 » »
Wół opasowy	160 q —	» »	28 » »
„ roboczy z odliczeniem strat	80—100 q —	» »	13—17 » »
Koń roboczy z odliczeniem strat	50— 80 q —	» »	15 » »
Owca (latem na pastwisku)	6 q —	» »	1—1.5 » »
Świnia	12— 18 q —	» »	2—3 » »

Dokładniejsze obliczenie ilości obornika jest na podstawie skarmionej paszy i użytej ściółki. Połowa mniej więcej organicznej substancyi karmy przechodzi do nawozu, a ponieważ przyjąć możemy, że przeciętnie obornik zawiera 75% wody, więc ilość obornika otrzymujemy przez pomnożenie połowy suchej substancyi skarmionej paszy i całej zużytej ściółki przez 4, np.: skarmiono 150 q koniczyny z 88% suchej substancyi, czyli 132 q suchej substancyi, i użyto na podściół 60 q słomy z 90% suchej substancyi, czyli 54 q suchej substancyi: więc ilość obornika przedstawia się: 61+54=115×4=460 q.

Jakość obornika zależy od jakości paszy i spotrzebowania jej przez zwierzęta i sposobu przechowania. W organizmie zwierzęcym przez oddychanie i trawienie spala się przeciętnie około 54% organicznych części, 46% przechodzi do kału i moczu. Odchody zwierząt zawierają całkowitą ilość pobranego azotu, o ile nie osadzają go w swym ciele w postaci mięsa, (młode zwierzęta i opasy) lub wydzielają w postaci mleka. Obornik tem bogatszy jest w azot, im treściwsza karma zwierząt. Krowy dojne wydzielają w przybliżeniu 12% azotu mniej, niż go pobierają. Przeciętnie połowa azotu odchodów zawartą jest w moczu. Potas, sód, wydzielane są prawie wyłącznie moczem u krów i owiec, a przytem nie wapna. U koni mocz zawiera 67% potasu i 60% wapna wydzielonego wogóle przez odchody. Bardzo niewielka część związków mineralnych zostaje osadzoną w ciele zwierzęcia.

	azotu	kwasu fosfor.	potasu	wapna	magnu
W 1000 cz. kg. mleka znajduje się .	5.4	2.0	1.7	1.7	0.2
W 1000 cz. kg. przyrostu wagi bydła opasowego	11.6	1.3	1.2	0.1	0.1
W 1000 cz. kg. przyrostu bydła młodego	25.8	16.2	2.1	18.6	0.6

Wskutek tej, tak wielkiej zależności składu chemicznego

obornika od żywienia, liczby przeciętne podane powyżej mają małe tylko znaczenie i służyć mogą jako oryentacya, lecz nigdy jako podstawa do obliczenia.

Zbieranie obornika. Słomy daje się na ściółkę $\frac{1}{3}$—$\frac{1}{4}$ wagi suchej substancyi karmy. Ilość słomy na ściółkę wynosi dziennie:

na bydlę wagi 500 kg.	$2\frac{1}{2}$— 5 kg.	
» konia	2 — 3	»
» owcę	0.1 —0.2	»

Przy stosowaniu ziemi, na sztukę bydła daje się dziennie około 100 kg. ziemi; ściółki torfowej daje się 3 kg. na sztukę bydła; na konia 2—$2\frac{1}{2}$ kg.; na owcę 0.2 — a na świnię 0.5—0.75 kg.

Przechowywanie pod bydłem jest stanowczo najlepszym, najtańszym i najłatwiejszym do przeprowadzenia sposobem przechowywania obornika, o ile mamy odpowiednie ku temu budynki. Przy odpowiedniej wysokości budynku, dobrej wentylacyi, sposób ten nie jest bynajmniej niehygienicznym dla zwierząt, ani też nie wpływa ujemnie na smak mleka. Koniecznym warunkiem oprócz odpowiedniej wysokości budynku — są żłoby przestawiane tak, aby cały obornik był równomiernie wymieszanym i udeptanym. Obornik pod bydłem może leżeć w warstwie grubej na 1—$1\frac{1}{2}$ metra. Spód obory powinien być nieprzepuszczalnym, tak jak na gnojowniku. Obornik z pod bydła jest mniej rozłożonym, jak obornik z gnojowni. Utrzymywanie koni na gnoju w lecie nie zaleca się ze względów hygienicznych. W owczarniach zaleca się gnój zlewać wodą.

Przechowywanie na gnojowni. Gnojownia powinna leżeć w pobliżu budynków inwentarskich; być ochronioną od zalewu wodą z dachów i miejsc wyższych; być zabezpieczoną od działania silnych promieni słonecznych (obsadzenie drzewami) i wiatrów. Tło gnojowni powinno być nieprzepuszczalne; najlepsze z betonu (40 cm.), lub kamieni na zaprawie cementowej. Ze względów oszczędności dawać można tło z iłu na 30 cm. ubitego, tak jak na klepisku. Tło winno mieć spad w jednym lub w dwóch kierunkach (5%). Na najniższych punktach winny być pozakładane zbiorniki do gnojówki, których dna należy zrobić niżej od podłogi stajni na 0.5 do 1 m. dla dobrego spływu gnojówki. Gnojownia p. b. wgłębioną na 0.5 do 1 m.; p. b. otoczoną murem wznoszącym się naokoło na wysokości 50 cm. Gnojownia p. b. ogrodzoną, aby można było na nią wypuszczać bydło dla tratowania nawozu.

Przy grubości warstwy nawozu na gnojowni $1\frac{1}{2}$ m. potrzeba by było około 16 do 20 $m.^2$ powierzchni gnojownika gdybyśmy chcieli obornik wywozić tylko raz w rok w pole; przy częstszej wywózce wystarcza odpowiednio mniejsza powierzchnia. U nas wywozi się zwykle 3 do 4 razy obornik, więc wystarczy średnio powierzchnia gnojowni 4—5—6 m^2 na sztukę dorosłą bydła.

1 $m.^3$ obornika waży około 850 kg.

Wielkość zbiornika na gnojówkę wynosić powinna na jedną wielką sztukę bydła 0.4—0.5 $m.^3$ czyli przy głębokości zbiornika na 1.5 m. powierzchnia zbiornika wynosić powinna około $\frac{1}{20}$ powierzchni gnojownika. Liczby te zależnemi są od opadów atmosferycznych, czasu przez jaki obornik leży na gnojowni i t. p.

Obchodzenie się z obornikiem na gnojowni. 1. Obornik wywożony na gnojownię nie powinien być rozrzucony na zbyt wielkiej powierzchni, przez co wysycha. Układać go należy warstwami nie pozostawiając pustych zagłębień.

2. Nawóz rozmaitych zwierząt należy wymieszywać z sobą.

3. Główny nacisk kłaść należy, na silne udeptywanie nawozu przez wypuszczanie bydła na gnojownię lub też przez walcowanie ciężkim, żelaznym walcem.

4. Obornik powinien być utrzymany w stanie umiarkowanej wilgotności przez zwilżanie gnojówką. Jeśli gnojówki zbyt mało, należy zlewać go wodą.

5. Wysokość warstwy nawozu na gnojowniku wynosić powinna pomiędzy $1^1/_2$ a $2^1/_2$ m. Według nowszych badań, obornik w wysokich a prawidłowo wilgotnie utrzymywanych kupach, przechowywuje się lepiej.

Używanie środków konserwujących. Torf jako dodatek do podściołu jest doskonałym środkiem konserwującym. W połączeniu ze słomą zapewnia czyste utrzymanie inwentarza. Praktycznem jest podsypywanie torfem pod zady zwierząt i wypełnianie rynien ściekowych dla gnojówki torfem, który codziennie wymiatać należy. W tym celu wystarczy $^1/_3$ do $^1/_2$ podanych wyżej ilości. (Str. 283).

Na gnojowni przesypywać nawóz warstwami torfu na 10—15 cm.

2. Używanie superfosfatu, kainitu nie zaleca się.

3. Margiel w ilości 3—5% wagi obornika, przesypując nim obornik na gnojowni.

Na sztukę dorosłą bydła i 1 dzień wypada 3.5 do 7 kg. marglu. Z dobrym skutkiem stosowanym być może suchy szlam saturacyjny z cukrowni.

4. Ziemia w celu przesypywania i pokrywania obornika. Ziemia lekka próchniczna jest najlepszą, przesypywać warstewkami ziemi. grubemi na 5—10 cm.

5. Gips w stajniach z częstą wywózką gnoju. Na konia $^1/_2$ do 1 kg. dziennie.

6. Przy przechowywaniu obornika pod bydłem używanie wszelkich środków konserwujących jest zbytecznem.

7. Przy przechowywaniu gnojówki w nieprzepuszczalnych studniach dbać tylko należy o możliwe ograniczenie przewiewności. Używanie środków konserwujących jest zbyteczne.

Zlewać, wywozić obornik w pole winno się w stanie wilgotnym (gnojówką). Najlepiej przyorać go zaraz, lub złożyć w wielkie i wysokie stosy i przykryć ziemią grubo w celu utrzymania wilgotności. W razie potrzeby zlewać wodą lub gnojówką.

Przy przechowywaniu obornik traci średnio w ciągu 2—3 miesięcy 20% swej wagi.

Dawki obornika: Nawożenie słabe niżej 100 q. na morg, nawożenie normalne około 180 q. — czyli 30 fur; silne powyżej tej liczby.

Przez normalne nawożenie obornikiem umiarkowanie wilgotnym dajemy na morg:

3460	kg.	organicznej substancyi,
90	»	azotu
47	»	kwasu fosforowego
113	»	potasu
88	»	wapna.

Kompost. Przygotowanie kompostu trwa, zależnie od materyałów użytych, od kilku miesięcy do dwóch lat. Z tego powodu kompostować materyały rozmaicie szybko rozkładające się — osobno. Kompost składa się z odpadków roślinnych, zwierzęcych i t. p. i ziemi. Jako ziemie na kompost najodpowiedniejsze: próchniczna, obfitująca w wapno, marglowa. Każda kupa kompostowa p. b. przykrytą dobrze grubą warstwą ziemi. Kształt kupy komp. podłużny, nie szeroki, wysokości na $1^1/_2$—2 m. Przerabianie kupy kompostowej ma na celu wymieszanie całej masy, względnie, umieszczenie warstw wierzchnich, nierozkładających się w środku kupy, gdzie warunki rozkładu lepsze. Dojrzałym kompost jest wtedy, kiedy całość przedstawia jednolitą masę, materyał użyty utracił swoją strukturę. Nie przerabiać kompostu za często. Rośliny kompostować w stanie możliwie świeżym, przesypując je warstwami ziemi. Słoma i materyały suche, muszą być zlewane gnojówką, wodą i t. p. dla pobudzenia rozkładu dobrze jest dodawać warstwami małą ilość obornika, zlewać wodą z wychodczynami, z rozpuszczonymi makuchami i t. p.

Padlinę chrabąszcze i t. p. (kompostować porąbawszy ją na małe kawałki) przesypywaniem 5—8% świeżo zgaszonego na proszek wapna i przykrywając grubo ziemią. **Krew:** dodaje się 4—5% świeżo gaszonego wapna i suszy w płaskich naczyniach, lub zlewa nią kupę kompostową. **Kości** metodą Engelhardta: 100 kg. kości, warstwami 30 kg. wapna niegaszonego, 200 kg. popiołu drzewnego i wody 180 kg. w dole wyłożonym deskami, kadzi i t. p. Kiedy kości staną się kruche, wyrzuca się je, przerabia i suszy na powietrzu masę miałką łatwą do rozsiewu.

Nawozy pomocnicze. Użycie nawozów pomocniczych opierać się winno na uprzedniej próbie wykonanej na małą skalę. Wystarczyć może do pewnych celów doświadczenie wykonane na niewielkiej liczbie poletek, nawożąc pewne z nich nawozem, którego działanie chcemy wypróbować; lecz chcąc poznać dokładnie braki ziemi należy przeprowadzić systematyczne doświadczenie według szematu przyjętego przez krajową stacyę doświadczalną chemiczno-rolniczą w Dublanach, który podajemy niżej.

1. Przestrzeń potrzebna wynosi: 16 poletek po 100 lub 200 m², czyli ogółem 1600 lub 3200 m², oprócz ścieżek na 1 m. szerokich, które należy pozostawić pomiędzy pojedynczemi poletkami.


2. Część niwy użyta do doświadczenia powinna być o ile możności jednolitą, co do gatunku ziemi, przepuszczalności i t. p.

3. Należy wybrać dla doświadczenia pole nienawożone obornikiem, lub jakim innym nawozem — przynajmniej od trzech lat — jeśli chodzi o poznanie potrzeb nawozowych gleby.

4. Ze względu, że brzegi pola są wystawione na szkody, a zarazem zwykle przedstawiają znaczne różnice co do uprawy i wynawożenia, próbne poletka wyznaczyć należy przynajmniej w odległości 10 m. od dróg i miedz.

5. Kształt pojedynczego poletka powinien być podługowaty 8 względnie 4 m. szerokości, 25 m. długości. Najlepiej wyciąć je poprzecznie do kierunku orki.

Poletka powinny postępować za sobą w jednym szeregu i być wynawożone ściśle według podanego na str. 286 planu.



6. Nawożenie:

Poletka L. 1, 6, 11, 16 pozostają nienawiezione,
» L. 2, 7, 12 po 4 kg. saletry,
» 6 » superfosfatu lub 10 kg. żużli Thomasa,
» 10 » kainitu.
» L. 3, 8, 13 » 6 » superfosfatu lub 10 kg. żużli Thomasa,
» 10 » kainitu,
» L. 4, 9, 14 » 4 » saletry,
» 6 » superfosfatu lub 10 kg. żużli Thomasa,
» L. 5, 10, 15 » 4 » saletry,
» 10 » kainitu.

(otrzymują na 200 m²)

(Przy poletkach o innych rozmiarach, należy ilość nawozów odpowiednio zastosować.)

Należy wyważyć na każde poletko nawóz z osobna; wymieszawszy dobrze z suchą ziemią rozsiać tak, aby się dostał tylko na przeznaczone poletko. Kainit, superfosfat i żużle Thomasa należy przyorać na 6—8 cm. głębokości, możliwie wcześnie przed siewem. Szczególniej na ziemiach trudniej przepuszczalnych należy się starać, aby nawozy były wysiane w parę tygodni przed siewem ziarna. Co do saletry, to na ziemiach uboższych i suchszych, połowę saletry dajemy bezpośrednio po siewie ziarn i przykrywamy broną, drugą połowę dajemy kiedy rośliny będą wysokości 10—12 ctm. (koło drugiej połowy maja). Na ziemiach bogatszych, zasobnych w próchnicę, dajemy pierwszą dawkę saletry (2 kg.), kiedy rośliny będą wysokości 10—12 cm. (koło drugiej połowy maja), następne 2 kg. przy kłoszeniu zboża, jako nawożenie pogłówne (rozsiewa się na zboże w dniu spokojnym, po opadnięciu rosy).

7. Wymłócenie plonu powinno się odbyć zaraz po żniwie i ziarno oraz plewy i słomę dokładnie zważyć z każdego poletka osobno.

Przez porównanie zbioru poletek (2, 7, 12) z (3, 8, 13) przekonywujemy się o potrzebach gleby co do azotu. Z (4, 9, 14) o potrzebach co do potasu i t. d. Tego rodzaju doświadczenie daje nam lepszy obraz tego co ziemi brakuje, jak analiza chemiczna. Najpospolitszym i największym brakiem gleb galicyjskich jest niedostatek azotu. Następnie dość pospolitym jest brak kwasu fosforowego. Stosunkowo mniej jest gleb potrzebujących jednostronnie dostarczenia potasu. Na jałowych polach nawozy fosforowe działają przeważnie dopiero w łączności z nawożeniem azotowem, więc obornikiem lub nawozami zielonymi.

Jakie kombinacye nawozowe są odpowiednie dla każdego gruntu wykazać może jedynie próba i doświadczenie, dla tego też rolnik używający nawozów pomocniczych powinien zawsze pozostawiać pewne pasy pola nienawożone a inne nawozić znów odmiennie, aby się przekonywać o tem, czy użyte nawożenie było racyonalnem.

Podajemy poniżej pewne recepty co do ilości stosować się mających nawozów pomocniczych, odpowiednie dla naszych warunków:

Oziminy: a) na oborniku w ugorze, koniczynie, bobiku i innych roślinach azotobierczych — dodatek 100—200 kg. superfosfatu mineralnego (18—36 kg. kwasu fosforowego), lub 150—300 kg. tomasyny (27—54 kg. kwasu fosforowego). Na piaskach, a też na lżejszych glinkach — 200—300 kg. kainitu na morg.

b) po kłosowych lub czystym ugorze: superfosfatu 200 kg., tomasyny 200—300 kg., oprócz tego szczególniej jeśli gleba słabsza na jesieni 30—50 kg. siarkanu amonowego, lub lepiej 50—100 kg. mąki rogowej. Na wiosnę saletry 50—100 kg. Tomasynę zastąpić można do pewnego stopnia mąką kostną parzoną.

Okopowe. Kartofle: Najodpowiedniejszym nawozem jest obornik. Z nawozów pomocniczych: mąka kostna preparowana i parzona 150—200 kg. na morg, lub mąka rogowa 100—150 kg. Nawozów potasowych bezpośrednio używać nie doradzamy.

Buraki: Są najwdzięczniejszą rośliną na nawozy pomocnicze. Obok, lub bez nawożenia obornikiem na jesieni 300—400 kg. kainitu, lub tylko 200, a resztę na wiosnę razem z saletrą — pogłównie w kilku dawkach. Na wiosnę 100—150 kg. superfosfatu płytko podorać. Po wzejściu buraków saletry 25 kg. Po przerwaniu 25—50 kg. Następnie w miarę siły rozwoju buraka i siły pola, jeszcze jedna lub dwie dawki po 25 kg.

Dobrem jest przy nawożeniu obornikiem i odpowiedniem ubóstwie ziemi dać 5—10 q. wapna na jesieni i podorać przed zimą.

Jarzyny. Owies. Opłaca dobrze saletrę oraz wszelkie nawozy azotowe 50—100 kg. w jednej lub kilku dawkach, po zasiewie pogłównie.

Jęczmień. 100 kg. superfosfatu amoniakalnego lub 150 kg. mąki kostnej preparowanej, 200 kg. kainitu.

Koniczyny wieloletnie same lub z trawami — 300—500 kg. kainitu, 150—300 kg. tomasyny, lub 100—200 kg. mąki kostnej odklejonej.

Flancowniki. Rozsadniki buraczane: Oprócz dobrego wynawożenia obornikiem dać na wiosnę 100 kg. superfosfatu lub mąki kostnej preparowanej, 50—100 kg. mąki rogowej — i w miarę siły rozwoju potrząskę z saletry 25 kg. na raz.

Lubin na zielony pognój na lżejszych gruntach 200—300 kg. kainitu, a przy podoraniu pod ozimine nawożenie fosforowe jak wyżej.

Chmiel najodpowiedniejszy obornik i kompost.

Drzewa owocowe (krzewy owocowe). Doradzają dawać na duże drzewo 25 m² 2 kg. kainitu $1^1/_2$ kg. superfosfatu $^1/_2$ kg. saletry chilijskiej w zimie, a na wiosnę w maju oprócz tego jeszcze $^1/_4$ do $^1/_2$ kg. saletry, lub 2 kg. mąki rogowej.

Z krzewów owocowych:

Róże, kwiaty, truskawki: mąka rogowa; mąka kostna ferment.; makuchy ferment. obok zwykłej dobrej dawki obornika

Agrest jest bardziej wrażliwym na nawozy potasowe (kainit) jak porzeczka.

Oprócz nawozów sztucznych drzewa owocowe należy nawozić co roku kompostem, gnojówką, krzewy co 3 lata obornikiem.

Przeciętny skład chemiczny produktów, mających związek z gospodarstwem wiejskiem, według E. Wolffa, na 1000 cz. substancyi w stanie naturalnym.

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnowego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
I. Nasiona i owoce.	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰
a) Zboża.											
Pszenica ozima	144	20.8	16.8	5.2	0.3	0.5	2.0	7.9	0.1	0.3	0.1
» jara	143	20.5	18.3	5.6	0.3	0.5	2.2	9.0	0.2	0.3	0.1
Żyto ozime	143	17.6	17.9	5.8	0.3	0.5	2.0	8.5	0.2	0.3	0.1
» jare	143	—	18.0	6.2	0.3	—	2.2	9.2	—	0.2	—
Jęczmień jary	143	16.0	22.3	4.7	0.5	0.6	2.0	7.8	0.4	5.8	0.2
» ozimy	145	16.0	19.0	2.8	0.7	0.1	2.1	5.6	0.5	4.9	—
Owies	143	17.6	26.7	4.8	0.4	1.0	1.9	6.8	0.5	10.5	0.3
Kukurydza	144	16.0	12.4	3.7	0.1	0.3	1.9	5.7	0.1	0.3	0.2
Proso	140	20.3	29.5	3.3	0.4	0.2	2.8	6.5	0.1	15.6	0.1
Sorgo	140	—	16.0	3.3	0.5	0.2	2.4	8.1	—	1.2	—
Hreczka	140	14.4	11.8	2.7	0.7	0.5	1.5	5.7	0.2	—	0.2
b) Rośliny groszkowe.											
Koniczyna czerwona	150	30.5	38.3	13.5	0.4	2.5	4.9	14.5	0.9	0.5	0.5
Koniczyna biała	150	—	33.8	12.3	0.2	2.5	3.9	11.6	1.6	0.8	0.5
Esparzetta	160	—	38.4	11.0	1.1	12.3	2.6	9.2	1.2	0.3	0.5
Seradella	120	34.9	28.4	8.2	2.2	5.5	2.7	7.8	—	0.6	1.7
Bobik	145	40.8	31.0	12.9	0.3	1.5	2.2	12.1	1.1	0.2	0.5
Bób	150	39.0	27.4	12.1	0.4	1.5	2.1	9.7	1.1	0.2	0.3
Groch	143	35.8	23.4	10.1	0.2	1.1	1.9	8.4	0.8	0.2	0.4
Wyka	143	44.0	26.6	8.0	2.1	2.2	2.4	9.9	1.0	0.3	0.7
Łubin	130	56.6	37.0	11.4	0.3	2.8	4.5	14.2	3.2	0.1	0.3
Soja	100	53.4	28.3	12.6	0.3	1.7	2.5	10.4	0.8	—	0.1
c) Rośliny oleiste.											
Rzepak	118	31.1	39.2	9.6	0.6	5.5	4.6	16.6	0.9	0.5	0.1
Rzepik letni	120	36.8	34.9	7.7	—	5.2	4.7	14.9	2.3	—	—
Gorczyca biała	130	—	36.5	5.9	2.0	7.0	3.7	14.6	1.8	0.9	0.4
Mak	147	28.0	51.5	7.0	0.5	18.2	4.9	16.2	1.0	1.7	2.5
d) Przemysłowe i okopowe.											
Len	118	32.8	32.8	10.0	0.7	2.6	4.7	13.5	0.8	0.4	—
Konopie	122	26.1	26.1	9.4	0.4	10.9	2.6	16.9	0.1	5.5	—

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnowego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
Koper	134	—	61.4	19.6	1.5	12.1	8.6	10.1	0.5	0.2	2.1
Kminek	130	—	46.4	12.2	3.0	8.4	3.8	11.3	2.5	2.3	1.4
Koriander	135	—	41.2	14.5	0.5	9.1	5.0	7.6	2.8	0.4	1.0
Żołędzie świeże	553	4.0	9.8	6.3	0.1	0.7	0.5	1.5	0.4	0.1	0.2
Burak pastewny	140	—	48.8	9.1	8.5	7.6	8.6	7.6	2.1	1.1	5.3
Marchew	120	—	74.8	14.3	3.5	29.1	5.0	11.8	4.2	4.0	2.8
Burak cukrowy	146	—	45.3	11.1	4.2	10.2	7.3	7.5	2.0	0.8	1.9
e) Owoce.											
Jabłko cały owoc	831	0.6	2.2	0.8	0.6	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	—
Gruszka » »	831	0.6	3.3	1.8	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	0.1	—
Poziomka » »	902	—	3.3	0.7	0.9	0.5	—	0.5	0.2	0.4	0.1
Wiśnia » »	825	—	3.9	2.0	0.1	0.3	0.2	0.6	0.2	0.4	0.1
Śliwka » »	838	—	2.9	1.7	—	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	—
Agrest » »	903	—	3.3	1.3	0.3	0.4	0.2	0.7	0.2	0.1	—
Winogrono cały owoc	830	1.7	8.8	5.0	0.1	1.0	0.4	1.4	0.5	0.3	0.1
II. Słoma.											
a) Zboża.											
Pszenica ozima	143	4.8	46.0	6.3	0.6	2.7	1.1	2.2	1.1	31.0	0.8
» » jara	143	5.6	38.1	11.0	1.0	2.6	0.9	2.0	1.2	18.2	0.8
Żyto ozime	143	4.0	38.2	8.6	0.7	3.1	1.2	2.5	1.6	18.8	0.8
» jare	143	5.6	46.7	11.7	—	4.0	1.2	2.8	1.5	25.2	—
Jęczmień	143	6.4	45.9	10.7	1.6	3.3	1.2	1.9	1.8	23.4	1.5
Owies	143	5.6	61.6	16.3	2.0	4.3	2.3	2.8	2.0	28.8	2.7
Kukurydza	150	4.8	45.3	16.4	0.5	4.9	2.6	3.8	2.4	13.1	0.6
Hreczka	160	16.3	44.9	19.4	0.8	12.0	2.6	2.9	1.8	3.2	2.0
b) Inne rośliny gospodarskie.											
Bobik	160	16.3	44.9	19.4	0.8	12.0	2.6	2.9	1.8	3.2	2.0
Bób	160	—	40.2	12.8	3.2	11.1	2.5	3.9	1.7	1.9	3.1
Groch	160	10.4	43.1	9.9	1.8	15.9	3.5	3.5	2.7	2.9	2.3
Wyka	160	12.0	44.1	6.3	6.9	15.6	3.7	2.7	3.3	3.6	2.2
Łubin	160	9.4	42.6	17.7	1.3	9.7	3.4	2.5	3.4	1.2	1.4
Soja	140	13.1	32.7	5.0	0.7	14.6	5.0	3.1	2.1	1.8	—
Mak	160	—	48.6	18.4	0.6	14.7	3.1	1.6	1.5	5.5	1.3
Rzepak	160	5.6	41.3	11.3	3.9	11.7	2.5	2.5	3.1	2.6	3.5
III. Plewy.											
Pszenica ozima	143	7.2	92.0	8.4	1.7	1.7	1.2	4.0	—	74.7	—
Żyto ozime	143	5.8	82.7	5.2	0.3	3.5	1.1	5.6	0.1	66.4	0.4
Ości jęczmienia	143	4.8	18.6	9.3	1.1	12.5	1.5	2.4	3.6	85.6	0.8
Owies	143	6.4	71.2	4.5	2.9	4.0	1.5	1.3	3.5	50.4	0.8
Kaczany kukurydz.	140	2.3	4.5	2.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	1.3	0.2

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnowego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
Strączyny bobiku	150	16.8	54.7	35.5	1.3	6.8	6.0	2.7	1.2	0.3	1.0
» łubinu	143	7.2	19.1	9.4	1.3	4.4	0.8	1.0	0.4	0.9	0.3
» rzepaku	140	6.4	70.1	9.5	3.0	35.1	5.8	3.7	6.4	0.8	3.5
Łuski lnu	116	5.6	53.9	15.0	3.0	15.6	3.3	4.5	3.8	4.5	4.1
» lnianki	112	4.3	43.3	12.7	1.3	16.0	2.3	1.5	4.6	3.6	0.7
IV. Siano.											
a) Siano łąkowe i trawy.											
Siano łąkowe	143	15.5	59.8	16.0	2.2	9.5	4.1	4.3	3.1	17.2	3.7
Trawa z I. pokosu i potraw	160	19.1	76.0	22.3	3.0	10.4	5.1	5.9	4.1	19.4	4.5
Trawa kwaśna	140	—	37.2	8.8	—	7.0	1.8	1.4	3.7	13.8	—
Zboża w czasie kwitnienia	150	—	59.4	19.3	1.0	3.4	1.7	5.6	1.5	24.7	2.3
Kupkówka	143	—	50.8	16.7	2.2	3.1	1.4	3.6	1.3	16.7	3.6
Rajgras angielski	143	16.3	58.2	20.2	2.0	4.3	1.3	6.2	2.3	18.5	6.1
b) Rośliny motylkowe.											
Koniczyna czerwona młoda	167	35.5	82.3	29.7	1.9	23.5	7.6	10.0	1.8	2.5	3.3
Koniczyna czerwona w pączkach	165	24.5	68.4	25.3	1.4	20.7	7.6	6.9	1.7	1.8	2.4
Koniczyna czerwona kwitnąca	160	19.7	57.6	18.6	1.1	20.1	6.3	5.6	1.9	1.7	2.2
Koniczyna czerwona dojrzała	150	12.5	44.7	10.0	1.4	15.8	6.9	4.4	1.4	3.0	1.3
Koniczyna biała kwitnąca	165	23.2	61.1	13.1	4.4	18.4	5.8	7.8	4.5	2.7	2.6
Koniczyna szwedz.	160	24.0	40.0	11.1	1.2	13.6	5.0	4.1	1.6	1.6	2.2
Koniczyna inkarnatka	167	19.5	50.7	11.7	4.3	16.0	3.1	3.6	1.3	8.2	1.8
Lucerna rozkwitająca	160	23.0	62.0	14.6	1.1	25.2	3.1	5.3	3.6	5.9	1.9
Lucerna chmielowa	167	23.3	53.7	16.8	4.4	14.9	4.5	4.4	2.2	1.9	4.8
Esparzetta kwitn.	167	22.1	45.8	13.0	1.5	16.8	3.0	4.6	1.4	3.7	1.8
Przelot kwitnący	167	22.1	53.2	14.5	0.7	27.7	2.5	4.7	0.7	1.7	6.6
Seradella	167	21.6	81.6	31.9	1.7	18.2	2.8	9.1	3.1	7.0	2.1
Wyka kwitnąca	167	22.7	56.0	19.7	2.4	16.3	4.6	6.2	3.4	1.1	1.4
» piaskowa rozkwit.	167	41.5	84.2	24.4	0.8	18.1	5.7	9.7	4.3	7.3	2.5
Łubin	167	27.4	34.2	8.0	2.5	8.8	3.3	5.8	1.9	2.4	0.6
Groch zielony	167	22.9	62.4	23.2	2.3	15.6	6.3	6.8	5.1	0.8	2.0

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnowego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
V. Pasza zielona.											
a) Pasza łąkowa i trawy.											
Zboża kwitnące	785	4.5	15.0	4.4	0.3	0.9	0.4	1.4	0.4	6.2	0.6
Żyto na paszę	760	5.3	16.3	6.3	0.1	1.2	0.5	2.4	0.2	5.2	0.6
Owies zielony	810	3.7	14.2	5.6	0.5	0.9	0.4	1.3	0.5	4.4	0.6
Kukurydza zielona	829	1.9	10.4	3.7	0.5	1.4	1.1	1.0	0.3	1.9	0.5
Mohar rozkwit.	750	5.0	17.4	6.3	0.4	1.8	1.6	1.0	0.6	4.9	0.9
Sorgo »	773	4.0	14.0	3.9	1.9	1.3	0.6	0.8	0.5	4.0	1.1
Trawa I. pokos. i potraw.	800	5.6	18.1	5.3	0.7	2.5	1.2	1.4	1.0	4.6	1.1
Rajgras	700	5.7	20.4	7.1	0.7	1.5	0.4	2.2	0.8	6.5	2.1
Kupkówka	700	—	17.8	5.9	0.8	1.1	0.5	1.3	0.5	5.9	1.3
Tymotka	700	5.4	20.5	7.1	0.4	1.7	0.7	2.4	0.6	6.6	1.1
b) Rośliny motylkowe.											
Koniczyna czerwona młoda	860	6.0	14.0	5.1	0.3	3.9	1.3	1.7	0.3	0.4	0.6
Koniczyna czerwona w pączkach	820	5.3	14.7	5.5	0.3	4.5	1.6	1.5	0.4	0.4	0.5
Koniczyna czerwona kwitnąca	800	4.8	13.7	4.4	0.3	4.8	1.5	1.3	0.4	0.4	0.5
Koniczyna biała kwitnąca	805	5.6	14.3	3.1	1.0	4.3	1.4	1.8	1.1	0.6	0.6
Koniczyna szwedzka kwitnąca	820	5.3	8.6	2.4	0.4	2.9	1.1	0.9	0.4	0.3	0.5
Koniczyna inkarnatka kwitnąca	815	4.3	11.3	2.6	1.0	3.6	0.7	0.8	0.3	1.8	0.4
Lucerna rozkwitająca	740	7.2	19.2	4.5	0.3	8.5	0.9	1.6	1.1	1.8	0.6
Esparzetta kwitn.	800	5.1	11.0	3.1	0.4	4.0	0.7	1.1	0.3	0.9	0.4
Przelot »	830	4.5	10.9	3.0	0.1	5.7	0.5	1.0	0.2	0.4	0.1
Seradella »	800	4.8	19.6	7.7	0.4	4.3	0.7	2.2	0.8	1.7	0.5
Łubin zielony »	850	5.0	6.2	1.5	0.5	1.6	0.6	1.1	0.4	0.4	1.1
Groch »	815	5.1	13.9	5.2	0.5	3.5	1.4	1.5	1.1	0.2	0.4
VI. Okopowe.											
Ziemniaki	750	3.4	9.5	5.8	0.3	0.3	0.5	1.6	0.6	0.2	0.3
Burak pastewny	880	1.8	9.1	4.8	1.5	0.3	0.4	0.8	0.3	0.2	0.9
» cukrowy	815	1.6	7.1	3.8	0.6	0.4	0.6	0.9	0.3	0.2	0.3
Główki buraków cukrowych	840	2.0	9.6	2.8	2.3	0.9	1.1	1.2	0.7	0.2	0.3
Brukiew	870	2.1	7.5	3.5	0.4	0.9	0.3	1.1	0.7	0.1	0.5
Rzepa (Turnips)	920	1.8	6.4	2.9	0.6	0.7	0.2	0.8	0.7	0.1	0.3
Marchew	850	2.2	8.2	3.0	1.7	0.9	0.4	1.1	0.5	0.2	0.4

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnowego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
Bulwy	800	3.2	9.8	4.7	1.0	0.3	0.3	1.4	0.6	0.2	0.4
Cykorja	800	2.5	6.7	2.6	1.0	0.5	0.3	0.8	0.5	0.3	0.5
VII. Liśole i nać okop.											
Ziemniaki prawie dojrzałe	770	4.9	19.7	4.3	0.4	6.4	3.3	1.6	1.3	0.9	1.1
Ziemniaki niedojrzałe	825	6.3	16.5	4.4	0.3	5.1	2.4	1.2	0.8	1.2	0.9
Burak pastewny	905	3.0	14.6	4.5	2.8	1.6	1.4	1.0	0.8	0.5	2.3
» cukrowy	897	3.0	15.3	4.0	2.0	3.1	1.7	0.7	0.8	1.6	1.3
Brukiew	884	3.4	19.6	2.8	0.8	6.5	0.8	2.0	2.3	2.1	1.5
Rzepa (Turnips)	898	3.0	11.9	2.8	1.1	3.9	0.5	0.9	1.1	0.5	1.2
Marchew	822	5.1	23.9	2.9	4.7	7.9	0.8	1.0	1.8	2.4	2.4
Kapusta	890	2.4	15.6	5.8	1.5	2.8	0.6	1.4	2.4	0.1	1.3
Bulwy	800	5.3	14.5	3.1	0.2	5.0	1.3	0.7	0.2	3.6	0.4
Cykorja	850	3.5	16.5	4.3	2.9	3.3	0.4	1.0	1.4	0.6	2.7
VIII. Rośliny przemysł.											
Len—włókna	100	—	6.8	0.3	0.3	3.6	0.3	0.7	0.3	0.8	—
Konopie—łodygi	108	—	31.7	5.5	0.6	16.8	2.1	2.1	0.6	3.1	0.6
Chmiel—cała rośl.	140	25.0	72.9	17.3	1.9	19.7	7.0	5.8	2.9	13.3	3.7
» szyszki	120	32.2	66.4	23.0	1.5	11.0	3.6	11.1	2.4	10.9	2.1
Tytoń—liście	180	34.8	140.7	40.9	4.5	50.7	10.4	6.6	8.5	8.1	9.4
» łodygi	180	24.6	64.7	28.2	6.6	12.4	0.5	9.2	2.2	1.6	2.4
IX. Materyały podściołowe.											
Sitowie	140	—	56.0	16.9	4.7	4.2	3.0	4.3	2.0	11.8	7.3
Trawa morska	150	16.4	146.7	17.7	31.0	20.9	12.5	4.2	34.7	2.9	24.2
Trzcina	180	—	33.5	6.0	0.2	2.7	0.9	1.8	0.8	20.0	1.2
Turzyce	140	—	60.0	20.2	4.4	3.6	2.6	4.2	2.0	18.8	3.8
Mech	250	10.5	20.6	3.4	1.4	2.9	1.3	1.6	1.1	5.5	0.7
Paprocie	250	—	48.7	18.6	1.8	5.6	3.1	3.7	1.7	10.0	3.7
Liście bukowe w sierpniu	560	13.0	21.6	4.4	0.4	6.3	1.6	1.8	0.5	6.2	—
Ściółka z liści bukowych	140	10.0	46.7	2.3	0.5	21.2	3.1	2.4	1.0	14.5	—
Ściółka z liści dębowych	140	10.0	46.1	3.5	1.3	17.1	4.3	2.0	0.9	15.4	—
Ściółka z igieł świerku	126	9.0	40.3	1.3	0.4	16.0	1.8	2.0	0.6	18.1	—
Ściół. z igieł sosny	135	8.0	12.2	1.3	0.5	4.6	1.2	1.0	0.5	1.8	—
Ściółka z igieł modrzewiu	140	—	34.3	1.6	0.5	7.5	2.4	1.3	0.6	19.6	—
Ściół. z igieł jodły	132	—	32.8	2.7	0.5	19.5	2.3	2.7	0.8	2.5	—
» z trocin	150	—	28.1	7.4	1.8	10.8	2.0	3.0	1.4	0.8	—

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnowego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
X. Wytwory i odpadki fabryczne.											
Otręby hreczane	140	27.2	29.8	9.7	0.6	2.9	4.0	10.7	0.9	0.6	—
» jęczmienne	120	17.6	49.5	8.3	0.7	1.9	3.1	9.1	0.9	24.1	0.6
» pszenne	131	22.4	53.5	15.3	0.3	1.5	9.0	26.9	—	0.2	—
» żytnie	125	23.2	71.9	19.4	0.5	2.1	11.4	34.4	—	1.4	—
Mąka jęczmienna	140	16.0	20.0	5.8	0.5	0.6	2.7	9.5	0.6	—	—
» pszenna przednia	126	18.9	4.4	1.5	—	0.3	0.4	2.2	—	—	—
Mąka pszenna chlebowa	120	21.6	11.2	3.5	0.1	0.6	1.4	5.6	—	—	—
Mąka żytnia	142	16.8	16.9	6.5	0.3	0.2	1.4	8.2	—	—	—
» kukurydzana	140	16.0	5.9	1.7	0.2	0.4	0.9	2.7	—	—	—
» ryżowa karmowa	100	19.1	54.7	6.1	1.2	1.2	9.5	23.8	0.2	10.3	—
Łuski owsa	140	4.3	34.7	4.9	0.3	1.4	1.0	1.6	1.3	23.2	0.5
» ryżu	100	4.9	153.9	2.4	0.5	0.8	0.1	4.1	0.7	143.5	0.2
Wytłoki dyfuzyjne	948	0.8	3.3	0.3	0.1	1.1	0.2	0.2	0.1	0.7	0.1
Melassa buraczana	172	12.8	82.6	58.7	10.1	4.1	0.3	0.5	1.6	0.3	8.2
Wywar z melassy	920	3.2	12.1	9.5	1.3	0.1	—	0.1	0.2		0.5
Wypłuczyny ziemniaczane (Pulpa)	850	1.3	1.1	0.2	—	0.5	0.1	0.3	—	—	—
Wywar ziemniacz.	930	1.6	6.6	3.0	0.5	0.3	0.6	1.3	0.5	0.2	0.2
Słód zielony	475	10.4	14.6	2.5	—	0.5	1.2	5.3	—	4.8	—
» suszony	75	16.0	25.6	4.4	—	1.0	2.2	9.3	—	8.5	—
Kiełki słodowe	80	36.8	67.6	20.8	1.2	1.9	1.9	18.2	2.7	14.9	4.7
Słodziny	766	7.8	10.6	0.4	0.1	1.5	1.1	3.9	—	3.5	—
Piwo	900	0.5	3.1	1.1	0.3	0.1	0.2	1.0	0.1	0.3	0.1
Makuchy rzepak.	113	50.5	57.0	13.0	1.9	7.1	7.3	20.0	3.4	2.9	0.4
» lniane	122	47.2	51.3	12.5	0.8	4.3	8.1	16.2	1.7	6.4	0.4
» makowe	115	51.0	77.4	2.3	2.3	27.1	6.2	31.7	1.9	5.6	0.5
» słonecz.	103	59.7	49.7	11.7	—	5.4	8.1	21.5	1.0	0.3	0.3
» palmowe	100	25.9	26.1	5.0	0.2	3.1	4.5	11.0	0.5	0.8	—
» kokosowe	127	37.4	53.3	19.6	1.5	5.5	3.0	13.0	1.8	1.8	6.2
» z nasion bawełny	112	62.1	66.4	15.8	—	2.9	10.1	30.5	0.8	5.5	—
Makuchy z orzechów ziemnych	104	75.6	39.7	15.0	0.9	1.6	5.2	13.1	0.9	1.2	0.9
Makuchy sezamowe	111	58.6	93.8	11.5	3.5	25.1	12.8	32.7	1.7	0.9	0.6
XI. Zwierzęta i produkty zwierzęce.											
Wół żyjący	597	26.6	46.6	1.7	1.4	20.8	0.6	18.6	—	0.1	2.8
Cielę »	662	25.0	38.0	2.4	0.6	16.3	0.5	13.8	—	0.1	3.0
Owca »	591	22.4	31.7	1.5	1.4	13.2	0.4	12.3	—	0.2	2.2
Świnia »	520	20.0	21.6	1.8	0.2	9.2	0.4	8.8	—	—	1.2

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnowego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
Mięso ssących	763	35.2	10.2	3.8	1.0	0.3	0.3	4.2	0.1	0.1	0.5
Krew wołu	790	32.0	7.9	0.6	3.6	0.1	—	0.4	0.2	0.1	2.7
Jajo kurze bez skorupy	737	20.0	9.2	1.6	2.1	1.0	0.1	3.5	—	—	0.8
Wełna myta	128	94.4	9.8	1.9	0.3	2.4	0.6	1.8	—	2.5	0.8
» niemyta	150	54.0	70.8	56.2	3.0	1.8	0.4	0.7	3.4	2.0	3.2
Mleko krowie	875	5.4	7.2	1.7	0.4	1.7	0.2	2.0	0.1	—	1.0
» » zbier.	911	4.6	7.9	2.1	0.5	1.7	0.2	2.2	0.3	—	0.9
Serwatka	933	0.9	5.4	1.7	0.7	1.0	—	0.9	0.2	—	0.8
Ser z kwaśn. mleka	480	52.3	68.4	3.3	31.3	1.7	—	9.4	—	—	3.1
» ze słodkiego »	513	51 2	50·1	6.6	0.7	17.7	1.2	19.2	0.1	—	3.7
Mleko owcze	816	11.2	7.3	1.6	0.3	2.1	—	2.6	0.1	0.2	0.6

Charakterystyka głównych nawozów.

Saletra chilijska zawiera ÷ 15.5 % azotu. Pochłania chciwie wodę z powietrza, łatwo się rozpuszcza. Przechowywać w suchem miejscu. Przed użyciem rozbijać tworzące się bryły drążkami w pakach, lub mleć na specyalnym młynku. Rozsypywanie ręcznie (uważać by ręce robotników nie były poranione) lub specyalnymi siewnikami. Rozsypywać na suche liście, nie po rosie lub po deszczu. Mięszać nie można z superfosfatami. Saletra zawiera niekiedy nadchloran (perchlorat). Żądać gwarancyi, że saletra nie zawiera więcej. jak 1% nadchloranu, (perchloratu), gdyż większe ilości są szkodliwe. Bydło przez spożycie większej ilości saletry może się zatruć.

Saletra jest prędko pobieraną przez rośliny, prędko też zostaje wypłukaną. Dawka na morg 50—200 kg. Nawozi się najczęściej pogłównie t. j. rozsypuje na rośliny już rozwinięte. Na raz lepiej nie dawać więcej jak 25 do 50 kg. na morg.

S i a r k a n a m o n o w y zawiera ÷ 20.5% azotu; jest mniej rozpuszczalny jak saletra. Daje się go rzadziej pogłównie, a zazwyczaj przed siewem, przykrywając płytko w ilości 40—100 kg. na morg. Zwracać uwagę by nie zawierał rodanku amonowego. Siarkan amonowy działa powolniej jak saletra. Nie mięszać z wapnem, tomasyną.

M ą k a r o g o w a. Zawiera ÷ 10.5% azotu, 5.5% kwasu fosforowego; na morg 100—200 kg. Daje się ją przed siewem, przykrywając płytko. Jest to nawóz bardzo opłacający się sam, lub z dodatkiem superfosfatu lub tomasyny, na glebach jałowych pod ozimine. Z pożytkiem zastąpić może saletrę pod zboże na glebach lekkich.

M ą k a z k r w i ÷ 11.8% azotu, 1.2% kwasu fosforowego. Używać tak jak mąkę rogową. Azot w formie czynnej. 70—200 kg. na morg przed siewem, płytko przykrywać; przechowywać sucho.

M ą k a k o s t n a p a r z o n a ÷ 4% azotu i 20—21% kwasu fosforowego nierozpuszczalnego w wodzie. Jako nawóz fosforowy

może być używaną pod oziminy i okopowe na glebach lekkich, piasczystych i ubogich w wapno. Przykrywać głębiej. Dawka na morg 100—200 kg. Żądać gwarancyi, że mąka kostna parzona nie jest odklejoną.

Mąka kostna odklejona ÷ 1% azotu i 30% kwasu fosforowego. — Jako nawóz fosforowy tam i tak jak mąka kostna parzona w ilości 70—200 kg. Oprócz tego przy obecnej cenie mąka kostna odklejona nadaje się jako nawóz na łąki, (zamiast drożejących żużli 100—150 kg. wraz z 400—600 kg. kainitu).

Tomasyna zawiera 13—22% kwasu fosforowego. Nadaje się na wszelkie grunta. Na gleby piasczyste i torfiaste tomasyna jest lepszą od superfosfatu. Kupować według zawartości kwasu fosforowego rozpuszczalnego w 2% kwasie cytrynowym. Dawka na morg 100—300 kg. przyorywać do średniej głębokości. Mięszać można z kainitem lecz nie na długo przed rozsiewem, gdyż mieszanina twardnieje.

Superfosfat 10—22% kwasu fosforowego w wodzie rozpuszczalnego. Superfosfaty mineralne nie są gorsze od superfosfatów kostnych (jeśli chodzi o użycie, nie o przechowanie przez czas dłuższy). Dawka 80—200 kg. na morg — płytko przykrywać. Superfosfat nie powinien być wilgotny. Przy przechowywaniu niszczy worki; lepiej wysypywać na kupę w suchem miejscu i przykrywać. Pod buraki cukrowe superfosfat lepszym jest od tomasyny. Nie mięszać superfosfatów z saletrą, tomasyną i wapnem. Superfosfaty amoniakalne i mąka kostna preparowana zawierają obok kwasu fosforowego — azot 2—9%. Używać ich pod oziminy na słabszych gruntach (szczególniej superfosfaty z dużą zawartością azotu amoniakalnego (6—10%) w ilości 80—150 kg.

Kainit kałuski zawiera 10% potasu (stassfurcki 12%). Na łąki na jesieni 400—600 kg. na morg. Pod zboże 200—300 kg. wcześnie przed siewem. Najlepiej na jesieni. Pod buraki 200—600 kg. Kainit pochłania wilgoć z powietrza. Zbija się w bryły. Rozdrabniać przed wysiewem.

Tak zwana sól potasowa zawiera 40% potasu (jako chlorek) pod kartofle na lekkich gruntach 50—100 kg.

Siarkan potasowy zawiera 48% potasu. Nadaje się tam, gdzie nie chcemy używać nawozów zawierających chlor, a więc n. p. pod tytoń, kartofle na wiosnę.

Porównanie ceny nawozów odbywa się na podstawie obliczenia, ile kosztuje 1 kg. wartościowego składnika. Tak n. p. jeśli mamy superfosfat 18% kosztujący za 100 kg. 10 k. 38 gr., a drugi 16% kosztujący 9 k. 60 gr. to ten pierwszy jest w gruncie rzeczy tańszym, gdyż 1 kg. kwasu kosztuje w nim 56 gr. a w drugim 60 gr. Zwracać jeszcze należy uwagę na to, że transport nawozów niskoprocentowych kosztuje to samo co i wysokoprocentowych, a więc wskutek tego przy większych odległościach od fabryk opłaci się nam sprowadzać tylko nawozy wysokoprocentowe, bo te wypadają taniej.

Przy nawozach zawierających dwa pokarmy roślinne n. p. superfosfacie amoniakalnym, obliczenie w celu porównania cen odbywa się jak następuje: Jeśli mamy n. p. do obliczenia ceny superfosfatu amoniakalnego postępujemy w ten sposób: superfosfat amoniakalny z zawartością 12% kwasu fosforowego i 4% azotu kosztuje 13 k. 84 gr. 1 kg. azotu w siarkanie amonowym, a więc w tej postaci jak w amoniakalnym superfosfacie kosztuje

1.80 k.; (13.84—7.20) = 6.64 k. stanowi zapłatę za 12 kg. kwasu fosforowego, czyli 1 kg wypada wówczas po 56 groszy. Jeśli mamy, jak n. p. w mące kostnej azot w postaci związków klejowych, które osobno nie stanowią produktu nawozowego handlowego w takim razie musimy wartość azotu obliczyć na podstawie ceny azotu n. p. saletry, której 1 kg. azotu kosztuje 167 g. i danych z doświadczeń, które nas pouczają, że azot kości ma wartość 60—70% azotu saletry.

Na tej podstawie 1 kg. azotu w kościach będzie miał cenę 117 gr.

Wszystkie te ceny są zmienne:

Dla ułatwienia obliczania ceny nawozów zawierających kwas fosforowy i azot podajemy tabliczkę względnej wartości azotu w rozmaitych nawozach podaną przez Wagnera:

	Względna wartość: (w stosunku do saletry)	Cena która powinna być:*)
1 kg. azotu w saletrze chilijskiej	100	167 gr.
» » » » siarkanie amonowym	90	152 »
» » » » mączce z krwi, m. rogowej, w zielonej masie roślinnej . . .	70	117 »
» » » » mączce kost. mączce z mięsa	60	100 »
» » » » pyle z wełny . . .	30	50.1 »
» » » » skórze mielonej . .	20	33.4 »

Cena obecna 1 kg. azotu w saletrze wynosi 167; w siarkanie amonowym 160; w mące kostnej 100—110; w rogowej 140—150 gr.

Cena 1 kg. kwasu fosforowego rozpuszczalnego w wodzie około 56—62 gr.; 1 kg. kwasu fosfor. wogóle w żużlach 38—44; 1 kg. kwasu fosfor. w tomasynie rozpuszczalnego w kwasie cytrynowym 43—50; 1 kg. kwasu fosfor. w mące kostnej odklejonej 33—35; 1 kg. potasu w kainicie 20—30.

Nawozy powinno się kupować tylko u najpewniejszych firm i to z gwarancyą tj. żądać należy piśmiennego zobowiązania, że w razie, jeśli towar nie będzie zawierał tych ilości i w tej formie pokarmów co podane — kupiec zobowiązuje się do odszkodowania. Za podstawę do obliczenia przyjmuje się wynik stacyi doświadczalnej.

Próbka winna być braną według przepisów z każdego 5go, lub 10go worka, nie z wierzchu, lecz ze środka, wobec dwóch bezstronnych świadków, którzy powinni podpisać poświadczenie co do pobrania próby. Próbka większa wymięszywuje się dobrze i z niej zapakowywuje się po 500 gr. do 3ch flaszek, zapieczętowywuje i jedną wysyła do stacyi doświadczalnej.

Wzór poświadczenia pobrania próby:

Poświadczenie pobrania próby.

Podpisany odbiorca nawozu sztucznego (imię i nazwisko) ....

i bezstronni świadkowie (imiona i nazwiska 2 świadków)........ ....

przedstawiciel sprzedającego (gdy jest obecny)................

*) Przyjmując obecną, targową cenę saletry.

....zaświadczają, że dnia..................
miesiąca..................................roku.............. pobrali próbkę według znanych im przepisów kraj. stacyi dośw. chem.-roln. w Dublanach z zakupionego u .... w .... nawozu sztucznego a mianowicie: (Wyszczególnienie nawozów sztucznych i gwarancyi danej przez firmę sprzedającą) ....
....
....
....

Nr. wozu kolejowego lub Nr. karty przewozowej: ....
Stacya z której nawóz sztuczny wysłano: ....
Dzień wysyłki nawozu sztucznego: ....
Stacya z której nawóz sztuczny odebrano: ....
Dzień odbioru nawozu sztucznego ze stacyi: ....
Waga w kilogramach: ....Ilość worków: ....

Próbka powyższa została przez nas osobiście zapieczętowana, co stwierdzamy własnoręcznymi podpisami.

Dzień, miesiąc i rok
dalej miejsce pobrania prób: ....

Podpisy świadków: Podpis odbiorcy:
....
....

Podpis przedstawiciela lub pełnomocnika firmy (gdy jest obecny):
....

Odciski użytych pieczęci:
(Odbiorcy) (1-go świadka) (2-go świadka) (Ewent. zast. firmy).

Nawozy zielone.

Na nawóz zielony nadają się wszelkie rośliny motylkowe przyswajające wolny azot z powietrza (azotobiercze). Siać je należy gęsto, przyorywać jak najpóźniej się da, to jest kiedy ziarno już wykształcone, ale roślina jeszcze zielona.

Nawozy zielone zasiewa się na wiosnę zamiast przedplonu, na ziemiach lekkich piaszczystych łubin żółty, seradelę, nostrzyk i t. p., na glinkach i cięższych lössowych łubin niebieski, groch, wykę, bobik i t. p. Jako wsiewki, które zasiane w zboże na wiosnę, dają pognój zielony na jesieni: seradella w życie, łubin dla gleb lżejszych, lucerna chmielowa (konicz. szwedzka?) dla gleb cięższych. Bezpieczniejsze są międzyplony po sprzęcie zboża (im wcześniej dojrzewające, tem lepsze). Po zżęciu zboża zestawić snopy w rzędy; natychmiast podorać i rozsiać nasienie i przywałować lub rozsiać na ścierń i przyorać. Każda godzina opóźnienia — mniej pewny wynik. Na międzyplony nadają się wyka, groch, bobik w mieszance, na Podolu groch. N. z. podorywać przed zimą lub na wiosnę dopiero. N. z. dają u nas 35—120 kg. azotu na mórg w cenie 20—40 gr. za kg. N. z. są jedną z ważniejszych dźwigni naszych gospodarstw. N. z. mogą być stosowane pod zboża, rośliny okopowe. N. z. mogą powodować zachwaszczenie pola. Obok n. z. nawozić rolę nawozami potasowymi i fosforowymi.

Podstawy do oceny nasienia według danych przyjętych przez c. k. stację oceny nasion w Wiedniu i Prof. Dr. F. Nobbego w Tarandzie.*)

Liczba	Rodzaj nasienia	Czystość %	Siła kiełkowania %	Wartość użytk.	1 kg. zawiera ziarn tysięcy	Używać można nasienie mające lat	Waga hektolitra w kg.
	I. Rośliny pastewne motylkowe.						
1.	Koniczyna czerwona	97	90	87	550	2—3	75
2.	» szwedzka	95	75	71	1420	2—3	75
3.	» biała	96	78	75	1550	2—8	76
4.	» inkarnatka	98	86	84	285	2—3	73
5.	Lucerna	98	89	87	465	2—3	77
6.	» piaskowa	—	—		445	2—3	77
7.	» chmielowa	95	75	71	610	2—3	76
8.	Esparzetta	97	72	70	50	2—3	33
9.	Przelot	94	80	75	385	2—3	75
10.	Seradella	94	80	75	290	2—3	46
11.	Nostrzyk	—	—	—	520	2—3	80
12.	Bobik	—	—	—	1	4—5	80
13.	Groch	97	90	87	3—5	5—6	80
14.	Wyka	97	90	87	13	3—4	80
15.	Soja	—	—	—	3—6	1—2	80
16.	Łubin żółty	98	90	88	6—7	2—3	75
17.	» niebieski	98	90	88	6—7	2—3	75
18.	» biały	98	85	83	6—7	2—3	70
	2. Trawy.						
19.	Tymotka	97	92	89	2060	3—4	50
20.	Wiklina łąkowa	90	53	48	5759	2—3	17
21.	» szorstka	90	68	61	7571	2—3	19
22.	Grzebienica	90	65	59	2345	2—3	37
23.	Mietlica rozłogowa	85	85	72	18970	2—3	20
24.	Ostrzyca trzcinowata	90	70	63	2525	0—1	25—30
25.	Rajgras angielski	95	82	78	500	2—3	22
26.	» włoski	95	75	71	590	2—3	22
27.	» francuski	70	75	53	400	2—3	16
28.	Kupkówka	80	78	62	1185	2—3	20
29.	Kostrzewa łąkowa	92	80	74	655	2—3	22
30.	» owcza	80	65	52	1520	2—3	16
31.	» czerwona	75	55	41	1420	2—3	17
32.	» trzcinowata	90	75	68	—	2—3	18
33.	Wyczyniec łąkowy	82	50	41	2050	2—3	8

*) Zdolność kiełkowania nasion zależy od wielu bardzo czynników, towarzyszących dojrzewaniu i przechowywaniu. Należy zawsze przed siewem badać siłę kiełkowania zarówno nasienia kupnego jak i produkowanego u siebie, a szczególniej przechowywanego przez lat parę. Badania nasion przeprowadza krajowa stacja botaniczno-rolnicza we Lwowie, ul. Badenich 7.

Liczba	Rodzaj nasienia	Czystość %	Siła kiełkowania %	Wartość użytk.	1 kg. zawiera ziarn tysięcy	Używać można nasienie mające lat	Waga hektolitra w kg.
34.	Wełnica kłosówka	70	80	56	2400	3—4	8—11
35.	Owies złocisty	65	42	27	3720	2—3	10
36.	Stokłosa bezostna	89	80	64	—	2—3	—
37.	» wyprostow.	80	60	48	—	2—3	—
38.	Tomka wonna	90	35	31	1837	2—3	14
	3. Różne nasiona.						
39.	Pszenica	99.5	95	—	24	2—3	76
40.	Żyto	99.5	95	—	32	2—3	72
41.	Jęczmień	99.3	95	—	22	2—3	64
42.	Owies	97.5	90	—	27	2—3	46
43.	Kukurydza	99.2	84—100	—	3	3—4	73
44.	Rzepak	99.7	69—100	—	175	2—3	70
45.	Rzepik	—	65—99	—	445	2—3	64
46.	Rzepa	—	91—99	—	358	2—3	64
47.	Gorczyca czarna	—	—	—	557	3—4	63
48.	Lnianka	—	—	—	1085	2—3	62
49.	Len	98	90	88	220	2—3	66
50.	Konopie	98	90	88	47	2—3	46
51.	Hreczka	100	82—93	—	42	2—3	64
52.	Buraki	97	—	—	40	3—4	22—27
53.	Cykorja	90	75	67	727	2—3	40—45
54.	Szporek polny	96	74	71	1370	6—8	60
55.	» olbrzymi	95	72	69	950	6—8	60
56.	Marchew	90—95	70—80	—	725	2—3	20—35
57.	Proso cukrowe	—	—	—	—	2—3	50—55
	4. Nasiona drzew.						
58.	Sosna	96	65	62	150—170	—	50—55
59.	Świerk	96	63	61	16—20	—	30—35
60.	Jodła	86	25	22	133	—	52—56
61.	Modrzew	87	37	32	169	—	44—50
62.	Brzoza	35	25	9	1600—1900	—	8—10
63.	Olcha biała	60	19	11		—	—
64.	» czarna	70	30	21	600—700	—	30—35
65.	Dąb szypułkowy	96	70	67	} 250—350 sztuk	—	65—70
66.	» zwyczajny	96	65	62		—	65—70
67.	Buk	97	32	29	4—5	—	44—48
68.	Wiąz	64	30	21	130—150	—	3—4
69.	Akacja	98	75	54	48—55	—	70—80

Ilość wysiewu nasion roślin gospodarskich na mórg austryacki.*)

Liczba	Rodzaj rośliny	Długość okresu wegetacyjnego w tyg.	Ilość wysiewu na mórg w kg.		Odległość w cm.		Głębokość przykrycia nasienia w cm.
			rzutowo	rzędowo	rzędów	roślin w rzędach	
	I. Zboża.						
1.	Pszenica ozima	42—50	75—145	58—116	10—25	—	2—5
2.	» jara	18—20	86—132	79—100	10—20	—	2—5
3.	Żyto ozime	40—45	75—110	60— 85	10—25	—	2.5—6
4.	» jare	16—20	92—126	70—100	10—20	—	2.5—6
5.	Jęczmień jary 2 i 4 rzędowy	10—18	87—117	55—100	10—20	—	2.5—7
6.	Jęczmień ozimy	40—46	90—120	70—90	10—12	—	3—7
7.	Owies	16—22	75—132	40—80	10—25	—	2.5—7
8.	Kukurydza gr. ziarn.	20—26	—	28—43	50—80	20—40	3—8
9.	» drob. »	20—16	—	17—23	40—60	15—30	2.5—6
10.	Proso zwyczajne	14—16	12—18	7—13	20—40	—	1—2.5
11.	Mohar	18—20	7—12	6—9	15—25	—	1—2.5
12.	Sorgo	22—26	—	12—26	50—80	20—40	2—4
13.	Hreczka	12—16	40—70	30—45	20—30	—	2.5—5
	II. Groszkowe.						
14.	Groch późny	16—20	85—110	63—97	25—40	—	3—8
15.	» wczesny	16—20	110—140	97—120	20—35	—	3—8
16.	Bobik gruboziarnisty	22—28	130—165	100—130	35—60	—	4—10
17.	» średnio i drobnoziarnisty	22—28	120—155	90—125	30—45	—	4—8
18.	Soja	22—28	—	23—46	20—50	—	3—6
19.	Wyka	18—22	70—105	52—78	15—25	—	3—6
20.	Soczewica	14—18	46—92	35—70	15—25	—	2—5
21.	Fasola	16—20	—	70—100	30—60	15—30	4—8
22.	Wyka piask. (villosa)	20—24	45—70	37—55	—	—	3—5
23.	Wyka piaskowa z żytem św. Jańskiem	40—45	28—40.5 40.5—52	—	—	—	3—5
24.	Łubin żółty i nieb.	16—24	72—104	52—80	25—40	—	3—6
25.	» biały	20—24	103—150	78—112	25—40	—	3—6
	III Oleiste.						
26.	Rzepak ozimy	46—48	7—10	4.5—7.5	40—60	—	1—3
27.	» letni	16—18	9—12.5	5.5—9	30—50	—	1—3
28.	Rzepik ozimy	42—46	5—7.5	3.5—6	30—40	—	1—3
29.	» letni	10—12	7.5—11.5	6—9	25—35	—	1—4
30.	Lnianka	12—14	4—5	3—4.5	15—25	—	1—2.5

*) Podane ilości wysiewu dotyczą przeciętnych warunków. Siejąc w warunkach mniej sprzyjających, więc późno, lub na glebach źle przygotowanych, należy siać gęściej. Przy roślinach pastewnych, na długotrwałem pastwisku, łąki sieje się niekiedy i dwa razy gęściej niż podano.

Liczba	Rodzaj rośliny	Długość okresu wegetacyjnego w tyg.	Ilość wysiewu na mórg w kg.		Odległość w cm.		Głębokość przykrycia nasienia w cm.
			rzutowo	rzędowo	rzędów	roślin w rzędach	
31.	Gorczyca biała	14—16	6.5—10.5	4.5—5.8	30—40	—	2—4
32.	Mak	16—18	3—5	1.5—3.5	30—50	—	0.5—2
33.	Słonecznik	20—28	—	3.5—7	60—90	40—50	2.5—5
	IV. Przemysłowe.						
34.	Len na ziarno	14—18	63—103	58—80	8—16	—	2—4
35.	» » włókna	12—15	126—172	—	—	—	2—4
36.	Konopie na ziarno	18—22	28—56	17—34	50—80	20—30	2.5—5
37.	» » włókna	16—20	—	—	—	—	2.5—5
38.	Gorczyca czarna	14—16	2.5—3.0	1.5—2.0	25—35	—	1—3
39.	Kminek	48—52	—	3.5—6.0	25—40	—	1—2.5
40.	Koper	16—20	8.5—11.5	7.0—9.0	25—35	—	1—3
41.	Anyż	16—20	8.0—11.5	6.0—8.5	30—40	—	1—3
42.	Koriander	18—22	8.5—14	7—9	30—45	—	2—4
43.	Tytoń	22—26	—	—	40—80	30—60	0—0.5
	V. Okopowe.						
44.	Ziemniaki wielkie	16—26	—	1030—1380	50—70	30—50	2.5—15
45.	» średnie	16—26	—	690—1030	50—70	30—50	2.5—15
46.	» drobne	16—26	—	460—690	50—60	30—40	2.5—12
47.	Buraki pastewne	26—30	—	11.5—17	45—60	30—40	2—5
48.	» cukrowe	26—30	—	17—23	40—48	20—30	2—5
49.	Brukiew	18—20	—	4.5—7	45—65	30—40	1—3
50.	Marchew	26—28	3.5—4.5	2.3—3.5	40—60	20—30	0.5—1.5
51.	Rzepa	14—18	—	0.6—1.2	45—65	25—35	1—3
52.	» zasiew ściern.	10—12	1.2—2.4	—	—	—	1—3
53.	Pasternak	24—26	—	4.5—7.0	40—60	20—30	1—3
54.	Cykorya	16—20	5.5—7.0	4.5—6.0	35—45	20—30	0.5—2
55.	Bulwy	24—28	—	575—860	45—70	30—50	2.5—10
56.	Kapusta } na	—	0.3—0.6	—	15—20	1—3	½—1
57.	Burak past. } roz-	—	5.8—8.6	—	15—20	1—3	2—5
58.	Brukiew } sadę	—	2.3—3.4	—	15—20	1—3	1—3
	VI. Pastewne.						
59.	Koniczyna czerw.	10—12	9—14	7—10.4	10—15	—	0.5—2
60.	» szwedz.	10—14	8—10	6—8	10—15	—	0.5—2
61.	» biała	14—16	6—9	5—7	8—12	—	0.5—2
62.	» inkarn.	12—14	10—14	8—10	10—15	—	0.5—2
63.	Lucerna	8—10	14—20	12—17	15—25	—	0.5—2
64.	» chmielow.	10—12	12—17	9—14	10—15	—	0.5—2
65.	» piaskowa	13—15	17—23	14—20	15—25	—	0.5—2
66.	Esparzetta	14—16	104—138	74—104	15—25	—	1.5—3
67.	Przelot	10—12	9—14	7—10	10—20	—	1—3
68.	Seradella	16—18	14—20	12—17	10—15	—	1.5—3
69.	Nostrzyk	12—14	23—29	17—23	30—40	—	0.5—2
70.	Komonica	8—12	14—23	12—21	10—15	—	0.5—2

Liczba	Rodzaj rośliny	Długość okresu wegetacyjnego w tyg.	Ilość wysiewu na morg w kg. rzutowo	rzędowo	Odległość w cm. rzędów	roślin w rzędach	Głębokość przykrycia nasienia w cm.
71.	Komonica błotna	—	9—14	7—12	10—15	—	0.5—2
72.	Kukurydza	14—18	64—86	52—76	30—50	—	3—8
73.	Sorgo	14—18	34—52	23—34	30—50	—	2—4
74.	Mohar	10—13	17—23	14—17	10—20	—	1—2.5
75.	Żyto	32—36	104—138	—	—	—	3—7
76.	Owies	12—14	86—144	—	—	—	2.5—7
77.	Groch pastewny	14—16	126—161	92—138	15—25	—	3—8
78.	Bobik	14—16	126—172	103—150	20—30	—	4—10
79.	Wyka ptasia	6—8	75—98	113—136	12—18	—	3—5
80.	» płotowa	—	126—144	103—126	12—18	—	3—5
81.	» piask. z żyt. Św. Jańsk.	36—40	69—92 11.5—23	—	—	—	3—5
82.	Łubin żółty i niebieski	14—20	115—155	88—132	20—30	—	3—6
83.	» biały	15—20	150—207	115—155	20—30	—	3—6
84.	Rzepak pastewny	8—10	10—14	8.5—11.5	30—40	—	1—3
85.	Rzepik »	8—10	7—9	5.8—8	25—35	—	1—3
86.	Gorczyca biała	8—10	10—14	8.5—11.5	20—30	—	2—4
87.	Hreczka zwyczajna	8—12	69—80	58—69	15—25	—	2.5—5
88.	Szporek	7—8	10—12	8—10	8—12	—	1
	VII. Trawy.						
89.	Tymotka	12—14	6—10.5	4.5—8	8—12	—	0—2
90.	Wiklina łąkowa	8—10	9—14	7—9	8—12	—	0—2
91.	» szorstka	8—10	10—14.5	8—10.5	8—12	—	0—2
92.	Grzebienica pospolita	8—10	11.5—23	8.5—14.5	8—12	—	0—2
93.	Mietlica łąkowa	12—14	5.5—8.5	4.5—7	8—12	—	0—2
94.	Ostrzyca trzcinowata	—	12—14	9—10	8—12	—	0—2
95.	Rajgras angielski	10—12	23—46	17—34.5	8—12	—	0—2
96.	» włoski	10—12	23—46	17—34.5	8—12	—	0—2
97.	» francuski	8—10	46—69	34.5—52	8—12	—	0—2
98.	Kupkówka	12—16	14.5—26	11.5—17	8—12	—	0—2
99.	Kostrzewa łąkowa	10—12	46—86	34.5—69	8—12	—	0—2
100.	» owcza	8—10	11.5—23	8.5—17	8—12	—	0—2
101.	» czerwona	10—12	20—31.5	17—26	8—12	—	0—2
102.	» trzcinow.	12—14	23—40.5	17.5—29	8—12	—	0—2
103.	Wyczyniec łąkowy	8—10	14.5—29	11.5—23	8—12	—	0—2
104.	Wełnica kłosówka	—	8.5—11.5	7—9.5	8—12	—	0—2
105.	Owies złocisty	12—16	14.5—20	10—14	8—12	—	0—2
106.	Stokłosa bezostna	—	40—42	34—36	8—12	—	0—2
107.	» wyprostow.	—	36—38	30—32	8—12	—	0—2
108.	Tomka wonna	—	14—16	10—12	8—12	—	0—2

Wapnowanie i marglowanie.

Przez wapnowanie i marglowanie 1) poprawiamy fizykalne własności, szczególniej gleb zwięzłych (łatwiejsza uprawa; większa przepuszczalność i przewiewność itp.); 2) dostarczamy glebie zasady zobojętniającej powstające kwasy i wpływającej dodatnio na rozwój ważnych dla żyzności gleby bakteryi, oraz na prawidłowy rozkład materyi organicznej; 3) dostarczamy roślinom niezbędnego pokarmu.

Na glebach gliniastych wapnowanie bywa niepotrzebnem, kiedy one zawierają więcej niż 0·5% wapna, jako węglanu wapniowego. Na glebach piaszczystych wapnowanie bywa często niepotrzebne, kiedy gleba zawiera więcej jak 0·2% wapna. Margliste podłoże, nie głębiej jak 1—1¼ metr., może przez podsiąkanie dostarczać glebie pewnych ilości wapna. Głębiej znajdujące się przedstawia tylko wartość jako materyał, którym można glebę marglować.

Skutki wymienione w punkcie 1 i 2 osiąga się za pomocą marglu, lub wapna palonego zmielonego lub zgaszonego na proszek. Zgaszenie dokonywa się: 1) na polu w małych kupkach przykrytych ziemią (kupki 20—50 kg. na polu, które się ma wapnować, przykrywać ziemią i zarównywać ziemią szpary, które powstają), w kilkanaście dni zgaszone wapno rozsypuje się; 2) w większych kupach na polu przez zlewanie umiarkowanemi ilościami wody podczas układania (20—50 q. wapna palonego, na 100 kg. wapna około 35—40 litr. wody). Po zgaszeniu, jeśli nie rozsiewamy, przykryć należy starannie ziemią na 15—20 cm.; 3) przez szybkie zanurzanie w kadzi z wodą koszyków napełnionych wapnem i wyrzucanie zwilgniętego wapna na kupę.

Ilość wapna, którą się stosuje, zależy od zwięzłości gleby. Na zwięźlejszych glebach racyonalniej jest dawać od razu większe dawki 10—20 q. na morg i więcej. Na ziemie lżejsze 5—10 q.

Wapnować: 1) pod jarzyny, w które bywają zasiewane koniczyny; 2) ugory nawożone obornikiem pod rzepak lub oziminy; 3) pola nawożone obornikiem pod buraki; 4) koniczyny pod oziminy. Jeśli dajemy równocześnie obornik i wapno gaszone, należy jeden z tych nawozów przyorać, a dopiero dać drugi. Przy marglowaniu można je dawać i razem, lecz natychmiast przyorać.

Wapno rozsypywać na ziemie nie nadmiernie wilgotne, przed przyoraniem wymieszać dobrze z glebą gruberami lub bronami itp. Wapno nawozowe (odpadki z wapienników) zawiera głównie węglan wapniowy. Należy go dawać około 2 razy tyle co wapna palonego, świeżo zgaszonego.

Szlam saturacyjny z cukrowni zawiera oprócz węglanu wapniowego azot, kwas fosforowy, potas i materye organiczne.

Margiel jest mieszaniną węglanu wapniowego z gliną, z piaskiem itp., zawiera 10—50% węglanu wapniowego.

Marglujе się bądź marglem przewożonym z dalszych miejsc, bądź marglem z podglebia przez kopanie dołów na polu, które się ma marglować. Ilość marglu zależną jest od zawartości węglanu wapniowego w marglu. Daje się tyle, by wypadło czystego węglanu wapniowego na morg 30—60 q. (Przeciętnego składu marglu wypada 60—100 fur na morg).

Margle dolomitowe zawierające oprócz węglanu wapniowego węglan magnezowy, posiadają dla pewnych gleb większą wartość jak zwykłe margle.

Charakterystyka rolnicza ważniejszych

Skrócenia: M. k. = Mięszanka koniczynowa. — Ł. prz. = Łąka
4 = Trawy trwałe. W. = Wysokopienne. — N. = Niskopienne.

Liczba	Nazwa	Trwa lat	Rozłogi	Kwitnie
1.	Koniczyna czerwona zwykła	2	—	VI—VII
2.	» » trwała	5—6	—	VI—VII
3.	» szwedzka	3	—	VI—VII
4.	» biała	3	Ndz.	V—VIII
5.	Komonica zwykła	4	—	VII
6.	» błotna	4	Ndz.	VI—VIII
7.	Lucerna zwykła	6—20	—	VI—VII
8.	» piaskowa	6—10	—	VI—VII
9.	» chmielowa	1—2	—	V—IX
10.	Esparceta	4—7	—	VI—VII
11.	Przelot	2	—	VI—VIII
12.	Tymotka	4—6	—	VI—VII
13.	Wiklina łąkowa	4	Pdz.	V
14.	» szorstka	4	Ndz.	VI
15.	Grzebienica	4	—	VI
16.	Mietlica rozłogowa	4	Ndz. Pdz.	VI—VII
17.	Ostrzyca trzcinowata	4	Pdz.	VI—VII
18.	Rajgras angielski	1—4	Pdz.	V—IX
19.	» włoski	1—2	—	VI—IX
20.	» francuski	3—5	—	VI
21.	Trawa kupkówka	4	—	VI
22.	Kostrzewa łąkowa	4	—	V—VI
23.	» owcza	4	—	V—VI
24.	» czerwona	4	Pdz.	V
25.	» trzcinowata	4	Pdz.	V—VI
26.	Wyczyniec łąkowy	4	Pdz.	V
27.	Wełnica kłosówka	4	—	V
28.	Owsik złoty	4	—	VI—VIII
29.	Stokłosa bezostna	4	Pdz.	VI
30.	» wyprostowana	4	—	V—VI
31.	Krwawnik	4	—	VI
32.	Tomka wonna	4	—	V

roślin pastewnych łąkowych.

przemienna. — Ł. trw. = Łąka trwała. — Past. = Pastwisko. — Pdz. = Podziemne. — Ndz. = Nadziemne.

Nadaje się na	Odpowiednia gleba	Odrost po pierwszym pokosie	Wysok. wzrostu
M. k.	Zwięzłe nie nazbyt suche	dobry	
M. k. Ł. prz. Ł. trw.	» » »	»	
» » »	Zwięzłe wilgotne	praw. żaden	
Ł. prz. Ł. trw. Past.	Lżejsze, próchniczne	» »	
Ł. trw. Past.	Wszelkie grunty, szczególniej wapniste, suche	słaby	
Ł. trw.	Torfy, mursze	praw. żaden	
M. k.	Bogate gleby, przepuszczalne o niskim poziomie wody gruntowej, głębokie	3—5 pokos.	
»	Lżejsze glinki, piaski	2 pokosy	
»	Ubogie, lekkie, wapniste	dobry	
M. k. Ł. trw.	Lżejsze, wapniste, głębokie, stanowiska cieplejsze	1 pokos	
M. k.	Lekkie glinki, piaski zasobne w wapno	»	
M. k. Ł. trw. Ł. prz.	Glinki, gliny ciężkie i wilgotne	dobry	W.
Ł. trw. Ł. prz.	Glinki, gliniaste piaski choćby suche	mierny	N.
Ł. trw. Ł. prz.	Wilgotne i mokre grunty	praw. żaden	W.
Ł. trw. Ł. prz. Past.	Średnio zwięzłe, nie suche	mierny	N.
» » »	Wilgotne	dobry	N.
Ł. trw.	Zwięźlejsze, wilgotne, mursze	»	W.
M. k. Past.	Zwięźlejsze, wilgotne, lub wilgotne piaski	słaby	N.
M. k.	Glinki dobrego gatunku	dobry	N.
M. k. Ł. trw. Ł. prz.	Wszelkie lepsze wapniste	mierny	W.
» » »	Wszelkie lepsze	dobry	W.
Ł. trw. Ł. prz.	Gleby wilgotne, lecz nie kwaśne	»	W.
Ł. trw. Ł. prz. Past.	Wszelkie suche gleby	słaby	N.
Ł. trw. Past.	Gleby suche też mursze	»	N.
» »	Wszelkie a szczególniej wilgotne i mursze	dobry	W.
Ł. trw. Ł. prz.	Mniej zwięzłe, szczególniej na łąki zalewane	»	W.
» »	Słabsze, też mursze gorszego gatunku nierozłożone	mierny	W.
» »	Wszelkie, też lepsze mursze	dobry	W.
» »	Lekkie, nie za suche. Mursze	średni	W.
» »	Lekkie, suche	mierny	W.
Ł. trw. Ł. prz. Past.	Niezbyt zwięzłe	słaby	N.
» ? »	Słabsze	»	N.

Koniczyny na suchych gruntach zalecają wysiewać albo bardzo wczesną wiosną, albo przeciwnie już wtedy, kiedy roślina ochronna wyrosła, cieniuje rolę i stanowi osłonę. Albo wreszcie doradzają zasiew koniczyny lub lucerny w podorane ściernisko w lipcu lub w sierpniu; radzą też w tym celu głębsze przykrycie broną.

Koniczyna szwedzka. *(Trifolium hybridum).* Według doświadczeń poczynionych w lubelskiem nadaje się oprócz stanowisk wilgotnych, na suche glinki, nawet lepiej od koniczyny czerwonej. Ze względu na trwałość (3—5 lat) należy siewać ją w mieszance z czerwoną, jeśli koniczynę mamy używać przez lat dwa. Koniczyna szwedzka daje jeden obfity pokos. Przydatność jej na grunta wilgotne jest ogólnie znaną.

Przelot. *(Anthyllis vulneraria).* Jest dobrą rośliną pastewną dla owiec i bydła w stanie suchym i zielonym. Krowy początkowo nie chcą jeść, ale łatwo przywykają. Siano przygotowywać brunatne szczególniej jeśli się go zbierze późno. Przelot nadaje się na grunty suche, wapienne, piaski, glinki. Nie nadaje się na gleby wilgotne. Początkowy rozwój bardzo słaby dopiero z końcem maja, równo z kwiatem, zaczyna się najsilniej rozwijać. Kosić kiedy dobrze rozkwitnie. Przelot daje jeden tylko obfity pokos i jest doskonałym przedplonem, bo wcześnie z pola schodzi.

Lucerna *(Medicago sativa).* Zalety: długowieczność i obfitość paszy. Nasienie prowansalskie najlepsze. Lucerna nie znosi wody gruntowej, lubi wapno i głęboką warstwę rodzajną. Potrzebuje silnego nawożenia. Nawozić: tomasyny 300 kg. na morg i 400 kg. kainitu; przyorać głęboko. Przykrywać na zimę przegniłym nawozem. Dodawać do nasienia 2—4 kg. trawy kupkowej na mórg. Wsiewać w jęczmień lub owies rzadki, który się następnie na zielono skasza. Wysiew lucerny w połowie maja. Radzą też siać w lipcu bez rośliny ochronnej w świeżo zaoranym ściernia.

Lucerna chmielowa. *(M. luppulina).* Roślina 2-letnia. Nadaje się na grunta lekkie, suche, wapniste, dobrze wytrzymuje zimno. Daje plon już w 1-szym roku po zasiewie, w 2-gim roku po skoszeniu zamiera; przez wypadanie ziarna zachwaszcza pole. Znosi dobrze spasanie; lepsza na pastwisko jak na koszenie. Odpowiednia na pastwisko krótkotrwałe mieszanka z 65% koniczyny białej i 35% lucerny chmielowej z rajgrasem włoskim. Podsiewają nią zboże, by na jesieni mieć pognój zielony.

Koniczyna inkarnatka. *(Trifolium incarnatum).* U nas siewaną bywa tylko na wiosnę w ugorach. Daje obfitą paszę. Nie przewyższa swemi zaletami mieszanek z wyki i t. p. Inkarnatkę siewają na zachodzie w ścierniska nie później jak 20. VIII, często z rajgrasem angielskim. Tego rodzaju posiew daje bardzo wczesną zieloną paszę i po niej można jeszcze sadzić kartofle i t. p. Czy jednak inkarnatka w ten sposób siana wytrzymałaby nasze zimy, nie wiadomo, bo brak w tej mierze dłuższych doświadczeń.

Wyka piaskowa. *(Vicia villosa).* Nadaje się na wszelkie byle niezbyt ciężkie gleby. Wytrzymuje doskonale nasze zimy i może u nas zastąpić ściernikową inkarnatkę. Sieje się ją wczesną jesienią z żytem. Na morg 30—45 kg. wyki i 45—70 żyta świętojańskiego. W połowie maja mamy już bardzo obfity pokos paszy. Ziarno wyki piaskowej zbierać z zasiewu zimowego.

Seradella. *(Ornithopus sativus).* Jednoroczna roślina. Nadaje

się na piaski, ale też i na suche glinki. Wsiewać najlepiej w żyto rzędowo wczesną wiosną. Po zbiorze żyta zaczyna się dopiero rozwijać. Pokos z początkiem września; doskonała pasza. Dobry międzyplon na zielony pognój.

Esparceta. *(Onobrychis sativa).* Nadaje się na grunty suche, wapniste, płytkie. Warunkiem udawania się obfitość wapna w podglebiu. Esparceta trwać może lat kilkanaście. W pierwszyw roku szkodzą przymrozki. Nie znosi spasania. Jeden pokos. Przykrycie nasienia ekstyrpatorem. Wysiew w owies. W latach następnych dobrze jest podsiewać pod bronę, puste miejsca. Jako domieszka nadaje się rajgras francuski.

Nostrzyk. (*Melilotus albus).* Dobry na pastwisko dla owiec. Może być używanym na zieloną paszę. Krowy przyzwyczajają się do jego przenikliwego zapachu. Nadaje się na bardzo jałową grunty, odłogi. Jest rośliną wieloletnią. Daje w 1-ym roku 3—4 pokosy. Może być stosowany na zielony pognój, jako międzyplon. Sieje się na wiosnę w roślinę ochronną, lub w lecie w ściernisko.

Tymotka. (*Phleum pratense).* Trawa u nas najwięcej rozpowszechniona. Nadaje się na wszelkie grunty. Odpowiednia na cięższe grunty. Daje w 2-gim roku użytkowania największy plon; trwa 4—6 lat. W mieszankach daje się jej do 20% czystego wysiewu. Lepsza na paszę koszoną, jak na pastwisko.

Trawa kupkowa. *(Dactylis glomerata).* Trawa doskonała, która się u nas rozpowszechnić powinna jako dodatek do koniczyn zasiewanych na użytek 2 lub 3-letni. Nieodpowiednia tylko na piaski.

Rajgras włoski. *(Lolium italicum).* Doskonały na paszę koszoną i zalecać go należy jako przymieszka do koniczyny czerwonej lub szwedzkiej na użytek jedno — lub dwuletni. Nierozstrzygniętą jest jednak rzeczą, jak on będzie znosił mroźne, bezśnieżne zimy.

Rajgras angielski. *(Lolium perenne).* Może być zasiewany w mieszankach tylko na długotrwalny użytek na pastwiska i pasze koszone.

Rajgras francuski. *(Arrhenatherum elatior).* Nadaje się na pasze koszone. Nie należy do traw bardzo trwałych. Już pierwszego roku daje obfity pokos. Na dobrych ziemiach daje 3—4 pokosy. Jako przymieszka do esparcety, koniczyn.

Kostrzewa owcza. (*Festuca ovina).* Trawa doskonale znosząca suszę. Choć niewielkiej wartości nadaje się na pastwiska, na suche grunta w mieszance i może służyć jako przymieszka do innych lepszych traw.

Stokłosa bezostna. *(Bromnis inermis).* Należy również do traw opornych na posuchę. Pasza twarda, średniej wartości. Trwa lat kilkanaście. Daje pokos już 1-go roku po zasianiu. Sieją ją zwykle samą.

Mohar. *(Setaria germanica).* Jest uznany przez p. Dyrektora Frommla na podstawie długoletniego doświadczenia, jako w naszych warunkach bardzo pewna roślina pastewna. Wartość jej w tem, że może być siewany późno, że znosi dobrze posuchę; że ma krótki okres wegetacyjny.

Sorgo. *(Sorghum sacharratum).* Rozmaite odmiany zasługują na uwagę specyalnie na gruntach suchych w klimacie ciepłym. W tych okolicznościach dać może większą masę paszy jak zielona kukurydza. Wysiew w końcu maja. Nadaje się do uprawy

ścierniskowej. Na morg wysiewa się 20 kg. rzędowo w odległości rzędów 37—42 cm. a w rzędach 10—12 cm. Ogrzebywanie tak jak przy kukurydzy.

Kukurydza. Przeciwko wronom pożerającym nasienie zaleca Tetard: 6 litrów smołowca, 3 litry nafty i 1 litr kwasu karbolowego wymięszać i wsypać do tego 12—13 hl. nasienia. Smołowiec podgrzewa się ostrożnie i wlewa następnie naftę i kwas karbolowy. Otrzymuje się w ten sposób łatwo płynną mięszaninę. W paczce szerokiej rozsypuje się korzec zboża i polewa 1 litrem mięszaniny, a następnie mięsza starannie szuflą, by każde ziarno stało się czarnem.

Dla ułatwienia rozsiewu Tetard daje na 10 hl. około 10 litrów drobno sproszkowanego fosforytu i mięsza. Nasiona można potem rozsiewać ręką lub siewnikiem. Manipulacya ta powstrzymuje kiełkowanie o 2—3 dni.

Gorczyca biała. *(Sinapis alba).* Zaleta: szybki rozwój w 5—6 tygodni, obfity pokos. Siać w odstępach co 1—2 tygodni. Nadaje się na grunty żyzne, w kulturze — można siać w każdej porze roku. Doskonała pasza dla krów. Rzutowo na morg 10—12 kg. nasienia. Kosić w czasie kwiatu. Zasiew mięszany z tatarką.

Brukiew. *(Brassica napus rapifera).* Na ciężkie lub mokre grunty gdzie się nie udają inne rośliny pastewne. Flancuje się z rozsady w rzędy na 40—50 cm. W rozsadniku rzędy na 10 cm. Wyjmując z rozsadnika nie wyrywać lecz podważać z ziemią młode roślinki i dopiero wówczas otrząsać je z ziemi. Brukiew przechowuje się gorzej od buraków przez zimę. Na morg 2—3 kg. nasienia.

Rzepa. *(Brassica rapa rapifera).* Zalecaną być może jako uprawa w ścierniskach w lipcu lub w sierpniu. Na morg 1.5—3 kg. ziarna przy siewie rzutowym, 1—2 kg. przy siewie rzędowym. Rzędy na 30—35 cm. Przy rzutowym siewie zamiast ograbywania silne bronowanie.

Bulwa. *(Topinambur. Helianthus tuberosus).* Roślina trwała, mogąca być 4—5 lat na jednem miejscu. Nadaje się na liche odłogi. Sadzenie w rzędy na 75 cm. W rzędach 40—45. Po 5-ciu latach można siać znowu na tem samem miejscu. Bulw w kopcach i piwnicach długo przechowywać nie można.

Kapusta głowiasta. *(Brass ol. acephala).* Na mokre lub torfiaste grunta, daje dużą masę zielonej paszy. Sadzi się ją z rozsady w końcu maja na 50—100 cm. w kwadrat. Liście obrywa się w miarę potrzeby zaczynając od sierpnia.

Szporek. *(Spergula arvensis)* Mały, nadaje się na pastwisko. Odpowiedni na lekkie grunta, jako przedplon. Zaleca się szybkim rozwojem 6—8 tygodni. Zachwaszcza grunt. Wysiewa się na morg 10—12 kg.

Mięszanki pastewne

biorąc za podstawę do obliczenia ilości wysiewu przeciętną wartość nasienia. Kupując nasienie koniczyn lub traw należy je zawsze poddawać kontroli stacyi doświadczalnej. Wysiew na morg.

Na piaski lekkie i ubogie.

I *a.* na morg: łubinu żółt.	60 kg.	I *b.*	Seradelli	12 kg.
wyki	40 »		łubinu żółt.	60 »
hreczki	25 »		hreczki	35 »
	125 kg.			107 kg.

Pastwisko krótkotrwałe na piaskach.

II *a.*	przelotu	12	kg.
	koniczyny czerw.	4	»
	» białej	4	»
	tymotki	4	»
	kostrzewy owczej	8	»
		32	kg.

Pastwisko na piaski na I—2 lat:

II *b.*	koniczyny białej	2·4	kg.
	» szwedz.	1·0	»
	przelotu	3·0	»
	lucerny chmiel.	1·0	»
	rajgrasu ang.	7·6	»
	» włosk.	1·5	»
		16.5	kg.

Na glinki i gliny na paszę koszoną:

III *a.*	wyki	60	kg.
	bobiku	40	»
	owsa	30	»
		130	kg.

III *b.*	żyta	30	kg.
	wyki	30	»
	hreczki	20	»
		80	kg.

III *c.*	gorczycy	12	kg.
	hreczki	10	»
		22	kg.

III *d.*	koniczyny czerw.	8	kg.
	rajgrasu włosk.	12	»
		20	kg.

III *e.*	koniczyny czerw.	4	kg.
	» szwedz.	4	»
	rajgrasu włoskiego	12	»
		20	kg.

III *f.*	wyki piaskowej	50	kg.
	żyta	50	»
		100	kg.

III *g.*	lucerny	18	kg.
	trawy kupkowej	21	»
		39	kg.

III *h.*	esparcety	110	kg.
	rajgrasu franc.	40	»
		150	kg.

Na mokre grunty I—3 lat:

IV.	koniczyny szwedz.	6	kg.
	» czerw.	4	»
	tymotki	2	»
	wyczyńca łąkowego	2	»
		14	kg.

Dla ciężkich mokrych podgórskich gleb na 2—3 lat:

V.	koniczyny szwedz.	6	kg.
	» czerw.	6	»
	trawy kupkowej	6	»
	tymotki	4	»
		22	kg.

Pastwisko na ciężkie grunty podgórskie na użytek 3—6 lat:

VI.	koniczyny czerw.	1	kg.
	» białej	1	»
	» szwedz.	6	»
	rajgrasu franc.	6	»
	trawy kupkowej	8	»
	tymotki	4	»
	wikliny łąkowej	3	»
	wyczyńca łąkowego	1	»
	mietlicy rozłogowej	1	»
		31	kg.

Łąki trwałe.

VII. Na łąki stałe na glinkach umiarkowanie wilgotnych:

tymotki	2	kg.
wyczyńca łąkowego	6	»
trawy kupkowej	4	»
kostrzewy trzcinow.	1	»
» łąkowej	9	»
rajgrasu włoskiego	3	»
wikliny	10	»
rajgrasu angiel.	3	»
mietlicy rozłogow.	1	»
konicz. czerw. trw.	2	»
» białej	1	»
» szwedzkiej	2	»
	44	kg.

Na łąki torfowe trwałe (torf nizinny), według stacyi doświadczalnej bremeńskiej: na morg:

VIII.	Ostrzycy trzcinowatej *(Phalaris arundinacea)*	1·3 kg.
	Tomki wonnej *(Antoxantum odoratum)*	0·1 »
	Wyczyńca łąkowego *(Alopecurus pratensis)*	1·3 »
	Tymotki *(Phleum pratense)*	2·0 »
	Mietlicy rozłogowej *(Agrostis alba stolonifera)*	1·8 »
	Wikliny szorstkiej *(Poa trivialis)*	0·8 »
	» łąkowej *(» pratensis)*	2·0 »
	Kostrzewy łąkowej *(Festuca prat.)*	6·4 »
	Rajgrasu angielskiego *(Lolium perenne)*	1·4 »
	» włoskiego *(» italicum)*	0·9 »
	Komonicy błotnej *(Lotus uliginosus)*	1·0 »
	Koniczyny szwedzkiej *(Trifolium hybridum)*	1·0 »
	» białej	1·0 »
	Kminku *(Carum carvi)*	1·0 »
		22·0 kg.

IX.*) **Podsiew łąk** uskuteczniać należy po zbiorze siana; rozsiać i przywałować; Weinzierl doradza używać mięszanki składającej się z:

Trawy kupkowej	6·5 kg.
Tymotki	1·6 »
Grzebienicy	0·5 »
Wikliny łąkowej	0·4 »
Mietlicy rozłog.	0·3 »
Konicz. szwedz.	0·5 »
	9·8 kg.

Pastwiska stałe według Dr. Weinzierla:

Na glinki średnio wilgotne:

X *a*.	Koniczyny białej	1·4 kg.
	» szwedz.	0·8 »
	Komonicy posp.	0·8 »
	Tymotki	2·1 »
	Wikliny łąkowej	2·1 »
	Grzebienicy	6·0 »
	Rajgrasu angielsk.	9·5 »
	Kostrzewy łąkow.	6·6 »
	Trawy kupkowej	4·3 »
	Owsika złotego	0·9 »
		34·6 kg.

Na grunty ciężkie i gliny:

X *b*.	Konicz. czerw. trw.	1·2 kg.
	» szwedzkiej	2·4 »
	Tymotki	1·0 »
	Wikliny szorstkiej	1·0 »
	Grzebienicy	6·0 »
	Mietlicy rozłogow.	1·4 »
	Rajgrasu angielsk.	6·3 »
	Kostrzewy łąkowej	6·6 »
	Trawy kupkowej	4·3 »
	Wyczyńca łąkow.	1·8 »
		32·0 kg.

Na grunty piasczyste:

X *c*.	Koniczyn. szwedz.	3·3 kg.
	Tymotki	4·2 »
	Kostrzewy owczej	3·3 »
	» czerw.	2·0 »
	» trzcin.	8·0 »
	Trawy kupkowej	4·3 »
	Stokłosy wyprost.	7·1 »
	» bezostnej	8·2 »
	Krwawnika *(Achil. mil.)*	1·6 »
		47·0 kg.

Wartość użytkowa nasion traw zależy od % czystości i siły kiełkowania. Liczba wyrażająca wartość użytkową nasienia otrzymuje się przez pomnożenie liczby wyrażającej siłę kiełkowania przez liczbę wyrażającą czystość. I tak n. p. rajgras mający czystość 95 i siłę kiełkowania 60 (wartość użytkowa 57%) będzie miał tę samą dla rolnika wartość jak rajgras o czystości 80% i sile kiełkowania 71% (wartość użytkowa 57%), gdyż jak w jednym, tak i w drugim wypadku w 100 ziarnach będzie 57 nasion rajgrasu zdolnych do wydania roślin.

*) Ilości podane = $1/3$ czystego obsiewu. Przy roślinności rzadszej wysiewać więcej.

Podane poniżej zestawienia mięszanek są obliczone według przeciętnej wartości użytkowej nasienia. Przy zasiewie musimy uwzględniać jakość nasienia, i w razie gorszego produktu należy ilość wysiewu odpowiednio zwiększyć.

Zestawienie mięszanek opierać się musi na znajomości gleby, oraz obserwacyi roślin dziko rosnących w danej okolicy. Z tego względu podane poniżej zestawienia muszą być modyfikowane, szczególniej przy powtórzonym już wysiewie na podstawie osiąganych wyników. W tym wypadku należy zasięgać porady krajowej stacyi doświadczalnej botaniczno-rolniczej we Lwowie.

Chcących się bliżej zapoznać z tą kwestyą, odsyłamy do Weinzierla-Górskiego: »O zestawieniu i uprawie mięszanek trawnych«, — oraz »Uprawy łąk« Sikorskiego.

Łąki.

Przy odwodnianiu łąk zwracać uwagę, by ono było w miarę, nie za małe i nie za wielkie. Poziom wody gruntowej na łące w okresie wegetacyjnym powinien sięgać 0.5 m. od powierzchni. Szczególniej na łąkach torfowych ważnem jest, by łąka nie wysychała nadto w lecie. W tym celu zatrzymywać odpływ wody w rowach przy pomocy stawideł.

Podniesienie plonu łąk osiąga się przez uprawę. Ta polega na wyrównaniu powierzchni, niszczeniu krzewów i t. p., bronowaniu i walcowaniu. Bronowanie niszczy mech, ułatwia dostęp powietrza, powinno być silne i odpowiedniemi bronami. (Laake, Gross w Lipsku). Bronowanie łąk bardzo suchych może być czasem bardzo szkodliwe. Walcowanie ma na celu przyciśnięcie roślin wyciągniętych przez mroz; pobudza krzewienie się.

Nawożenie. Kompostowanie daje ogromne rezultaty na wszelkiego gatunku łąkach. Kompost rozwozi się w zimie, rozrzuca na wiosnę bronuje. Praktycznie układać kupy kompostowe na samych łąkach. Ilość kompostu rozmaita 20—100 fur. Uprawa łąk torfowych systemu St. Paula z Jacknitz polega na wywożeniu kompostu w zimie, na zmarzniętą łąkę. (około 20 m^3 czyli 40 fur na morg). Kupki kompostu rozrzuca się jak tylko wierzchnia warstewka łąki rozmarznie, i konie jeszcze z łatwością przejść mogą, bronuje się bardzo silnie. Następnie podsiewa koniczynę szwedzką samą, lub z domieszką czerwonej w ilości około 5 kg. i tymotki 3 kg. na morg. Kompostowanie i siew powtarza co 3 lata.

Nawożenie niemal powszechnie dające dobre wyniki na łąkach jest potasowo-fosforowe: potas w postaci kainitu w ilości 300—600 kg. na morg, i 150—300 kg. tomasyny. Tomasynę zastąpić można mąką kostną odklejoną 100—200 kg.

Dawanie obornika i nawozów azotowych na łąki nie opłaca się i większość łąk, posiadających odpowiednią florę roślin motylkowych może się najzupełniej obejść bez nich. Nawozy azotowe na łąkach zmniejszają ilość roślin motylkowych.

Zamiast używać bezpośrednio gnojówki na łąki, lepiej używać ją do zlewania kup kompostowych.

Polepszenie stanu roślinności. Wpływać można na roślinność przez: 1) przyspieszanie lub opóźnianie kośby, przez co uniemożliwiamy lub utrudniamy obsiew pewnych roślin; 2) przez plewienie; 3) przez podsiew mięszanką trawną, najlepiej po zbiorze siana (patrz powyżej str. 310); 4) przez zaoranie i obsiew. Zasiew całkowity łąki poprzedzać winna staranna uprawa kilkuletnia; wynawo-

żenie obornikiem, zasiew roślin dodatnio wpływających na fizyk. własności gleby, więc okopowych. Na wytworzenie murawy trzeba dłuższego czasu. Jest ono do pewnego stopnia może ryzykiem, bo dobranie odpowiedniej mięszanki traw na trwałą łąkę jest szczególniej trudnem.

Do podsiewu łąk nie powinno się w żadnym razie używać t. zw. potrochów siennych i chwastów z pod młynka.

Nawadnianie łąk. Wartość nawadniania zależy od jakości i ilości wody. Łąki nawadniane dają największe plony. Nawadnianie ma miejsce głównie w jesieni. Woda mętna przepływająca przez dużą ilość wsi i miast, woda, w której dużo roślin i zwierząt, będzie wodą do nawadniania najodpowiedniejszą. Do nawadniania używać można kół wodnych, wiatraków. Nawadniać szczególniej wtedy kiedy temperatura wody jest wyższą od temperatury powietrza. Przy systemie zalewowym, nawadnienie powinno być przegrodzone okresami czasu, w którym łąka może dobrze obeschnąć. Zamarzanie wody na powierzchni łąki nie jest dobrem, przed mrozami łąka powinna dobrze obeschnąć.

Przeciętne i największe zbierane plony roślin gospodarskich z morga austryackiego.*)

Liczba	Rodzaj rośliny	Zbiory zwykłe z morga w q.		Zbiory największe jakie zbierano w q.	
		ziarna, kłębów, korzeni	słomy, naci, liści	ziarna, kłębów, korzeni	słomy, naci, liści
	I. Zboża.				
1.	Pszenica ozima	8—17	18—25	27.4	51.8
2.	» jara	6—11	11—23	17.2	32.2
3.	Żyto ozime	5—11	18—31	18.4	55.3
4.	» jare	4—8	8—18	12.6	28.8
5.	Jęczmień jary 2-rzędowy	8—15	9—13	20.7	28.8
6.	» » 6-rzędowy	6—11	7—14	16.1	23.0
7.	» ozimy	12—17	11—21	25.3	34.5
8.	Owies	9—18	14—34	28.8	51.8
9.	Kukurydza	9—28	17—34	41.4	51.8
10.	Proso zwyczajne	5—10	9—21	16.1	32.2
11.	Mohar	2—4	20—32	6.9	48.3
12.	Sorgo	5—11	14—21	23.0	41.4
13.	Hreczka	5—9	14—18	16.1	29.9
	II. Groszkowe.				
14.	Groch	5—12	14—23	20.7	40.3
15.	Bobik	8—16	14—28	23.0	41.5

*) Nie posiadając odpowiednich zestawień dla naszego kraju, podajemy poniższą tablicę obliczoną na podstawie najlepszych źródeł niemieckich, plony »największe zbierane« są wskazówką możliwości wyprodukowania tak znacznej masy roślinnej, przy odpowiednich sprzyjających warunkach. Są one pewnym ideałem do którego dążyć powinniśmy.

Liczba	Rodzaj rośliny	Zbiory zwykłe z morga w q.		Zbiory największe jakie zbierano w q.	
		ziarna, kłębów. korzeni	słomy, naci, liści	ziarna, kłębów, korzeni	słomy, naci, liści
16.	Soja	7—14	9—17	20.7	25.3
17.	Wyka	8—12	11—18	18.2	25.3
18.	Soczewica	5—10	4—9	16.1	16.1
19.	Fasola	7—14	7—11	20.7	17.3
20.	Wyka piaskowa (jara)	4—7	11—21	11.5	27.6
21.	» z żytem św.-jańsk.	6—11	17—31	17.3	41.4
22.	Łubin żółty	4—12	9—11	9.2	11.5
23.	» niebieski	5—11	11—17	11.5	17.2
24.	» biały	8—11	14—18	13.8	18.4
	III. Oleiste.				
25.	Rzepak ozimy	7—16	14—28	23.0	30.1
26.	» letni	5—11	9—17	15.0	25.3
27.	Rzepik ozimy	5—12	11—23	18.4	34.5
28.	» letni	4—7	8—14	11.5	23.0
29.	Lnianka	4—7	9—14	11.5	23.0
30.	Gorczyca biała	5—9	11—18	13.8	26.5
31.	Mak	4—8	11—17	11.5	26.5
32.	Słonecznik	3—6	18—29	11.5	55.0
	IV. Przemysłowe.				
33.	Len na ziarno	6—12	11—17	17.2	25.3
34.	Len na włókna	3—7	14—28	—	40.3
35.	Konopie na ziarno	3—8	14—23	11.5	32.2
36.	» » włókna	2—6	17—34	—	48.3
37.	Gorczyca czarna	4—9	11—17	13.8	25.3
38.	Kminek	6—11	11—21	17.2	31.1
39.	Koper	4—7	11—21	10.3	28.8
40.	Anyż	4—7	9—18	10.3	26.5
41.	Koriander	5—10	15—23	13.8	31.0
42.	Chmiel	szyszek 2—9		. . . .	12.6
43.	Tytoń	suchych liści 5—14		. . . .	18.4
	V. Okopowe.				
44.	Ziemniaki	58—138	14—34	184	46
45.	Buraki pastewne	138—276	34—69	391	98
46.	» cukrowe	138—230	34—59	288	75
47.	Brukiew	115—288	23—58	368	74
48.	Marchew	138—276	23—46	460	77
49.	Rzepa	115—288	23—46	460	92
50.	» zasiew ściernisk.	58—138	7—17	184	23
51.	Pasternak	92—207	18—41	288	58
52.	Cykorya	92—161	23—40	207	52
53.	Bulwy	46—115	23—58	161	81
54.	Kapusta	główek 138—276		. . . .	460

Liczba	Rodzaj nasienia	Zbiory zwykłe z morga w q. na nasienie		Zbiory zwykłe z morga w q. na paszę		Zbiory największe jakie zbierano w q.	
		ziarna	słomy	paszy zielon.	siana	paszy ziel.	siana
	VI. Pastewne.						
55.	Koniczyna czerw.	1—3	9—11	70—140	17—35	230	58
56.	» szwedz.	1—2	7—10	70—140	14—27	172	35
57.	» biała	1.5—3	11—16	40—80	9—17	103	23
58.	» inkarn.	2—4	11—17	70—100	14—21	144	29
59.	Lucerna	2—4.5	11—17	100—280	28—70	345	92
60.	» chmiel.	2—3	11—18	45—100	11—28	150	37
61.	» piaskowa	1—2	6—10	80—160	21—41	253	52
62.	Esparceta	3—5	9—18	70—140	17—34	184	46
63.	Przelot	2—4.5	14—20	45—110	11—35	184	46
64	Seradella	2—9	5—20	70—170	14—35	288	60
65.	Nostrzyk	4—9	20—40	90—180	23—46	230	58
66	Komonica	—	—	35—70	8—16	92	23
67.	Kukurydza	—	—	140—345	30—70	518	103
68	Sorgo	—	—	160—322	45—100	460	150
69.	Mohar	—	—	115—172	28—40	230	60
70.	Żyto	—	—	46—60	11—17	103	26
71.	Owies	—	—	60—80	15—20	115	30
72.	Groch pastewny	—	—	70—140	17—30	184	46
73.	Bobik	—	—	90—140	20—35	184	46
74.	Wyka pastewna	—	—	90—140	18—28	172	34
75.	» piaskowa	—	—	90—140	18—37	288	58
76.	Łubin żółty	—	—	69—138	14—29	242	48
77.	» niebieski	—	—	86—172	17—34	265	53
78.	« biały	—	—	86—172	17—34	288	58
79.	Rzepak pastewny	—	—	92—115	18—23	150	30
80.	Rzepik »	—	—	92—115	18—23	150	30
81.	Gorczyca biała	—	—	69—138	17—29	172	44
82.	Hreczka zwyczajna	—	—	58—138	15—34	172	44
	VII. Trawy.						
83.	Tymotka	1.7—3.4	5.8—11.5	46—138	20—60	184	80
84.	Wiklina łąkowa	—	—	58—114	18—37	161	52
85.	» szorstka	—	—	58—114	18—37	161	52
86.	Grzebienica posp.	0.9—1.3	—	46—92	15—30	115	37
87.	Mietlica łąkowa	—	—	58—115	29—58	150	75
88.	Rajgras angielski	1.6—2.3	13.8—18.4	69—138	23—46	173	58
89.	» włoski	1.8—2.5	23—34.5	115—161	44—61	182	69
90.	» francuski	1.7—2.3	23—34.5	69—172	22—56	207	99
91.	Kupkówka	1.2—1.7	—	172—242	70—96	300	120
92.	Kostrzewa łąkowa	1.2—1.6	4.1—7.2	69—184	30—80	230	101
93.	» owcza	—	—	34.5—58	15—25	80	36
94.	» czerwon.	—	—	46—92	20—39	115	48
95.	» trzcinowat.	1.7—2.3	—	172—253	60—92	322	115
96.	Wyczyniec łąkowy	1.1—2.3	—	69—115	29—58	196	63
97.	Owies złocisty	1.1—2.3	—	69—104	23—40	138	46

Rzadsze a dla naszych warunków przydatne sposoby przyrządzania paszy.

1. Suszenie koniczyny, siana i t. p. na rogalach, ostrzewkach, kozłach, piramidkach, przedstawia następujące korzyści: pasza łatwiej schnie, po deszczu prędko obsycha; nie potrzeba przewracać, rozrzucać, zbijać na kopice. Zasadą ułożenia siana na rusztowaniu, by leżało luźno; na mórg potrzeba 20—50 rogali [1]).

2. Przygotowywanie siana metodą zaparzania. W kilka godzin po skoszeniu układa się rośliny ścięte w wielkie kupy o 3—5 m. średnicy i 3—4 m. wysokości i udeptuje; po 24—30 godzinach następuje bardzo silne zagrzanie. Kiedy temperatura podniesie się do 70° i trawa zbrunatnieje, rozrzucają (zwykle po 48—60 godzinach od skoszenia): po kilku godzinach przesycha zupełnie.

3. Przygotowywanie siana brunatnego, Siano przeleżałe na pokosach (2—4 dni). Liście i kwiat p. b. zwiędłe ale się jeszcze mocno trzymać łodyg. Łodygi skręcone nie powinny wydawać ani kropelki wilgoci. Pokosy p. b. równomiernie przewiędnięte, trzeba je więc przewracać i układać w małe kopki. Pod spód stogu daje się słomę, chrust i t. p. Podwiędnięte pokosy układa się: 1) w małe stogi okrągłe, 3 m. średnicy u spodu; 4—5 m. wysokości, które układa jeden człowiek (25—30 q siana); 2) w duże stogi 5 m. średnicy: w środek stogu wbija się żerdź na 6—7 m. wysoką i przywiązuje sznurek w celu kontrolowania okrągłości stogu. Wierzch stogu ułożony spadzisto pokrywa się słomą.

Przy układaniu stogów zwracać uwagę na równomierne układanie i silne udeptanie. Miejsca puste, mniej ubite pleśnieją i gniją. Po ułożeniu stogu temperatura podnosi się do 80—90°, siano przesycha. Zbyt wysokie podniesienie temperatury może spowodować zwęglenie a nawet samozapalenie. Proces schnięcia trwa 5—10 tygodni. Małe stogi są bezpieczniejsze.

Kiszonki. (Fermentacya octowa przy temp. 18—35° C. f.; kwasu masłowego najsilniej przy 35—40°, kwasu mlekowego najsilniejsza koło 50° f. Dla kiszonek najodpowiedniejszą jest fermentacya kwasu mlekowego). Przy kiszonkach ubijanie, udeptywanie, prasowanie ma na celu wytworzenie jednolitej masy, przejętej sokiem roślinnym. Twardsze rośliny ugniata się silniej, daje się na spód. Kiszonka, przy której temperatura była nizką, zawiera dużo kwasu octowego i masłowego (kwaśna kiszonka). W kiszonce, przy której temperatura doszła wyżej, przeważa kwas mlekowy; k. taka jest aromatyczniejszą. Nazywają ją słodką kiszonką (ensilage). Doły do zakiszania wykopuje się w suchem położeniu o prostopadłych ścianach. Głębokość $1^1/_2$—$2^1/_2$ m. i odpowiednia do potrzeb długość. Udeptywanie paszy wykonuje się ludźmi lub zwierzętami. Pasza p. b. tak wysoko, by po opadnięciu była nieco wyżej jak krawędź rowu. Z wierzchu pokrywa się ją słomą i ziemią 0.6 m. Murowane doły (silo), betonowane lub asfaltowane (12 m. dług., 1.5—5 m. głęb., 2.5—5 m. szer.). Ze spodu otwór zamykany dla wydobywania paszy, na wierzchu dach. Pasza grubsza musi być rzniętą na sieczkę lub siekana w dole łopatami, siekaczami. Dół należy wypełnić jednego, a co najdalej w ciągu dwóch dni. Dół wypełnia się ponad powierz-

---

[1]) Bliższe szczegóły: Zbiór i przechowywanie roślin pastewnych, S. Böhmer. Tow. gospodarcze we Lwowie.

chnię i pokrywa kiszonkę deskami, obciąża 1 m.^{2} powierzchni 5 q. (t. j. około 150 cegieł). Po 7—9 tygodniach pasza jest gotowa do użytku. Przechowuje się doskonale przez zimę do wiosny. Jako kiszonki przechowywać można kukurydzę, sorgo, późno zebrane poplony, liście buraczane itp.

Liście buraczane przechowywać się dają bardzo dobrze w kopcach składanych podobnie jak buraki, kartofle.

Niszczenie chwastów.

Kanianka. Czyste nasienie. Kupując koniczynę żądać gwarancyi i kontrolować w kraj. stacyi botaniczno-rolniczej weLwowie. Niszczyć przekopywaniem kaniankę na łąkach w zaroślach itp. Przestrzegać należy, by sąsiedzi też dbali o niszczenie kanianki.

Gorczyca, ognicha. Niszczenie za pomocą zraszania 15$^0/_0$ roztworem siarkanu żelazowego. Na mórg potrzeba 200—300 litrów. Na mórg zatem 30—45 kg. siarkanu żelazowego. Używa się specyalnych do tego pomp (Dr. Schultz, Soest). Zamiast siarkanu żelazowego zalecają też zraszanie roztworem 15—40$^0/_0$ saletry chilijskiej, siarkanu amonowego lub 40$^0/_0$ soli potasowej lub kainitu. Na mórg tak samo 200—300 litrów. Sposób ten jest tańszym od siarkanu żelazowego szczególniej tam, gdzie stosujemy nawożenie azotowe pogłówne. Orka pługiem na wiosnę powoduje wydobycie na wierzch ziarna ognichy. Odpowiednim czasem do zraszania pól w celu zniszczenia gorczycy jest ten, kiedy gorczyca wyrosła na 5—7 cm. i jeszcze nie posiada pąków kwiatowych. W tych razach wystarczy jednorazowe zroszenie.

Perz. Gdzie możliwą jest głęboka orka na 25—30 cm. najradykalniejszym środkiem jest dobre podoranie z podrzynaczami. Przy płytkiej uprawie niszczyć perz można tłumieniem przez rośliny szybko się rozwijające, więc tatarkę, męszanki, gorczycę, częstem płytkiem podorywaniem i wyciąganiem perzu za pomocą ekstyrpatorów, gruberów, spasaniem owcami.

Chwasty na łąkach niszczyć można przez plewienie korzeni. Chwasty o głębokich trwałych korzeniach należy podcinać za pomocą specyalnych nożów.

Zapobieganie chorobom roślinnym. Ochrona roślin przed chorobami.

1. **Wybór odpornych odmian.** Rozmaite odmiany jednej i tej samej rośliny są rozmaicie odporne przeciw zakażeniu pasorzytami. W tym kierunku należy przeprowadzać próby i obserwacye, i niezawodnie jest to droga mająca przed sobą jak najlepsze widoki. Mogą być odmiany odporne tylko w pewnych warunkach kultury lub tylko przy pewnym stanie pogody. Mogą być znów odmiany ogólnie odporniejsze we wszelkich warunkach.

2. **Odpowiednia uprawa i nawożenie,** stanowisko w płodozmianie. Na te względy rolnicy mało zwracają uwagi, a jednak jest to droga bardzo skuteczna do zapobiegania chorobom roślinnym, a więc i podniesienia czystego dochodu w gospodarstwie.

Śnieć. Zapobieżenie śnieci jest możliwe i łatwe następującymi środkami: 1. Bejcowanie siarkanem miedziowym. Na 100 litrów wody $^1/_2$ kgr. siark. miedziow. (sinego kamienia). Do kadzi z tym roztworem wsypuje się zboże, miesza i daje go tyle, by było przykryte na 8—10 cm. wodą. Po 12—16 godzinach odlewamy płyn i zalewamy ziarno mlekiem wapiennym (6 kgr. wapna

świeżego, 110 litr. wody), przez 5 minut mieszamy i następnie rozsypujemy ziarno na klepisku, by wyschło. Wywóz nasienia w pole uskutecznia się w workach, które przez 16 godzin mokły w $^1/_2$% roztworze siarkanu miedziowego, a następnie wyschły.

2. Zalecają też po dokładnem przepłukaniu ziarna: na 100 l. 2 kg. sody (12 godzin) lub w 1 kg. soli miedziowo-sodowej (12—24 godzin) lub 2 kg. wapna (świeżego) (12—24 godzin). Ziarno musi być przykryte roztworem i należy go od czasu do czasu wymieszać. Po odlaniu wody dobrze przepłukać. Sól miedziowo-sodową nadającą się do walki z wielu chorobami roślinnemi przygotowuje fabryka w Heufeld w Bawaryi.

3. Zanurzenie ziarna na 5 minut w wodzie ciepłej (53—57° C.).

Myszy. Za pomocą 1. tyfusu mysiego, którego dostarcza Akademia weterynaryjna we Lwowie, 2. owsa strychninowanego (Aichmüller, Stryj), 3. pszenicy zatrutej arszenikiem (rozpuścić na litr wody 20 gr. arszeniku i gotować w tym roztworze pszenicę przez godzinę. Dla odróżnienia od niezatrutej zabarwić błękitem metylowym), 4. za pomocą pigułek fosforowych (apteka w Bursztynie). Ziarno wsypuje się do dziur mysich na polu odpowiedniemi rurami ze sprężynami. Środki pod 2, 3 i 4 dają pewniejsze wyniki od 1. Stosować je należy starannie, nie opuszczać dziur i powtarzać po pewnym czasie, kiedy znowu się myszy pokażą.

Niedźwiadki, turkucie, podjadki. 1) Zakładanie doniczek wypełnionych wodą wkopanych w ziemię, w które podjadki wpadają. Od doniczki do doniczki dobrze jest poukładać kije grube wciśnięte do ziemi, przez które podjadki nie mogą przeleźć i szukając dogodniejszego przejścia wpadają do łapek. 2) Wyszukiwanie i wykopywanie gniazd. 3) Zakopywanie świeżego końskiego nawozu jako przynęty i niszczenie zbierających się podjadków.

Krety. W celu odstraszenia kretów ma być dobrym karbid wapniowy, który w małych kawałkach zakopuje się do chodników kreciclı. Ten sam skutek mają dawać: zakopywanie smołowca, główek śledziowych, oraz silnie pachnących roślin jak waleriany itp.

Druciki. Walcowanie roli. Płytkie umieszczanie nasienia. Chwytaniem na skrawki kartofli.

Rosa mączna na krzewach, chmielu, winorośli daje się zniszczyć przez rozpylenie na nich drobno sproszkowanej siarki.

Rdza na liściach krzewów daje się zniszczyć przez t. zw. ciecz bordoską (2 kg. siarkanu miedziowego w 50 l. wody i 2 kg. wapna niegaszonego na 50 l. wody rozpuścić i zmieszać jedno z drugiem. Tą cieczą spryskuje się rośliny za pomocą specyalnych przyrządów.

Do niszczenia mszyc, liszek itp. dobrą jest emulsya naftowa. 100 l. wody letniej, 1—2 l. nafty, 1—2 kg. szarego mydła. Płyny zlewa się razem, silnie kłóci za pomocą miotły i rozpryskuje za pomocą szprycy.

Zapobieganie szkodom zrządzanym przez owady polegać musi głównie na niedopuszczeniu do rozmnażania się, a w drugiej linii dopiero na niszczeniu szkodników przez zbieranie, polewanie, wypuszczanie ptactwa domowego itp. Dla walki z owadami trzeba się dobrze zapoznać z warunkami rozwoju i rozmnażania szkodników. Wskazówki obszerniejsze znajdzie czytelnik w »Chorobach roślin« Franka i Soranera, wydanie c. k. Tow. G. Lwów 1896 oraz w Encyklopedyi rolniczej, Warszawa.

UWAGI I LICZBY DOTYCZĄCE HODOWLI

zestawione przez

prof. Stanisława Chaniewskiego.

Wartość pokarmowa główniejszych materyałów pastewnych.

W załączonych tu tablicach podajemy skład pasz najczęściej u nas spotykanych z uwzględnieniem tylko strawnej części poszczególnych składników*).

Rolnik musi wiedzieć przedewszystkiem, ile się w danej paszy znajduje suchej substancyi wogóle, bez względu na to, z czego się ona składa. Wymagania organizmu zwierzęcego, by pasza miała pewną objętość, wystarczającą do wypełnienia przewodu pokarmowego stałym mniejwięcej materyałem, muszą być zadowolone, jeżeli zdrowie zwierzęcia na stałe utrzymanem być ma. Składniki pokarmowe pasz zebrane są tu w czterech grupach: azotowe, tłuszcze, bezazotowe wyciągowe i włóknik, i oznaczone równo jak sucha substancya w % świeżej masy, tj. w stosunku do zawartości ich w 100 częściach paszy w stanie naturalnym. Strawność składników pasz podana tu jest przeciętnie z oznaczonej dla różnych zwierząt gospodarskich zapomocą bezpośrednich doświadczeń. Większość pasz wszystkie zwierzęta gospodarskie mniej więcej jednakowo dobrze trawią. Wyjątkowo pasze ubogie, twarde, obfitujące w zdrewniały włóknik, gorzej od przeżuwających trawi koń, a bardzo słabo świnia. Stąd przy spasaniu temi zwierzętami wypadłoby strawność ich zredukować, tj. przyjąć ilość składników pokarmowych niższą jak podana w tabeli o 20 względnie o 40%. W paszy objętościowej konie najgorzej wyzyskują tłuszcz i włóknik. Pod rubryką «Azotowe» umieszczą się ciała białkowe, jakoteż i wszystkie inne niebiałkowe zawierające azot związki. W rubryce «Amidy itp.« są właśnie wszystkie te ciała nie białkowe podane, które razem z właściwemi białkami grupę pierwszą «Azotowe» stanowią. Nie odtrącaliśmy ich od białkowych, ponieważ uważamy ich rolę w organizmie za bardziej zbliżoną do roli białkowych (proteinów), jak np. do węglowodanów (bezazotowych wyciągow.), do których je niektórzy włączają (Kühn, Stutzer). Ponieważ jednak występowanie ich w większych ilościach w niektórych paszach warunkuje mniejszą ich przydatność dla niektórych użytków np. produkcyi pracy, mięsa (inwentarz roboczy, młodzież), przeto zamieszczamy tę grupę «Amidy itp.« oddzielnie dla oryentacyi. Przy produkcyi znów mleka większe ilości amidów cechują zazwyczaj paszę dodatnio na tę produkcyę oddziałującą.

W grupie »Tłuszcz» mieści się strawna część wyciągu eterowego czyli t. zw. surowego tłuszczu. W rubryce «Bezazotowe» umieściliśmy węglowodany oprócz włóknika oraz całą resztę stra-

---

*) Tablice te różnią się od zazwyczaj podawanych tem, że dają tylko odpowiedź na kwestye bezpośrednio rolnika obchodzić mogące, wszelkie inne dane, stanowiące zwykle próżny balast, z umysłu pominiętemi tu zostały.

wnych składników nie podpadających pod żadną z grup 2-3 i 5. Pod względem wartości pokarmowej uważamy je za równoważne z węglowodanami właściwymi (skrobią). Ciała tu wliczane niewłaściwie, bo nieposiadające wartości odżywczej = węglowodanów (kwasy np.) występują zazwyczaj w tak niewielkich ilościach, że na wynik rachuby nie wywierają wpływu.

Włóknik strawny nie doliczamy do poprzedniej grupy, ponieważ przy trawieniu jego zachodzą względnie do innych składników większe straty, w bezwartościowych gazowych produktach, jak metan, wodor, i różnych kwasach tłuszczowych, a nadto ze względu na znaczną pracę, jakiej samo żucie i trawienie wymaga. Straty wynikające stąd dla różnych zwierząt nie są jednakowe, stąd musimy przy przeznaczeniu pasz dla nich włóknik niejednakowo oceniać. U przeżuwających dorosłych można go rachować w 80%, u koni najlepiej wcale go nie rachować, bo nakład pracy na jego strawienie wynosi czasami więcej, jak pożytku organizmowi strawiona część dać może.

Przeważna część pokarmu zwierzęcia (dorosłego) nie idzie na budowę i odnowę elementów ustroju, ale używaną bywa na wyprodukowanie energii tj. na wytworzenie ciepła dla ogrzania organizmu i na dokonanie koniecznej mechanicznej pracy *). W pokryciu tych potrzeb ciała ciałkowe są równej wartości jak węglowodany, tłuszcze zastępować mogą węglowodany w stosunku swej większej wartości spalnej, a zatem jak 1 : 2, 4, wreszcie włóknik ze względów wyżej wymienionych liczyć i tu trzeba niżej, przyjmujemy go w połowie wartości tj. 1 = $1/_2$ węglowodanu.

Na zasadzie tej równowartości (izodynamii) składników, dochodzimy do otrzymania wspólnej miary dla wszystkich pokarmów. Azotowe + 2.4 × Tłuszcz + Bezazotowe + $1/_2$ Włóknik = n (J. K.). Przyjęto oznaczać wartość wszystkich składników w jednostkach wartości spalnej skrobi, które nazywamy jednostkami karmowemi J. K.

W rubryce ostatniej mamy wartość każdej paszy podaną w takich J. K. — co znaczy, że 100 części wagi danej paszy posiada równą wartość pokarmową jak wpisana tu ilość tych jednostek wagi skrobi. Dla szybkiego przeglądu i sprawdzeń znajomość tej wielkości jest bardzo pożądana. Wreszcie ilość J. K. × 4100 daje wartość paszy w cal. (jednostka ciepła). Wszystkie ilości poszczególnych składników podaliśmy tu w 3 cyfrach: minimalnej, maximalnej i przeciętnej, średniej z wielu oznaczeń. Tylko w razie gdy posiadany dotychczas materyał analistyczny był niedostateczny, podano jedną cyfrę średnią.

Skład chemiczny wszelkich pasz i surogatów pastewnych nie jest bynajmniej stałym — wahania są tu nieraz bardzo znaczne zależnie od warunków powstania, sposobu przygotowania i przechowania pasz. Chcąc znaleźć podstawę do możliwie dokładnego ocenienia posiadanej paszy, wypadnie uprzytomnić

*) Rzeczywista wartość spalna (kalorymetryczna) ciał białkowych jest wyższa jak węglowanów: od 5479 (conglutyna) do 5942 (albumina rośl.). W organizmie zwierzęcym utlenienie ich jest niedostateczne i dają energii niewięcej jak węglowodany. Tłuszcze średnio dają 1 gr. — 9300 cal., węglowodany od 3755 (cukier gronowy) do 4188, włóknik średnio 4100.

sobie wszystkie czynniki mogące na zmianę składu danej paszy w tym lub w innym kierunku wpłynąć i wybrać w granicach wskazanych w tabeli wartość najodpowiedniejszą dla niej. Używanie w tym celu tylko cyfr przeciętnych, jak się to najczęściej dzieje, nie jest właściwe. Możność popełnienia omyłki jest równie wielką: nasza pasza może być bogatą lub ubogą w dany składnik, i liczba średnia omyłki nie zniesie. Średnie wartości przydatne są w większych rachunkach, jak w układanych z góry preliminarzach, kontroli ogólnej większych jednostek gospodarczych itp. Dla praktycznego zaś użytku codziennego jako dyrektywa w postępowaniu rzeczywistem, w wykonaniu zalecić możemy tylko użytkowanie z cyfr *od* — *do* z każdorazowym stworzeniem wartości rzeczywistej dla danej naszej paszy i wiadomego jej przeznaczenia najodpowiedniejszej.

Czynniki, na które przy ocenie pasz zwrócić trzeba uwagę, będą: a) wiek roślin w chwili sprzętu, b) pogoda w czasie sprzętu, c) sposób sprzętu i przechowanie. Dalej d) grunt, nawożenie, uprawa, e) klimat ogólny miejscowości i poszczególny w roku danym, wreszcie f) odmiana rośliny. W środkach karmowych, stanowiących odpadki przemysłowe, gra rolę sposób fabrykacyi, pochodzenie i przechowanie. W ogólnych rysach zauważymy, że rośliny młode w normalnych warunkach wyrośnięte są najbogatsze w azotowe ciała wogóle, pomiędzy niemi ilość amidów znacznie większa stosunkowo, przytem jako miękie są najłatwiej strawne, z wiekiem (najczęściej od zakwitnięcia) ubożeją w proteiny i stają się wogóle mniej strawne. Sprzęt powoduje mechaniczne straty, okruszenie itp. najcenniejszych części.

Deszcz powoduje wyługowanie głównie amidów, węglowodanów, wszelkich używek i soli mineralnych; dłuższy — zepsucie zupełne paszy. Przechowanie dłuższe, choćby najlepsze, pociąga za sobą straty wszystkich strawnych składników dosyć znaczne, a nadto zmniejsza się względna strawność paszy. Susza daje rośliny przed czasem zdrewniałe, uboższe w strawne węglowodany. Nadmiar wilgoci i brak światła daje rośliny wodniste, wybujałe, ubogie wogóle itd. Ziarna chude, spalone, połegnięte i poślednie wogóle, są bogatsze w proteiny a uboższe w bezazotowe w. i tłuszcze.

Przy nabywaniu surogatów pastewnych w formie odpadków przemysłowych, należy żądać poręczenia składu paszy. Wogóle da się tu powiedzieć, że gdzie fabrykacya, dająca odpadek jest bardziej technicznie udoskonaloną, tam najczęściej pasza stąd otrzymana jest gorsza, np. otręby, wytłoki, makuchy (z ekstakcyi), wywar. Nadto zazwyczaj im produkt użyty do przerobu technicznego był lepszy, tem pasza utrzymana w odpadkach gorsza. Np. wywar z dobrych kartofli — gorszy (więcej wody do zcukrowania użyto). Przy gorszym ziarnie jest więcej i lepszych otrąb itp.

Przykład użycia tablic. Przypuśćmy, że mamy siano z dobrej bardzo łąki i wcześnie sprzątnięte, ale było ono na deszczach. W naszych warunkach klimatycznych bardzo dobre siano miałoby skład przybliżony: 84% suchej substancyi, a części strawnych azotowych 9.5%, tłuszcze 1.7%, bezazotowe wyciągowe 30%, włóknika 14%, amidów 5%. Wskutek dłuższych deszczów straty mogą być: w amidach 60%, w bezazotowych 20%, w białku do 10%. Musimy przyjąć zatem do rachunku nasze siano, o ile

nie straciło smaku, jako mające maximum: 5.2% azotowych, 1.8% tłuszczów, 24% bezazotowych, 15% włóknika, 2% amidów i 86% suchej substancyi. Wartość pokarmowa spadła tu z 50.5 na 39 J. K.

Dla ilustracyi zmian, zachodzących w stosunku ciał białkowych do niebiałkowych w grupie oznaczonej w składniki «azotowe», podajemy parę przykładów.

Tablica I.

Rodzaj paszy	% azotu w suchej substancyi	Z całego azotu %	
		w białku	w amidach
Siano łąkowe sprzęt d. 24/4	4.01	78.2	21.8
» » » d. 13/5	2.61	81	19
» » » d. 10/6	1.96	85.2	14.8
» » » d. 26/6	1.35	92.5	7.5
Trawa kupkowa kwitnąca	1.40	6.89	31.1
» » dojrzała	1.04	79.5	20.5
Tymotka nawożona 6/6	2.0	61	39
» nie »	1.2	71.3	28.7
» nawożona 28/6	1.34	68.7	31.3
» nie »	0.83	77	22.9
Trawa łąkowa świeża	1.60	84	16
Ta sama zakons.: słodka	1.89	61.4	38.6
» » kiszonka	1.86	51	49
Kukurydza zakon. bad. 28/11	1.61	72.9	27
» ta sama » 7/12	1.49	67.5	32.5
» » » 11/1	1.63	58.9	41.5
» » » 3/2	1.62	43.8	56.2
Kartofle nienawożone	1.14	83.4	16.6
» 2 ctn. saletry na hektar	1.46	74	26
» 3 » » » »	1.80	59.7	40.3
Łubin żółty niedojrzały	7.00	78	22
» » dojrzały	6.84	92.5	7.5
» » odgoryczony	6.26	98.5	1.5
Melasa maximum	2.45	77.3	75.7
» minimum	1.32	24.3	22.7

Tablica II.

Rodzaj paszy Zawartość w 100 częściach wagi:	Suchej substancyi	Strawnych składników: Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	Jednost. karmow.
Zieleniny.							
Pastwisko młode	20.5*)	3.26	0.5	7.75	2.92	0.9	13.4
	19.1-23.1	2.0-4.6	0.4-0.8	5.9-9.9	2.7-3.2	0.6-1.6	—
» średn.	24.75	2.77	0.55	8.3	3.99	0.9	13.1
dobroci bydlęce	19.4-34.3	1.3-4.9	0.3-0.8	6.6-10.9	3.0-5.2	0.4-1.7	—
Pastwisko b. do-	22.0	3.4	0.7	8.1	2.9	1.1	14.6
bre wypasowe	—	—	—	—	—	—	—
Trawa łąkowa	25.20	1.93	0.48	7.52	5.09	0.18	14.2
wczas rznięta	15.6-30.7	0.9-2.9	0.4-0.7	6.6-10.3	3.8-5.1	0.08-0.3	—
Trawa z zalewa-	19.15	2.45	0.4	6.16	3.22	0.8	11.3
nych łąk dobra	12.4-25.5	1.3-3.6	0.2-0.7	5.5-7.9	3.0-3.8	0.4-1.2	—
Trawa kupkowa	32	1.9	0.5	14.6	4.8	0.5	16.2
	—	—	—	—	—	—	—
Rajgras angielski	26.5	1.6	0.3	7.3	4.7	0.5	12
	—	—	—	—	—	—	—
Rajgras włoski	26	2.1	0.4	8.8	3.7	0.5	13.7
	—	—	—	—	—	—	—
Tymotka	30.0	1.2	0.3	9.9	5.1	0.4	14.4
	—	—	—	—	—	—	—
Trawy słodkie	28.0	1.9	0.4	8.92	4.8	0.5	13.5
	—	—	—	—	—	—	—
Koński ząb	17.1	0.7	0.25	5.5	2.7	0.3	8.0
	10.5-23.3	0.4-1.7	0.1-0 5	4.9-8.2	2.7-3.5	—	—
Kukurydza wczesna	19.4	1.0	0.3	6.7	3.1	0.4	10.0
	—	—	—	—	—	—	—
Sorgo	21.5	1.4	0.3	7.1	3.7	0.4	11.1
	—	—	—	—	—	—	—
Mohar	26	1.8	0.3	7.0	5.0	0.7	11.8
	—	—	—	—	—	—	—
Żyto św.-jańskie	24.0	1.8	0.4	8.0	4.4	0.7	13
	—	—	—	—	—	—	—
Koniczyna czerw.	16.9	3.40	0.40	5.98	2.05	1.2	11.3
b. młoda past.	13.1-19.9	2.1-4.6	0.3-0.6	5.3-7.3	1.6-2.5	—	—
Koniczyna początek	19	2.48	0.48	6.32	2.96	0.9	9.9
tek kwitnienia	13.9-23.8	1.9-3.0	0.3-1.0	5.3-7.7	2.1-3.3	—	—
Koniczyna w pełnem	21.0	2.18	0.37	6.67	2.6	0.6	10.2
nem kwiecie	14.7-29.5	1.5-3.8	0.2-0.7	5.2-7.8	2.3-3.2	—	—
Konicz. ściernisk.	16.2	2.91	0.44	4.9	1.4	1.0	11.0
pastwisko jesien.	12.9-19.5	2.1-3.5	0.4-0.5	—	—	—	—

*) Cyfry w środku kolumn, ponad dwoma innemi, oznaczają skła[d] średni; umieszczone pod niemi znaczą: od—do. Pojedyncza cyfra je[st] przeciętną, jak również wszystkie w ostatniej kolumnie p. t. Jedno[]stki karmowe.

Rodzaj paszy Zawartość w 100 częściach wagi:	Suchej substancyi	Strawnych składników					
		Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	Jednostek karmow.
Konicz. z trawami	15	1.69	0.38	5.12	2.96	0.9	11.5
pastwisko	—	1.3-2.2	0.3-0.6	4.4-5.8	2.9-3.1	—	—
Koniczyna z trawami w kwiecie	17.41	2.85	0.44	4.54	1.86	1.05	12.2
	14.4-18.9	1.5-3.8	0.4-0.6	4.2-5.5	1.3-2.6	—	—
Koniczyna biała	18.50	2.80	0.58	4.72	2.60	0.8	10.1
początek kwitn.	16.4-20.3	1.9-3.4	0.5-0.6	—	—	—	—
Inkarnatka podczas	18.5	1.56	0.31	4.59	2.72	0.6	8.6
kwitnienia	15.3-30.1	1.2-2.1	—	—	—	—	—
Konicz. szwedzka	17.8	2.37	0.50	4.54	2.88	0.7	8.4
początek kwitn.	13.0-23.3	2.1-2.6	—	—	—	—	—
Nostrzyk w pełnym	20.3	2.60	0.44	5.04	2.75	0.8	10.0
kwiecie	18.7-22.9	1.9-3.3	—	3.5-6.3	1.6-3.6	—	—
Lucerna s. począ-	24.0	3.19	0.37	6.34	2.86	1.2	11.2
tek kwitnienia	18.0-27.8	2.6-3.8	—	—	—	—	—
Esparzeta początek	19	2.64	0.40	6.24	2.48	0.9	11.0
kwitnienia	15.4-22.7	2.0-3.4	—	—	—	—	—
Seradela początek	13.3	1.99	0.38	3.58	1.66	0.7	8.9
kwitnienia	12.6-14.2	1.5-2.6	0.2-0.5	—	1.6-1.8	—	—
Groch pocz. kwi-	15.4	2.89	0.29	3.16	2.27	0.7	9.0
tnienia	14.0-16.5	2.5-3.2	0.1-0.5	2.7-4.2	1.6-2.3	—	—
Bobik pocz. kwi-	15.0	2.26	0.52	4.11	1.57	0.8	8.4
tnienia	—	2.0-2.5	0.4-0.6	3.0-5.0	1.1-1.9	—	—
Wyka siewna pocz.	15.5	2.92	0.30	3.96	2.15	0.7	8.7
kwitnienia	15.0-16.0	2.7-3.1	0.2-0.4	3.6-4.4	2.1-2.2	—	—
Wyka piaskowa	16.6	2.88	0.41	3.58	2.33	0.6	9.0
przez ciąg kwitn.	14.4-20	2.1-3.8	0.3-0.5	2.9-4.4	2.1-2.4	—	—
Łubin żółty pocz.	12.2	2.16	0.17	3.08	2.18	1.3	7.9
kwitn.	10.8-13.5	1.7-2.7	0.1-0.3	2.6-3.4	1.8-2.6	—	—
Przelot przed kwi-	18.0	1.5	0.21	5.5	2.7	0.6	8.8
tnieniem	15.1-20.1	0.8-1.8	0.2-0.4	2.5-6.5	0.9-2.8	—	—
Łubin ż. pocz. str.	15	2.2	0.3	3.5	3.5	1.3	7.9
	15.7-18.8	1.7-2.5	0.1-0.4	3.3-5.0	3.2-3.8	—	—
Peluszka	16.5	2.9	0.4	2.8	2.5	1.0	7.9
	—	—	—	—	—	—	—
Wyka ptasia	25	4.3	0.4	7.7	2.5	1.5	14.2
	—	—	—	—	—	—	—
Szporek w kwiecie	19.7	1.55	0.26	6.67	2.9	0.4	10.3
	10.2-24.6	0.8-2.3	0.2-0.4	—	—	—	—
Gryka w kwiecie	16.3	1.56	0.4	5.17	2.54	0.3	8.5
	12.5-26.4	1.0-2.0	0.3-0.5	3.9-6.8	1.7-3.2	0.2-0.4	—

Rodzaj paszy Zawartość w 100 częściach wagi:	Suchej substancyi	Strawnych składników					
		Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	Jednostek karmow.
Gorczyca biała początek kwitn.	14.9 12.6-18.9	1.92 1.0-2.8	0.25 0.1-0.4	4.87 3.4-5.3	1.51 1.7-2.7	0.6	8.0 —
Liście buraczane (b. pastewne)	11 7.3-22.4	1.55 0.8-2.2	0.21 0.1-0.3	3.45 1.7-5.1	0.92 0.7-1.4	0.7 —	6.0 —
Buraka cukrowego liście	12 8.4-20.7	1.67 1.1-2.2	0.24 —	3.36 2.8-4.4	1.22 0.9-1.6	0.4 —	6.2 —
Nać marchwi	18.20 —	2.2 —	0.5 —	5.3 —	1.7 —	0.6 —	9.6 —
Nać kartofl. młoda	15 —	2.1 —	0.2 —	4.8 —	1.4 —	0.7 —	7.1 —
» » starsza przed kopaniem	22 —	1.0 —	0.3 —	6 —	2.3 —	0.4 —	8.8 —
Kapuściane liście	14.3 7.6-23.6	1.8 1.0-2.6	0.25 0.1-0.4	5.7 4.0-6.6	1.7 1.2-2.2	0.6 —	9.3 —
Nać bulwy *(Helianth. tub.)*	44.68 —	2.01 1.4-2.7	0.7 0.4-0.9	18.77 16.8-20.7	4.27 3.1-4.3	0.3 —	24.71 —
Chmielowa nać i liście	34.0 —	3.0 —	0.9 —	9.4 —	3.8 —	0.8 —	16.5 —
Kiszonki.							
Trawa łąkowa	25.6 13.0-35.5	1.97 1.3-2.9	0.82 0.4-2.5	5.99 3.6-6.9	4.62 4.1-5.7	0.8	10.9
Koniczyna z trawami	20.05 —	2.2 1.7-2.4	0.6 0.4-0.8	5.06 4.0-5.9	3.28 3.2-3.4	1.05 —	11.5 —
Koński ząb	18.5 10.1-42.4	0.79 0.5-1.6	0.6 0.2-1.3	6.19 3.5-8.2	3.19 1.6-4.3	0.4 —	9.7 —
Liście buraczane	22.4 10.5-31.9	1.96 0.7-4.3	0.67 0.3-1.2	5.43 4.3-7.5	1.76 0.7-2.1	1.3 1.0-1.5	9.6 —
Esparzeta jasna kw.	16.7 —	1.7 —	0.7 —	3.0 —	2.4 —	1.2 —	7.6 —
Esparzeta słodka ciemna	17.5 —	1.3 —	0.8 —	4.1 —	1.9 —	0.8 —	8.2 —
Żyto pastewne kw.	13.1 —	0.9 —	0.3 —	3.4 —	2.6 —	0.4 —	6.3 —
Owies w wiechach kw.	23.7 —	1.1 —	0.4 —	6.01 —	5.1 —	0.5 —	10.5 —
Kartoflana nać kw.	23.0 —	1.2 —	1.2 —	4.4 —	1.8 —	0.9 —	9.4 —
Łubin żółty kw.	16 —	2.2 —	1.1 —	2.7 —	3.4 —	1.2 —	9.2 —

Rodzaj paszy Zawartość w 100 częściach wagi:	Suchej substancyi	Strawnych składników					
		Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	Jednostek karmow.
Seradela kw.	21.1 —	2.6 —	0.5 —	6.5 —	2.9 —	1.2 —	11.7 —
Koniczyna czerw. jasna	20.8 —	2.8 —	1.5 —	4.2 —	2.9 —	1.3 —	12 —
Koniczyna ciemna sł.	19 —	2.4 —	1.4 —	3.0 —	3.0 —	0.8 —	10.3 —
Konicz. szwedzka kw.	24.6 —	2.0 —	1.2 —	6.11 —	3.3 —	1.1 —	12.6 —
Lucerna kw.	17.1 —	2.8 —	1.5 —	3.3 —	2.05 —	1.3 —	9.3 —
Nać z bulwy kw.	23.3 —	1.2 —	0.5 —	6.1 —	3.0 —	0.5 —	10.0 —
Prasowanki.							
Trawa łąkowa	33.03 23.2-48.6	2.92 1.9-3.8	0.92 0.6-2.0	7.62 5.8-9.5	5.84 3.6-6.2	1.1 —	16.1 —
Lubin	22.67 19.7-24.7	2.31 2.0-2.6	0.68 0.5-0.8	3.59 3.0-4.0	7.08 6.6-7.2	1.3 1.1-1.6	11.0 —
Gryka kwaśna	29.7	1.5	0.5	10.7 —	3.9	0.9	16.3 —
Kukurydza	19.6 —	1.1	1.0	4.8 —	4.0	0.7	10.3 —
Konicz. czerw. kw.	30.0 —	3.9 —	1.3 —	7.8 —	3.8	1.9	16.7 —
Konicz. jasna słod.	30.0 —	3.2 —	1.3 —	7.4 —	4.1 —	0.7 —	15.7 —
Konicz. brunatna	33.0 —	3.0 —	1.5 —	6.8 —	5.0 —	0.6 —	15.9 —
» ciem. brun.	35.0 —	2.0 —	1.5 —	6.7 —	5.3 —	1.2 —	14.9 —
Lucerna jasna kw.	24.8 —	4.0 —	1.4 —	4.2 —	3.0 —	2.0 —	10.3 —
Owies z wyką	18.7 —	2.0 —	0.5 —	4.0 —	3.0 —	1.2 —	8.7 —
Seradela jasna kw.	31.7	4.5 —	0.9	9.4	6.2 —	2.5	19.2 —
Siano brunatne.							
Trawa łąkowa	84.17 79.9-85.9	6.60 4.0-8.6	1.81 1.0-3.8	28.13 —	13.86 —	1.9 1.6-2.1	42.4 —
Konicz. czerw.	85.46 62.0-90.0	8.88 5.1-11.5	1.61 0.7-3.3	25.0 19.7-33.4	11.36 9.1-13.9	3.2 2.8-3.6	35.3 —

Rodzaj paszy Zawartość w 100 częściach wagi:	Suchej substancyi	Strawnych składników					Jednostek karmow.
		Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	
Esparceta	89.0 —	11.4 9.8-12.9	2.8 2.5-3.1	19.3 17.2-20.9	13.0 12-13.3	3.9 —	43.9
Lucerna	80.0 —	9.0 6.8-12.8	1.6 1.1-3.2	18.6 12.6-23.8	9.6 7.8-12.1	2.8 —	36.2 —
Siano zwykłe.							
Z łąk bardzo dobr.	85.40 81.6-90.7	7.94 6.2-15.0	1.87 0.6-4.3	27.08 18.7-34.9	14.48 13.5-15.4	4.5 2.0-5.2	44.3
» średnich	86.3 78.0-91.0	5.22 4.1-6.7	1.35 0.5-3.2	27.47 16.4-30.4	15.14 13.1-15.9	3.3 1.6-4.0	43.2 —
» lichych	86.20 80.8-90.6	3.33 1.7-4.4	1.03 0.4-3.0	26.05 13.7-33.5	15.12 12.0-16.5	1.4 0.5-2.2	37.7 —
Potraw z łąk dobr.	85.25	7.15 4.6-12.7	1.62 0.6-2.7	26.06 17.3-31.7	14.40 12.0-17.0	1.8 —	46.5 —
» » torf.	85 —	6.95 4.5-9.6	1.22 —	25.4 20.0-30.2	14.45 12.9-15.6	1.6 —	42.2 —
Trawa z łąk torf.	89.00 —	5.13 2.0-9.0	1.28 0.3-2.7	28.32 20.1-38.1	15.75 13.1-18.6	1.3 —	44.4
Koniczyna czerw. b. dobra	83.50 79.2-89.5	11.75 10.1-14.3	1.71 1.3-2.4	28.67 25.0-32.1	9.54 8.2-9.7	3.8 —	47 6
Koniczyna czerw. średnia	83.70 76.6-89.8	7.77 6.2-9.6	1.53 0.7-2.9	23.50 17.4-29.2	11.51 10.7-12.1	2.6 —	43.9
Koniczyna czerw. licha	85.0 79.2-90.5	5.59 2.9-7.2	1.06 0.5-1.4	21.63 15.9-37.4	12.65 12.5-13.2	1.3 —	38.5 —
Koniczyna biała	84.00 —	8.50 6.5-11.4	2.13 0.9-3.4	24.99 20.9-29.3	11.76 11.1-12.2	2.5 —	42.7 —
Inkarnatka	81.70 80.6-82.8	6.81 5.4-8.6	1.43 1.1-1.7	22.90 20.1-27.4	10.30 9.4-11.2	2.6 —	38.5 —
Lucerna	84.25 80.8-87.8	11.37 8.4-16.4	1.36 0.6-2.4	22.59 18.7-26.7	11.59 10.1-14.2	3.8 3.5-4.6	43 —
Esparzeta	84.25 83.3-88.2	10.94 8.8-14.9	2.09 1.5-2.5	25.19 20.0-28.0	10.72 10.4-11.8	3.0 1.8-4.0	46.5 —
Seradela	84.00 —	10.38 6.9-14.7	2.28 0.9-3.4	23.05 16.2-26.4	10.86 9.5-14.1	2.2 —	42.2 —
Bobik	84.00 —	12.95 —	1.32 —	24.27 —	12.22 —	3.0 —	46.5 —
Wyka siewna	83.30 —	12.22 8.5-15.3	1.40 0.7-2.1	23.96 19.4-28.1	12.26 10.9-12.5	4.2 3.9-4.9	41.8 —
Wyka piaskowa	84.00 —	17.82 —	1.55 —	15.05 —	12.21 —	5.5 —	45.1 —

Rodzaj paszy Zawartoćć w 100 częściach wagi:	Suchej substancyi	Strawnych składników					Jednostek karmow.
		Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	
Łubin żółty	84.00 —	13.68 11.4-15.8	1.14 0.6-2.0	19.62 16.4-22.0	19.37 18.7-20.3	5.2 4.5-5.4	45.9 —
Gorczyca biała	85.00 —	6.33 4.5-8.7	1.44 1.2-1.7	21.95 21.2-25.8	14.53 11.7-14.9	2.3 —	40.3 —
Mieszanka konicz.	84.00 —	7.76 4.5-12.3	2.03 1.1-2.2	22.81 17.9-29.2	11.50 9.3-13.2	2.5 —	40.0 —
Owies z wyką	84.00 —	6.48 4.5-9.5	1.70 0.5-2.1	23.26 14.0-34.4	12.32 6.8-18.1	3.0 —	38 —
Szporek	85.0 —	6.49 3.3-10.1	1.1 0.6-1.7	27.12 19.2-29.6	12.85 12.6-13.0	1.8 —	42.5 —
Przelot	84.0 —	5.15 3.6-6.9	1.2 0.4-1.7	21.9 13.7-23	14.8 14.0-15.8	1.6 1.3-1.8	39.8 —
Lucerna chmielowa	84 83.3-89.6	11.83 8.4-16.4	1.59 —	23.24 19.8-26.5	10.8 10.8-10.9	2.0 —	43.1 —
Wyka ptasia *(v. craca)*	83.5	12.12 8.7-17.1	1.34 0.7-2.5	25.2 22.4-28.8	13.1 9.4-14.2	5.4 4.0-6.0	50.6 —
Koniczyna szwedz. *(trifol. hybrid.)*	84.0 —	8.3 5.1-10.2	1.35 0.9-2.0	23.8 15.6-30.1	13.11 12.0-14.0	2.7 —	41.5 —
Rajgras francuski w kwiecie	85.7 80-89	5.51 4.3-6.8	0.78 0.3-1.2	19.2 16.0-12.6	16 14.9-20.1	2.2 —	32.8 —
Rajgras włoski	88.0 86-90	8.06 4.5-11.0	1.94 —	26.8 —	12.5 —	2.2 —	44.5
» angielski	86.7 —	6.84 3.9-9.4	0.95 0.5-1.3	24.08 20.3-36.3	13.7 9.5-18.2	2.0 —	34.7 —
Tymotka łąkowa *(Phleum prat.)*	85.7 —	3.06 2.1-5.1	0.95 0.4-1.8	27.34 22.2-37.6	14.4 12.0-15.4	1.0 —	43.5 —
Trawy kwaśne	87.0 —	3.4 —	1.5 —	20.9 —	14.8 —	1.0 —	35.3 —
Turzyca *(carex)*	86.0 —	4.5 —	0.9 —	22.9 —	12.0 —	0.9 —	35.6 —
Skrzypy	86.0 —	8.9 —	0.9 —	21.0 —	6.0 —	1.5 —	35.1 —
Sity *(juncus)*	86.0 —	6.0 —	0.7 —	21.0 —	11.0 —	1.2 —	35.2 —
Sitowia *(scirpus)*	86.0 —	4.7 —	0.8 —	24.0 —	10.0 —	1 —	35.6 —
Słoma.							
Pszenica ozima	86.40 79.4-92.3	0.85 0.2-1.8	0.46 0.2-1.0	15.17 8.2-21.6	20 41 15.7-26.7	— —	26.4 —

Rodzaj paszy Zawartość w 100 częściach wagi:	Suchej substancyi	Strawnych składników Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	Jednostek karmow.
Żyto ozime	86.40 80.9-91.7	0.84 0.3-2.4	0.50 0.3-1.0	15.28 8.2-21.0	22.35 19.6-28.5	— —	22.4 —
Jęczmień	85.80 81.4-90.3	1.23 0.3-3.4	0.54 0.3-1.1	20.30 14.5-25.5	19.10 13.8-21.2	0.1 —	32.3 —
Owies	85.50 77.7-90.6	1.25 0.2-3.1	0.57 0.2-2.0	19.59 11.7-27.1	21.34 16.3-29.5	0.1 —	30.2 —
Kukurydza	80.00 —	2.07 1.3-2.6	0.49 0.3-0.8	19.11 8.7-25.4	14.07 8.5-15.8	0.1 —	30.3 —
Łubin	85.00 —	2.52 1.5-3.2	0.44 0.3-0.7	20.25 12.0-27.0	21.23 18.9-23.4	0.6 —	33.0 —
Groch	86.40 —	4.32 2.1-6.9	0.77 0.5-1.2	18.54 13.0-25.1	13.73 12.4-16.7	0.8 —	31.6 —
Bobik	81.60 —	3.97 2.5-6.8	0.58 0.4-0.8	20.46 —	15.49 13.5-16.1	0.8 —	33.0 —
Wyka siewna	86.70 —	4.07 3.1-6.3	0.89 0.7-1.2	15.43 11.2-21.5	16.36 11.2-17.4	0.8 —	28.1 —
Koniczyna czerw.	84.50 —	4.14 —	1.08 —	11.25 —	16.65 —	1.0 —	27.5 —
Gryka	84.00 74.1-90.1	2.27 1.2-4.1	0.50 0.3-0.7	18.11 13.8-24.1	13.94 8.9-16.2	0.5 —	28.6 —
Rzepak	84.00 —	0.91 0.8-1.4	0.60 —	18.93 —	14.36 —	0.2 —	30 —
Plewy i zgoniny.							
Pszenica	84.00 80.0-88.5	1.44 0.3-3.1	0.46 0.3-1.0	16.70 13.0-20.8	14.59 11.9-15.4	0.4 —	19.8 —
Żyto	85.50 —	1.36 —	0.57 —	16.10 —	19.08 —	0.4 —	19 —
Jęczmień	85.50 —	0.85 —	0.46 —	17.14 —	14.37 —	0.3 —	28 —
Owies	86.20 81.3-89.0	1.90 0.6-3.8	0.89 0.4-2.0	19.90 13.7-26.5	13.93 9.4-19.3	0.5 —	29.9 —
Groch	87.0 —	4.8 —	0.9 —	20.0 —	15.1 —	1.0 —	34.5 —
Bobik	85 —	5.1 —	1.2 —	21.2 —	14.3 —	1.0 —	36.3 —
Wyka siewna	85.0 —	4.7 —	1.2 —	30.1 —	13.5 —	1.0 —	44.5 —
Łubin	85.0 —	2.57 1.8-3.4	0.2 0.1-0.3	25.3 20.3-29.5	14.45 14.4-14.8	0.5 —	35.7 —

Rodzaj paszy Zawartość w 100 częściach wagi:	Suchej substancyi	Strawnych składników					
		Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	Jednostek karmow.
Koniczyna czerw.	84.0 —	6.96 —	0.61 —	22.06 —	10.66 —	2.1 —	36 —
» biała	85.0 —	9.86 —	1.63 —	21.5 —	10.98 —	1.5 —	40 —
Rzepak	84.0 —	1.46 —	0.7 —	16.5 —	15.3 —	0.3 —	30 —
Rzepik	84.8 —	1.46 —	0.68 —	16.4 —	15.47 —	0.3 —	30 —
Gryka	86.8 —	2.08 1.8-2.4	0.57 —	14.8 10.9-19.4	13.0 11.6-14.0	0.5 —	34 —
Kukurydza	91.4 —	0.78 0.4-1.6	0.16 0.1-0.6	26.9 23.1-32.9	15.3 14.6-17.7	0.4 —	36 —
Ziarna.							
Pszenica ozima	86.6 —	10.17 6.2-20.5	1.6 0.8-2.1	65.84 54.5-71.6	0.89 0.7-1.7	1.2 1.1-1.3	79.4 —
» jara	86.6 —	11.5 6.1-18.1	1.6 1.1-2.0	64.25 58.4-71.8	0.91 0.7-1.1	1.2 —	79.5 —
Żyto	86.6 81.3-92.1	9.89 5.8-17.7	1.33 0.2-2.6	66.05 54.6-71.5	0.97 0.6-2.3	0.5 0.4-0.6	78.8 —
Jęczmień	85.7 78.4-90.0	7.07 3.6-16.4	1.90 0.6-3.0	62.34 51.8-68.8	1.30 0.8-2.0	— —	74.5 —
Owies	86.70 79.2-92.3	8.05 4.2-16.2	4.01 1.6-9.5	44.81 34.9-52.2	2.58 1.3-4.0	0.5 0.4-0.6	63.9 —
Kukurydza	87.00 77.8-95.3	8.00 4.3-12.2	3.74 1.4-7.8	65.78 48.9-71.6	1.09 0.6-3.5	0.5 —	85.6 —
Ryż	87.4 84.7-93.7	5.79 2.7-8.9	1.32 0.1-1.8	74.15 67.5-76.9	0.77 0.1-1.8	0.7 —	79.7 —
Proso	87.5 85.3-89.2	7.69 6.7-8.6	3.11 2.3-3.7	45.83 39.9-51.6	2.66 1.7-3.3	0.5 —	60.2 —
Gryka	85.9 82.2-90.4	8.38 6.0:11.1	1.87 1.2-2.9	41.64 36.5-44.7	7.61 6.7-9.8	— —	57.9 —
Buraki	86.10 77.9-89.6	7.15 6.0-8.1	3.17 2.1-4.2	17.81 13.3-27.2	11.63 8.4-12.9	— —	38.5 —
Groch	86.0 77.9-93.5	20.04 15.7-26.0	1.20 0.4-4.4	49.93 41.6-56.3	3.55 1.5-8.0	2.5 —	74.7 —
Bobik	85.70 78.6-92.1	22.37 15.3-28.8	1.22 0.6-2.8	44.56 35.6-55.5	4.71 4.5-7.1	1.9 —	72.9 —
Wyka siewna	86.70 83.9-91.0	22.88 17.1-27.1	1.55 1.0-2.4	46.31 42.1-54.1	3.93 2.1-4.3	2.9 —	74.8 —

Rodzaj paszy Zawartość w 100 częściach wagi;	Suchej substancyi	Strawnych składników					
		Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	Jednostek karmow.
Soczewica	86.00 84.6-89.5	22.91 19.4-27.4	1.62 0.8-2.3	48.57 —	2.27 2.2-2.3	1.8 —	86.2 —
Seradela	86.00 —	16.06 11.6-19.4	6.19 3.7-8.5	21.85 15.7-28.4	6.81 6.1-7.8	2 7 —	57.0 —
Łubin żółty	86.00 80.1-90.5	34.43 23.5-39.5	3.77 1.5-6.8	21.88 14.8-37.5	12.71 7.1-27.0	3.8 —	74.8 —
» niebieski	86.00 84.5-88.0	26.26 18.3-31.6	5.24 4.1-6.5	31.17 27.1-40.9	10.08 9.6-10.2	3.0 —	75 —
» biały	86.00 76.5-88.7	26.07 19.3-31.6	6.10 3.9-10.3	29.35 25.4-37.4	11.11 8.1-11.3	2.9 —	75.6 —
» odgoryczony	67.50 —	29.80 28.6-31.0	4.23 —	12.10 10.3-13.6	14.38 13.1-24.9	— —	29.1 —
Len	90.8 85.8-94.5	20.54 14.6-29.5	29.61 19.1-37.2	13.94 10.2-18.9	4.23 2.8-6.4	1.0 —	120.2 —
Konopie	91.1 87.8-93.6	23.44 12.3-37.4	28.56 19.0-42.5	14.6 8.5-19.6	6.24 4.4-8.6	0.9 —	123.8 —
Okopowe i inne.							
Kartofle	25.0 15.1-32.0	1.58 0.5-3.1	0.08 0.05-0.6	20.58 18.9-22.4	0.36 0.2-0.7	1.0 —	22.6 —
Buraki past.	12.00 6.2-24.6	0.94 0.3-2.2	0.06 0.02-0.3	8.32 5.3-9.9	0.51 0.3-0.9	0.7 —	10 —
» cukrowe	18.00 12.9-24.8	0.99 —	0.05 —	14.61 —	0.59 —	0.6 —	15.5 —
Bulwy	20.00 15.8-25.0	1.22 0.7-2.2	0.10 0.05-0.2	15.83 13.3-16.3	0.41 0.3-0.5	0.8 —	17.8 —
Brukiew	12.20 4.2-17.8	1.01 0.5-2.8	0.18 0.08-0.5	7.64 5.8-9.1	0.73 0.4-1.1	0.6 —	10.0 —
Rzepa	9.22 4.6-14.6	0.76 0.4-1.7	0.17 0.04-0.4	5.23 4.3-6.7	0.62 0.4-0.7	0.5 —	6.0 —
Marchew	13.00 10.0-19.5	0.92 0.3-1.8	0.13 0.06-0.2	8.93 6.7-10.1	0.69 0.5-1.1	0.5 —	10.5 —
Pasternak	16.8 11.7-20.7	0.98 0.7-1.0	0.13 —	12.5 —	0.77 —	0.5 —	13.0 —
Dynie	11.0 5.4-22.1	0.69 0.1-2.1	0.12 0-0.8	5.71 2.4-8.2	1.14 0.6-1.8	0.2 —	7.0 —
Kasztany zwykłe suszone obrane	89.5 81.2-92.9	5.8 4.1-7.0	4.59 2.9-6.2	66.7 57.2-69.5	1.8 0.9-2.6	— —	80 —
Żołędzie świeże	50 44.0-58.5	2.7 1.8-6.5	1.94 1.3-3.9	32.63 26.8-37.2	4.11 3.1-5.2	— —	38 —

Rodzaj paszy Zawartość w 100 częściach wagi:	Suchej substancyi	Strawnych składników: Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	Jednostek karmow.
Buczyna	88.9 —	10.66 8.3-12.9	24.09 18.3-31.8	16.8 14.9-21	7.4 7.2-7.5	0.6 —	89
Odpadki przemysłowe.							
a. Młynarskie							
Otręby pszenne grube	86.80 82.5-90.0	11.00 7.9-15.6	2.66 1.2-4.4	42.56 33.6-47.8	2.16 1.9-3.4	1.3 —	59 —
Otręby pszenne drobne	86.80 84.2-90.0	12.25 9.4-18.1	3.40 2.8-5.9	42.98 34.0-46.2	2.31 2.1-3.0	1.4 —	64 —
Otręby pszen. kiełkow.	84.00 —	17.87 —	6.47 —	39.48 —	2.21 —	2.2 —	70 —
Mąka pszenna kar.	87.40 84.6-92.4	11.69 7.4-16.3	2.75 0.5-4.4	52.19 40.2-64.5	2.17 0.6-2.9	1.4 —	72 —
Otręby żytnie	87.50 83.3-89.7	11.29 7.6-17.6	2.38 0.9-5.3	45.43 35.2-56.3	1.98 0.9-2.7	1.5 —	63 —
Mąka żytnia karm.	87.50 85.2-89.6	11.46 9.3-14.0	2.27 1.3-3.3	52.52 47.1-59.5	1.78 0.7-2.7	1.1 —	68 —
Otręby jęczmienne grube	87.70 85.6-91.0	7.83 3.1-10.8	2.51 1.1-4.0	36.94 29.2-45.2	4.11 3.1-6.1	1.2 —	52.7 —
Otręby jęczmienne drobne	87.50 84.2-90.0	9.52 7.8-12.9	2.64 1.7-4.5	47.56 39.5-53.3	2.38 2.1-2.7	1.2 —	64.7 —
Mąka jęczmienna karmowa	86.80 77.2-89.3	10.24 5.5-16.3	2.36 0.6-4.5	54.31 44.9-64.6	1.50 0.2-2.3	1.2 —	70.9 —
Otręby owsiane	89.00 88.0-90.0	4.02 2.8-5.5	1.58 0.8-2.8	23.63 20.8-28-6	10.83 8.8-13.0	1.0 —	36 —
Mąka kukurydz. karmowa	87.00 84.7-89.1	6.65 4.7-10.6	4.00 3.2-4.8	55.51 47.9-60.5	2.10 1.5-3.5	0.9 —	71 —
Otręby gryczane	84.40 79.1-87.0	4.80 2.4-7.3	1.15 1.1-1.8	20.86 16.2-25.9	9.40 8.5-9.7	0.6 —	33
Mąka gryczan. karmowa	88.00 83.7-90.7	24.45 17.9-30.9	6.76 4.9-8.8	30.64 22.7-43.2	1.92 1.3-2.4	— —	71.5
b. Z olejarni.							
Lniane makuchy	89 79.5-93.2	24.64 15.7-34.2	8.94 3.2-23.0	27.54 10.4-38.5	4.73 2.4-7.4	0.2 —	75.4 —
» » mąka extrah.	92.0 79.8-93.5	28.0 18.2-31.5	7.43 3.3-16.9	28.09 19.1-32.4	4.52 3.7-4.9	2.0 —	70 —
Rzepakowe makuchy	90.0 79.7-94.1	25.23 16.6-35.4	7.54 2.9-17.3	22.8 14.0-31.4	0.91 0.8-1.2	4.4 —	66.4 —
Rzepak. makuchy mąka extrah.	90.0 87-93.8	27.38 21.2-33.7	3.96 0.6-8.2	23.3 10.1-30.3	0.98 0.9-1.1	4.5 —	58.8 —

Rodzaj paszy Zawartość w 100 częściach wagi:	Suchej substancyi	Strawnych składników					
		Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	Jednostek karmow.
Rzepik. makuchy	89.28 82.3-93.5	26.18 17.5-32.1	7.88 4.9-15.7	23.4 15.5-28.1	0.78 0.5-1.1	4.5 —	68 —
Słonecznikowe makuchy	90.76 86.8-94.9	31.19 18.6-41.3	12.8 4.2-24.6	15.8 6.8-21	3.8 2.1-5.5	3.3 —	77.9 —
Makowe makuchy	88.6 82.3-92.5	31.3 23.2-35.6	8.78 3.3-15.7	15.5 6.5-22	4.7 2.2-7.8	0.4 —	66
Konopne »	88 80.5-84.7	21.4 16.6-28.9	8.32 3.6-13.9	12.0 5.2-25.6	5.13 4.4-5.5	0.6 —	51.7 —
c. Z krochmalni.							
Pszenna pulpa świeża	15.4 5.5-30	1.56 1.1-2.3	0.75 0.2-1.6	8.9 3.1-12.1	0.78 0.1-1.1	0.3 —	13.5 —
Pszenny Gluten	90.0 88.4-90.8	61.9 55.8-70.5	1.09 0.2-2.2	19.70 15.6-28.7	0.1 0.05-0.15	6.5 —	89.6 —
Kartoflane włókno św. (pulpa)	14.0 2.6-17	0.81 0.2-1.5	0.08 —	10.75 7.1-11.9	0.92 0.2-2.4	0.1 —	12.0 —
Kartoflane włókno prasowane	35 —	2.13 —	0.16 —	26.8 —	2.31 —	0.2	29
d. Z browarów.							
Słodziny świeże	23.78 15.4-30.5	3.72 2.9-5.4	1.43 0.6-2.8	6.85 4.8-10.3	1.96 1.8-3.4	0.1 —	14.9 —
» suszone	90.5 83-97.8	14.42 10.8-21.0	5.67 2.6-8.4	26.65 20.3-37.5	6.2 3.6-8.0	0.9 —	57.8 —
Kiełki słodowe jęczmienne	88 81.7-93.4	19.09 12.6-25.1	1.7 0.2-4.9	38 27.3-51.1	9.23 4.0-13.4	7.0 —	65 —
Kiełki słod. pszen.	85.5 —	23.86 20.6-27.6	2.25 —	24.8 —	14.6 —	7.5 —	61 —
Słód jęczmien. zielony	54.6 52.6-57.6	5.34 4.7-6.0	1.02 0.9-1.1	34.11 30.1-36.5	3.48 3.3-3.6	1.3 —	44 —
Słód jęczmien. prażony	88 84.8-95.8	8.08 5.7-12.2	1.44 1.2-1.7	61.5 57-63.5	2.97 2.6-3.1	2.0 —	76.8 —
e. Z gorzelni.							
Wywar żytni świeży	7.8 3.4-13.2	1.28 0.9-1.9	0.32 0.2-0.6	4.5 3.2-5.3	0.39 0.2-0.7	0.4 —	6.7 —
Wywar kukurydz. świeży	8.68 5.7-12.3	1.6 1.2-1.9	0.79 0.3-1.2	4.03 2.8-5.3	0.46 0.3-0.7	0.1 —	7.6 —
Wywar kartoflany	5.7 2.7-8.8	1.04 0.8-1.5	0.08 0-0.2	2.91 2.1-3.3	0.49 0.4-0.7	0.4 —	4.6 —

Rodzaj paszy Zawartość w 100 częściach wagi:	Suchej substancyi	Strawnych składników: Azotowych	Tłuszczu	Bezazotowych wyciągów	Włóknika	Amidów i t. p.	Jednostek karmow.
Wywar zbożowy suszony	91 87.8-94.0	18.6 16.2-22.9	7.9 4.3-12.3	39.9 34.8-50.4	4.5 2.3-6.7	4.0 —	77.9 —
f. Z cukrowni.							
Wysłodziny dyfus. świeże	7.0 5.4-10.0	0.37 0.2-0.6	0.06 0.02-0.1	3.49 2.5-4.2	1.18 0.9-1.7	— —	4.5 —
Wysłodziny dyfus. prasowane	10.25 7.0-14.4	0.57 0.4-0.8	0.07 —	5.36 4.4-6.9	2.0 1.5-2.5	— —	7.1 —
Wysłodziny dyfus. kiszone	11.5 6.8-15.7	0.67 0.4-1.2	0.08 0.02-0.3	5.44 4.1-7.6	2.35 1.5-2.8	0.2 —	7.5 —
Melasa	79.3 66.3-89.1	9.1 —	— —	61.3 —	— —	4.6 —	70.3 —
Produkty zwierzęce.							
Mąka mięsna	89.33 82 5-94.2	68.37 56.4-76.9	13.47 9.0-20.4	0.3 —	— —	3.5 —	96.5 —
Krew suszona	91.55 —	59.6 —	1.5 —	1.3 —	— —	9.0 —	61.4 —
Chrabąszcze susz.	85.6 58-86	39.7 36.7-42.5	8.7 5.0-11.3	— —	— —	2.3 —	59.8 —
Mleko krowie niezbierane	12.8 9.3-19.7	3.48 2.0-6.3	3.7 1.6-6.4	4.77 2.0-6.0	— —	— —	16.8 —
Mleko krowie zbierane	9.5 7.4-11.7	3.13 2.4-3.8	0.8 0.2-2.4	4.69 3.7-5.4	— —	— —	10.2 —
Mleko krowie odwirowane	9.4 8.8-10.2	2.90 —	0.29 —	5.24 —	— —	— —	9.1 —
Maślanka	9.8 6.7-17.8	3.8 1.6-6.1	1.06 0.2-5.3	4.0 2.4-5.5	— —	— —	10.7 —
Serwatka	6.48 5.9-6.9	1.05 0.7-1.4	0.15 0.1-0.3	4.4 4.1-4.5	— —	— —	5.9 —
Mleko owcze	19.2 13.0-25.5	6.39 4.2-7.4	6.81 2.7-9.7	4.37 2.7-7.9	— —	— —	28.0 —
» kozie	14.3 9.8-18	4.2 3.1-6.3	4.8 3.2-7.2	4.37 3.1-5.7	— —	— —	20.3 —
» świni	15.45 10.7-18.3	6.3 4.9-8.4	4.75 2.1-9.1	3.1 1.5-6.0	— —	— —	20.9 —
» kobyle	9.2 7.5-11.8	1.9 1.5-3.0	1.2 1.0-2.4	5.54 4.0-7.2	— —	— —	10.5 —

Normy żywienia zwierząt gospodarskich.

Minimalną ilość pokarmu, wystarczającą tylko dla stałego podtrzymania życia w ustroju, ilość, przy której zwierzę w spokoju zupełnym nic nie zyskuje ani traci ze swego organizmu, nazywamy racyą bytową czyli zachowawczą. Dopiero z pokarmu przyjętego w ilości przewyższającej karmę bytową da się osiągnąć korzyść dla hodowcy. Ta przewyżka tylko może być użytą dla wyprodukowania substancyi zwierzęcej (mięsa, mleka itp.) lub żywej siły.

Odpowiednio do wielkości zamierzonej produkcyi wielkim musi być i ów dodatek paszy do racyi bytowej. Skład tego dodatku zależnym będzie od rodzaju produkcyi; stosownie do niej stosunek wzajemny składników pokarmowych różnym być musi. (Stosunek pokarmowy — ilość ciał azotowych = 1 : 2.4 tłuszcz + bezazotowe).

W produkcyi pracy, tłuszczu i w karmie bytowej składniki paszy w luźnych granicach wzajemnie zastępować się mogą. Ze względów ekonomicznych damy tu przewagę luźniejszym stosunkom karmowym do 1 : 7 i wyżej. (Pokarmy bogate w azot są najdroższe).

Przy produkcyi mięsa (wychowie młodzieży) materyałem twórczym mogą być tylko ciała białkowe, stosunek karmowy musi być ścisły 1 : 3.5 do 1 : 5.5; dla produkcyi mleka stosunek średni najwłaściwszy 1 : 5 — 1 : 7.5. Podane poniżej normy nie winny być uważane za niezmienną receptę, tylko za szkic przybliżony przepisu, który jednak w granicach powyżej wskazanych zmienianym być może. To pamiętać należy, że dla produkcyi przedewszystkiem musi być dana dostateczna ilość pokarmu. Zmiany pewne w składzie mniejszą grają rolę, do nich zwierzę łatwo dostosować się potrafi, i nieraz ważniejszem jest podanie paszy, nadającej się dla danego zwierzęcia i odpowiednio przygotowanej a zatem chętnie w dużych ilościach jedzonej, jak ślepe pilnowanie przepisanego składu paszy. Pasza mięszana zazwyczaj lepiej zwierzętom służy, jak jednorodna, która się prędko przykrzy. Na smak paszy i obecność w niej soli mineralnych i używek (środki pobudzające i nadające smak i zapach paszy) uwagę zwracać należy.

Pasze, które wskutek wadliwego sprzętu, przechowania lub przy przerobie technicznym utraciły te własności, trzeba dopełnić dodatkiem paszy posiadającej te brakujące własności w wysokim stopniu np. pachnące siano, makuchy, melas itp.

Przy żywieniu młodzieży po odsadzeniu zachodzić może łatwo w paszy niedostatek soli mineralnych, głównie wapna i kwasu fosforowego, używanych obficie na budowę szkieletu. Czem szybciej dojrzewająca będzie rasa zwierząt, tem niebezpieczeństwo braku będzie większe.

Przy spasaniu karm ubogich w sole mineralne (pasz wyługowanych przez deszcze, traw kwaśnych, odpadków fabrycznych) może i u matek karmiących i ciężarnych zajść potrzeba ich dodatku. Najwłaściwsza kreda do lizania, mąka kostna odklejona lub węglan, lub fosforan wapna sztucznie otrzymany, 50—100 gr. na 1000 kg. ż. w. Soli kuchennej stały dodatek 40—100 gr. na 1000 kg. ż. w. najczęściej się dobrze opłaca.

Pasze zawierające duży procent węglowodanów łatwo strawnych jak okopowe, skarmiane w dużych ilościach, obniżają

strawność jednocześnie zkarmianej karmy objętościowej. Ta depresya strawności wzrasta z ilością procentową węglowodanów, dochodzi do 40% dla proteinów i 14% w węglowodanach. Zmniejszyć ją można tylko przez jednoczesny dodatek łatwo strawnych proteinów.

Potrzeby pokarmowe zwierzęcia wyrazić się dadzą również dobrze w jednostkach wagowych składników pokarmowych paszy, jak i w jednostkach energii (jednostkach ciepła i mechanicznej pracy), odpowiadających tejże paszy. Chodzi tu o tę część energii, która przy przemianie materyi pokarmu w organizmie zwierzęcia wyzwoloną zostaje lub razem z nią pozostaje w przyroście. Wszystkie strawne składniki pokarmowe wywiązują w organizmie ± jednakowe ilości energii oprócz tłuszczów, dających jej 2.5 razy więcej.

Karma zachowawcza (bytowa) wołu na 1000 kg. ż. w. = 8.0 J. K. = 8 × 4.100 = 32.800 Cal (kilogramostopni = Kaloryj). Tyleż prawie zużywa koń w zupełnym spokoju, a nie licząc strawionego włóknika, faktycznie 6.7 J. K. Ponad tę ilość minimalną dodana karma wydać może pracę na 100 gr. J. K = 55000 kgm. Wogóle tylko około $^1/_3$ całkowitej energii dodatkowej paszy można otrzymać w formie rzeczywistej mechanicznej pracy.

Dla produkcyi mleka potrzeby energii w paszy ponad bytową wynosić muszą $^{100}/_{45}$ × ilość energii zawartej w suchej substancyi spodziewanego mleka.

Podane poniżej normy żywienia oznaczają przybliżone potrzeby pokarmowe przy temperaturze normalnej otoczenia dla zwierząt dorosłych. Odnoszą się one do zwierząt średnich, bydła 500 kg. ż. w., owiec 50 kg., świń 150 kg. ż. w. Rasy mniejsze wymagają pokarmu nieco więcej — większe nieco mniej. Różnica wynosić może do 0.5 kg. białkowych i 1.5 kg. bezazotowych. Dla krów normy stosują się do mleczności w środku okresu laktacyjnego. Dla młodzieży przy umiarkowanym ruchu — bez ruchu obniżyć wypadnie dawki o jakieś 15%. O tyle wypadłoby je podnieść przy ruchu bardzo silnym.

Podawaną zazwyczaj rubrykę ceny paszy opuściliśmy, jako nader niepewną. Chcąc obliczyć wartość pasz, dokupić się mających, przyjmujemy, że stosunek jej składników — proteinowych: tłuszczu i bezazotowych: włóknika = 3 : 2.5 : 1 : 0.5. Pomnożywszy przez te cyfry ilości, wykazujące zawartość ich w paszy danej (T II), otrzymamy wielkość odpowiadającą w jednostkach wartości pokarmowej. Podzielona przez tę sumę targowa cena, da nam cenę jednostki, a stąd i cenę składników pokarmowych w danej paszy. Porównywać tu trzeba pasze podobne i za podstawę wziąć pasze najmniej zmienne w cenie. Np. weźmiemy żyto jeżeli q kosztuje 15 k. Skład żyta w strawnych składnikach średni 10.1 prot., 1.60 Tł., 65 b. wg., 1.3 włókn. odpowiednio do powyższego 10 × 3 + 1.6 × 2.5 + 65 × 1 + 1.3 × 0.5 = 99.7 jednostek pokarmowych za 15 k. czyli 1 za 15 h. Stąd jeden kg. proteiny w życie kosztuje 45 h.; tłuszczu 37.5 h.; bezw. w. 15 h.; włóknik 7½ h. Przeprowadziwszy podobny rachunek dla różnych pasz, dojdziemy, w której pożądany składnik pokarmowy najtaniej wypadnie.

Tablica III.

Normy żywienia na 1000 kg. ż. w.

Rodzaj inwentarza	Sucha substanc. kg.	Strawne składniki w kg. Azotowe	Tłuszcze	Bez-azotowe	Jednostek karmow. Włóknik = 1	= ½	Stosunek pokarm. 1 :
Inwent. rob.							
Woły w spoczynku zup.	18	0.6	0.1	8	8.8	7.5	12
» przy lekkiej pracy	22	1.4	0.3	10	12.1	9.7	7.7
» przy średn. pracy	25	2.0	0.5	11.5	14.7	12	6.5
» przy silnej pracy	28	2.3	0.8	13.5	17.2	14.5	6.5
Konie przy lek. pracy	20	1.5	0.4	7.5	—	10.0	7.0
» przy średn. pracy	22	2.0	0.6	9.3	—	12.8	6.2
» przy silnej pracy	24	2.5	0.8	11.2	—	15.5	6
Opasy (dorosłe)							
Woły okres przygotow.	25	1.5	0.5	13	15.7	12.7	10
» okres I	30	2.2	0.5	15	19	15.6	7
» okres II	30	2.6	0.5	14.5	19.2	17	6.5
» okres III	26	2.2	0.7	15	18.3	17.2	7.6
Skopy I okres	30	3.0	0.5	15	19.2	16.5	5.4
» II okres	28	2.5	0.6	14.5	18.7	16.2	6.4
Trzoda I okres	36	4.5	0.7	25	31	31	6
» II okres	32	4.0	0.5	24	29	29	6.3
» III okres	25	2.7	0.4	18	22	22	7
Krowy przy udoju dziennym 5 litrów	25	1.6	0.3	10.0	12.3	10.2	6.7
Krowy przy udoju dziennym 7.5 litr.	27	2.0	0.4	11.0	14.0	12.2	6.0
Krowy przy udoju dziennym 10 litr.	29	2.5	0.5	13.0	16.7	14.4	5.7
Krowy przy udoju dziennym 12.5 litr.	32	3.3	0.8	13.0	18.2	16.0	4.5
Owce grubo wełniste	20	1.2	0.2	10.5	12.2	9.0	9.1
» cienko »	23	1.5	0.3	12.0	14.2	10.5	8.5
Matki w czasie wykotu	25	2.9	0.5	15.0	19.1	16.3	5.6
Młodzież ras mlecznych							
wiek 2—3 miesięcy	23	4.0	2.0	15.0	21.8	21.0	4.5
» 3—6 »	24	3.0	1.0	12.8	18.2	17.0	5.1
» 6—12 »	27	2.0	0.5	12.5	15.7	13.7	6.8
» 12—18 »	26	1.8	0.4	12.5	15.3	12.8	7.5
» 18—24 »	26	1.5	0.3	12.0	14.2	11.8	8.5
Młodzież ras mięsnych							
wiek 2—3 miesięcy	23	4,2	2.0	13.0	20.0	19.5	4.2
» 3—6 »	24	3.5	1.5	12.8	19.9	19.0	4.7
» 6—12 »	25	2.5	0.7	13.2	17.4	15.8	6.0
» 12—18 »	24	2.0	0.5	12.5	15.7	13.9	6.8
» 18—24 »	24	1.8	0.4	12.0	14.8	13.2	7.2
Młodzież owiec wełnistych							
wiek 4—6 miesięcy	25	3.4	0.7	15.4	20.5	18,4	5.0
» 6—8 »	25	2.8	0.6	13.8	18.0	15.8	5.4

Rodzaj inwentarza	Sucha substanc. kg.	Strawne składniki w kg. Azotowe	Tłuszcze	Bez-azotowe	Jednostek karmow. Włóknik = 1	$= ^1/_2$	Stosunek pokarm. 1 :
Wiek 8—11 miesięcy	23	2.1	0.5	11.5	14.8	12.8	6.0
» 11—15 »	22	1.8	0.4	11.2	14.0	12.0	7.0
» 15—20 »	22	1.5	0.3	10.8	13.0	11.0	7.7
Młodzież owiec mięsnych							
wiek 4—6 miesięcy	26	4.4	0.9	15.5	22.1	20.9	4.0
» 6—8 »	26	3.5	0.7	15.0	20.2	17.8	4.8
» 8—11 »	24	3.0	0.5	14.3	18.5	16.3	5.2
» 11—15 »	23	2.2	0.5	12.6	16.0	13.8	6.3
» 15—20 »	22	2.0	0.4	12.0	15.0	12.8	6.5
					Wł. = 0		
Młodzież trzody rozpłodowej							
wiek 2—3 miesięcy	44	7.6	1.0	28.0	38.0		4.0
» 3—5 »	35	5.0	0.8	23.1	30.0		5.0
» 5—6 »	32	3.7	0.4	21.3	26.0		6.0
» 6—8 »	28	2.8	0.3	18.7	22.2		7.0
» 8—12 »	25	2.1	0.2	15.3	17.9		7.5
Młodzież trzody opasowej							
wiek 2—3 miesięcy	44	7.6	1.0	28.0	38.0		4.0
» 3—5 »	35	5.0	0.8	23.1	30.0		5.0
» 5—6 »	33	4.3	0.6	22.3	28.0		5.5
» 6—8 »	30	3.6	0.4	20.5	25.1		6.0
» 8—12 »	26	3.0	0.3	18.3	22.0		6.4

Normy powyższe nie uważamy za receptę bezwzględnie obowiązującą. Zmiany pewne są w nich dopuszczalne, a nieraz i pożądane. Decydować tu muszą względy na indywidualność zwierząt: pasza powinna być dla nich przydatna i chętnie jedzona. Wreszcie pewne zmiany w normach wyniknąć mogą z gospodarczych względów. Tu najprzód chodzi o spasienie zapasów własnej paszy, a w dokupieniu głos ważny ma cena produktu, który wytworzyć zamierzamy, i cena dokupnej paszy. Podobny charakter przykładów mieć powinny mieszaniny pokarmowe podane poniżej.

Przy układaniu dawek dziennych najprzód zwrócić musimy uwagę, by w nich ilość rzeczywistego pożywienia w sumie była odpowiednia; najmniej zmiennemi są wymagania, dotyczące rubryki — jednostki karmowe (J. K.). Do zmian powolnych w ilości suchej substancyi, nawet w dość luźnych granicach, organizm przywyka. Na wymaganą ilość bezazotowych w dawkach dla przeżuwających składać się winny bezazotowe wyciągowe + włóknik. Dla koni włóknik strawny przyjmujemy w 50%, dla trzody włóknika nie rachujemy wcale. Cyfry wykazujące ilość J. K. w tabl. II odnoszą się do ś r e d n i e g o składu pasz, przyczem włóknik przyjęto w 50%. Tu wypada wielkość dla J. K. znaleźć z r z e c z y w i s t e g o składu i włóknik porachować zgodnie

z przeznaczeniem paszy. J. K. z włóknikiem = ½ u przeżuwających; podano tu dla ułatwienia użycia Tabl. II. Przypuśćmy, że chodzi o dawkę dla wołów przy silnej pracy. Gdybyśmy dali poniższą mieszaninę, ta zawierać będzie:

Rodzaj mięszaniny	Suchej substanc.	Ciał azotowych	Tłuszczy	Bezazot. wyc.	Włóknika	J. K.
Wytłoków kwaszonych 40 kg.	4.6	0.28	0.04	2.16	0.9	434
Słomy owsianej dobrej 10 »	8.6	0.2	0.1	2.0	2.2	465
Siana łąk. dobrego doj. 8 »	6.8	0.6	0.14	2.4	1.1	435
Otrąb żytnich . . . 2 »	1.7	0.22	0.04	0.95	0.04	123
Dawka zawiera	21.7	1.3	0.32	11.65		14.17
Podług normy potrzeba	28	2.3	0.8	13		17.7
Brakuje	6.3	1.0	0.48	1.35		3.23
Dodawszy 2 kg. siana	2.4	0.3	0.03	0.9		1.16
Oraz 3 kg. kuch. rzep.	2.7	0.75	0.22	0.69		2.04
Będzie w dawce dziennej	26.8	2.35	0.57	13.24		17.67

Czyli prawie odpowiednio normie.

Przykłady dawek dziennych na 1000 kg. ż. w.

I. Woły. a) zimowa karma bytowa.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Wytłoków kisz. . .	30	Wywar kartofl. .	50	Słomy ozimej . .	10
Słomy owsianej . .	10	Słomy ozimej . .	10	» strąkowej .	10
» strączkow. .	5	» jarej . . .	8	Wytłoków	30
Siana kon. czerw. .	5			Makuchu rzepak. .	1
4.		**5.**		**6.**	
Słomy ozimej . . .	6	Słomy ozimej . .	6	Słomy ozimej . . .	12
Plew pszennych . .	6	» jarej . . .	8	» jarej	6
Słomy jarej	8	Kartofli	20	Łubinu odgor. św.	6
Buraków pastew. .	30	Siana śred. ładn. .	4	Melasy	2
Słodzin świeżych .	5				

b) przy średniej pracy.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Buraków	25	Kartofli	10	Siana konicz. . . .	2
Sieczka konicz. w.	6	Koniczyny	5	» łąkow. śr. .	6
Słomy ozimej . . .	8	Słomy ozimej . .	10	Słomy ozimej . . .	6
» jarej	6	Owsianki	8	» jarej	6
Makuchów rzep. . .	2	Otrąb pszennych .	2	Śruty jęczm. . . .	8

4.	kg.	5.	kg.	6.	kg.
Wytłoku kwasz.	40	Kartofli	20	Siana łąków.	10
Słomy ozimej	10	Siana koniczyn.	5	Słomy ozimej	10
Siana średniego	8	Siana łąkowego	5	Siana konicz.	5
Melasy	2	Słomy jarej	10	Łubinu odgor. św.	4
		Makuchów rzep.	2	Melasy	2

c) przy silnej pracy.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Słomy ozimej	6	Słomy ozimej	10	Słomy ozimej	5
» jarej	6	Siana konicz.	8	Wyczanki	10
Wytłoków	60	Wytłoków kwasz.	50	Siana łąkowego	10
Makuchów rzepak.	2	Łubinu odg. św.	8	Kartofli	20
Śruty z bobiku	4			Śruty żytniej	4

4.		5.		6.	
Słomy jarej	10	Kartofli	20	Końs. zębu św.	60
Koniczyny świeżej	80	Koniczyny siana	10	Słomy ozimej	10
Mąki past. żytnej	5	Słomy ozimej	8	Siana konicz.	5
		» jarej	4	Śruty żytniej	2
		Makuchów rzep.	2		

II. Opasy (bydło).

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Wywaru kartofl.	100	Wytłoków kwasz.	60	Siana koniczyn.	6
Siana łąk. średn.	8	Siana łąków.	10	» łąkowego	8
Słomy ozimej	4	Słomy jarej	4	Słomy ozimej	6
» jarej	4	Otrąb żytnich	6	Wytłoków	50
Mąki żytn. karm.	8	Makuchów rzep.	2	Słodzin	20
				Śruty jęczm.	2
				Otrąb	2

4.		5.		6.	
Siana łąk.	10	Siana łąk.	10	Kartofli*) nizko %	100
Słomy i plew	5	» koniczyn.	4	Siana łąków.	5
Buraków past.	50	Słomy ozimej	6	Makuchu rzep.	2
Otrąb pszennych	4	Kartofli	40		
Łubinu odg. śwież.	8	Makuchów rzep.	3		

III. Krowy dojne. a) średnio mleczne ($7\frac{1}{2}$ l.).

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Buraków past.	30	Kartofli	20	Wywaru kartof.	50
Siana lad. dobr.	8	Siana łąkow.	8	Siana łąk. śred.	10
Słomy ozimej	5	» z konicz.	5	Słomy jarej	10
» jarej	7	Słomy jarej	2	Mąki karm. żytn.	3
Otrąb pszennych	2	» ozimej	5	Makuchu rzep.	1
Makuchu rzep.	$2\frac{1}{2}$	Makuchu lnian.	2		

*) Żywienie samemi kartoflami adlibitum, a zatem karmą 1:11, uważamy za zupełnie nieracyonalne, nie daje bowiem przyrostu żywej wagi, tylko nieco tłuszczu.

4.	kg.	5.	kg.	6.	kg.
Wytłoków kwasz.	40	Kukurydzy kisz.	30	Prasowanki lubin.	50
Siana konicz.	8	Siana konicz.	8	Słomy ozimej	10
Słomy ozimej	8	Jęczmionki	5	Siana z seradeli	8
Siana łąkowego	4	Plew pszennych	3	Otrąb pszennych	4
Otrąb pszennych	4	Otrąb	4		
		Makuchu rzepak.	2		

b) wysoka mleczność (10 litrów).

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Buraków	50	Kartofli	20	Wywaru i kart.	75
Koniczyny siana	8	Siana esparcety	10	Siana łąk. śred.	8
Słomy oz. i plew	10	Słomy jarej	5	Słomy różnej	10
Makuchu rzepak.	2	» ozimej	4	Bobiku śruty	2
Otrąb pszennych	4	Słodzin	20	Otrąb pszennych	4
		Kiełków słodow.	2		

4.	kg.	5.	kg.	6.	kg.
Wytłoków kisz.	35	Wytłoków kisz.	40	Kiszonki z liści bur.	40
Siana łąkowego	4	Siana konicz.	10	Siana konicz.	10
» konicz.	6	Słomy i plew	5	Jęczmionki	8
Owsianki	4	Makuchu konopn.	2	Melasy	2
Plew pszennych	3	Śruty bobikowej	2	Otrąb	2
Słodzin świeżych	20			Makuchu lnian.	2
Makuchu rzepak.	$2^1/_2$				
Kiełków słodow.	2				

IV. Młodzież bydła ras mlecznych.

a) w wieku 2—3 m., średnio ż. w. 70 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3	kg.
Mleka zbieran.	4	Mąki groch.	0.5	Śruty jęczm.	0.75
Siana łąk. młod.	1	Siana łąkow.	1.25	Siana łąk.	1
Owsa	0.5	Owsianej mąki	0.5	Kiełków słodow.	0.5
Siemienia lnian.	0.25	Siemienia lnian.	0.25	Siemienia lnian.	0.33

b) w wieku 3—6 m., przy żyw. wadze śred. 140 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Siana łąkowego	2	Siana młodego	2	Siana łąk. młod.	2
Owsa	1	Owsa	1	Buraków	3
Otrąb żytnich	0.5	Kiełków słod.	0.5	Śruty jęczmien.	1
Makuchu lnian.	0.75	Makuchu lnian.	0.5	Makuchu lnian.	0.75

c) w wieku 6—12 m., przy ż. w. 220 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Buraków	4	Kartofli	3	Siana łąkowego	3
Siana łąkowego	3	Siana łąk.	4	» konicz.	2
Owsianki	2	Słomy jarej	2	Owsianki	1
Plew	1	Makuchu rzep.	0.75	Śruty jęczmiennej	2
Kiełków słodow.	0.5				
Makuchu rzep.	0.25				

V. Młodzież bydła ras mięsnych.

a) w wieku 3—6 m., śred. ż. w. 150 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Siana łąk. młod.	2	Siana łąk. młod.	25	Siana łąk.	3
Owsa	1	Marchwi	30	Buraków	3
Otrąb żytnich	1	Śruty grochowej	1	Kiełków słodow.	0.5
Makuchu lnianego	0.5	Makuchu lnianego	0.5	Owsa	0.5
				Makuchu lnianego	0.25

b) w wieku 6—12 m., śred. ż. w. 250 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Buraków	4	Wytłoków	10	Kartofli	3
Siana łąk.	4	Siana łąk.	4	Siana	3
Słomy jarej	2	Słomy jarej	2	Wyczanki	2
Makuchu lnian.	1	Owsa	1	Owsa	0.5
Owsa	1	Makuchu rzepak.	0.5	Makuchu lnian.	1.0
		» lnian.	0.5	Otrąb żytnich	0.5

c) w wieku 12—18 m., śred. ż. w. 340 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Buraków	10	Wytłoku kisz.	10	Kartofli	4
Siana średn.	3	Siana łąk. śred.	4	Siana koniczyn.	2
Słomy strączk.	3	Słomy jarej	3	Siana łąk.	2
» jarej	2	Owsa	1	Słomy jarej	2
Makuchu rzepak.	1	Kiełków słod.	0.5	Śruty jęczmien.	$1^1/_2$
Mąki karm. żytn.	0.5	Makuchu rzep.	0.75	Makuchu rzep.	1

VI. Owce cienko wełniste na 1000 kg. ż. w.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Słomy strączkow.	10	Buraków	20	Kartofli	15
Siana koniczyn.	5	Siana łąk. II	10	Siana łąk. II	10
Siana łąk. II	5	Słomy	12	Siana przelotu	5
Słomy ozimej	10	Strączyn rzep.	5	Słomy ozimej	12
Łubinu	2	Otrąb	2.5		
		Makuchu rzepak.	0.5		

VII. Prosięta opasowe na 10 szt. w wieku:

1*a*. 2—3 m. 20 kg. ż. w.	kg.	1*b*. 3—5 m. śred. ż. w. 50 kg.	kg.	1*c*. 5—7 m. ż. w. 65 kg.	kg.
Mleka chudego	20	Mleka odtłuszcz.	30	Mleka odtłuszcz.	40
Śruty jęczmiennej	4	Kartofli	30	Kartofli	50
Kukurydzy	2	Otrąb żytnich	4	Otrąb żytnich	4
Grochu	2	Śruty jęczmiennej	4	Mąki jęczm. karm.	2

2*a*.		2*b*.		2*c*.	
Mleka niezbieran.	15	Kartofli	40	Buraków	30
Śruty jęczmiennej	4	Grochowej mąki	6	Kartofli	30
Grochu	3	Śruty jęczmiennej	5	Grochowej mąki	4
Otrąb żytnich	1	Mąki mięsnej	0.5	Otrąb żytnich	5
				Mąki jęczm. karm.	3
				Makuchu lnianego	1

VIII. Tuczniki 8—10 m., wagi począt. 100 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Mleka chudego	1	Kartofli	5	Kartofli	5
Serwatki	3	Śruty jęczmiennej	1	Śruty jęczmiennej	1.5
Śruty jęczmienn.	0.5	Śruty kukurydz.	1	Mąki karm. żytn.	1
Mąki pastewnej	1.0	Grochu	1	Mąki mięsnej	0.3
Kartofli	4.0				
Grochu	0.5				

IX. Konie, średnia praca (1,000.000 kgm. pracy konia wagi 450 kg.) na 1.000 kg. ż. w.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Owsa	6	Owsa	9	Kukurydzy	10
Siana łąkow.	15	Siana łąkow.	10	Siana łąkow. śr.	6
Siana koniczyny	5	Siana koniczyny	6	Siana koniczyny	6
Słomy ozimej	2	Słomy ozimej	4	Słomy ozimej	3
				Makuchu rzepak.	1

4.	kg.	5.	kg.	6.	kg.
Kartofli	18	Marchwi	20	Owsa	7
Siana łąkow.	10	Siana łąkow.	10	Kukurydzy	3
Słomy ozimej	3	Słomy ozimej	3	Siana łąkow.	5
Makuchu	2	Śruty żytniej	3	Słomy jarej	3
Mąki karm. żytn.	4	Śruty bobikowej	3	Słomy owsianej	2
				Śruty bobikow.	2
				Makuchu	2

Silna praca ($1\frac{1}{2}$—2,000.000 kgm. pracy konia 450 kg. ż. wagi).

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Owsa	18	Owsa	5	Owsa	8
Siana łąk. śred.	6	Kukurydzy	8	Żyta	4
Słomy owsianej	3	Siana łąk.	8	Siana łąkow.	8
Bobiku	2.5	Siana koniczyny	4	Siana koniczyny	4
		Słomy ozimej	3	Słomy jarej	3
		Makuchu	2	Makuchu rzepak.	1
				Makuchu lnianego	1

Normy przyjęte w stadzie państwowem w Mezöhegyes.

Rodzaj zwierzęcia	Kg. na sztukę: owsa	siana	słomy jarej
Źrebięta od 3 do 6 tygodni	0.3	—	—
» » 7 tyg. do odsadzenia ($\frac{1}{2}$ roku)	1	—	—
» odsadzone od $\frac{1}{2}$—1 roku	2.25	4	2
Ogierki roczniaki przy pastwisku	2	1	2
» w stajni	3	4	4
» 2-letnie przy pastwisku	1.5	1	2
» » w stajni	3	5	4

Rodzaj zwierzęcia	Kg. na sztukę owsa	Kg. na sztukę siana	Kg. na sztukę słomy jarej
Ogiery 3-letnie przy pastwisku	2	1	2
» po wzięciu na stajnię	4.5	6	—
» stadne w zwykłym czasie	4.5	5	2
» » podczas stanowienia	5	6	—
Klaczki 1-roczne przy pastwisku	2	1	2
» » na stajni	3	4	4
» 2-letnie przy pastwisku	1.5	1	2
» » na stajni	2.5	5	4
Klacze 3—4-letnie przy pastwisku	2	1	2
» » na stajni	3	5	4
» po wzięciu na stajnię	4	5	—
» od przyjęcia do stada do 5 lat w. . .	5	5	—
» stadne bez źrebiąt przy pastwisku . .	—	3	3
» » » » na stajni	2	6	8
» » źrebne przy pastwisku	2	3	4
» » » na stajni	2.5	8	5
» » ze źrebiętami przy pastwisku	2.5	3	3
» » » » na stajni	3	8	6
» » czasami zaprzęgane	5	8	3
Służbowe konie zaprzężne	5	8	3
» » wierzchowe	3.5	5	2
Konie przeznaczone na sprzedaż	5	6	—

Do częściowej zamiany owsa innym pokarmem uważa się 1 kg. owsa za równoważnik 2 kg. siana, 0.75 kg. jęczmienia, 0.75 kg. otrąb, 0.60 kg. kukurydzy, 0.60 kg. bobiku, 8 kg. zieleniny. Okopowe używają jako dodatek (po odjęciu w zamian czegoś z owsa).

Pastwisko, wystarczające dla wyżywienia bydła (500 kg.) lub owiec (40 kg.) przez lato, oblicza się z ilości spodziewanego z hektara zbioru siana z uwzględnieniem dni pasienia. Wystarczy 1 ha, względnie 1 mórg pastwiska, na 150 dni dla wymienionej obok ilości sztuk przy spodziewanym zbiorze siana w ctn. metr.

Rodzaj pastwiska	Wyżywi sztuk 1 ha.		Wyżywi sztuk 1 mg.	Spodziewany zbiór siana z 1 ha.		Spodziewany zbiór siana z 1 mg.
Wypasowe dobre	2.3—2.9	bydła	1.3—1.7	55—70	ctn.	32—40
Bydlęce b. dobre	1.9—2.3	»	1.1—1.3	45—55	»	26—32
» dobre	1.5—1.9	»	0.9—1.1	35—45	»	20—26
» średnie	1—1.5	»	0.5—0.9	25—35	»	14—20
Owcze dobre	8.7—11.5	owiec	5.0—6.5	25—35	»	14—20
» średnie	6—8.7	»	3.5—5.0	15—25	»	9—14
» liche	2.5—6	»	1.4—3.5	6—15	»	3.5—9
» b. nędzne	1—2.5	»	0.5—1.4	3—6	»	1.8—3.5

Wydatek masła przy danej tłustości mleka.

Przypuszczając normalnie dobry przerób: oddzielenie tłuszczu = 90%, zmaślenie = 97%, i tłuszczu w maśle = 83%, otrzymamy 1 kg. masła z — ilości mleka przy % tłuszczu w mleku:

Tłuszcz mleka %	Mleka kg. na 1 kg. masła	Tłuszcz mleka %	Mleka kg. na 1 kg. masła	Tłuszcz mleka %	Mleka kg. na 1 kg. masła
2.50	38.03	3.34	28.47	4.20	22.64
2.54	37.44	3.40	27.96	4.24	22.42
2.60	36.57	3.44	27.64	4.30	22.11
2.64	36.01	3.50	27.16	4.34	21.96
2.70	35.21	3.54	26.86	4.40	21.61
2.74	34.70	3.60	26.41	4.44	21.41
2.80	33.96	3.64	26.12	4.50	21.13
2.84	33.48	3.70	25.69	4.54	20.94
2.90	32.78	3.74	25.42	4.60	20.67
2.94	32.34	3.80	25.12	4.64	20.49
3.00	31.69	3.84	24.76	4.70	20.13
3.04	31.27	3.90	24.38	4.74	20.06
3.10	30.69	3.94	24.13	4.80	19.81
3.14	30.28	4.00	23.77	4.84	19.64
3.20	29.71	4.04	23.53	4.90	19.40
3.24	29.34	4.10	23.19	4.94	19.25
3.30	28.81	4.14	22.97	5.00	19.01

Przy % tłuszczu w mleku mniejszym od 2.5% należy podwoić odnośną liczbę poniżej 5%. Przy wyższych nad 5% ilościach tłuszczu — połowa cyfry odpowiadającej liczbie ponad 2.5% (dla 2.4% = 19.81 × 2 = 39.62; dla 5.4% = 35.21 : 2 = 17.6). Wydatek masła uważa się za b. dobry, gdy idzie 20 l. mleka na 1 kg. masła, średni przy 25 l., mierny przy 30 l. na 1 kg. masła.

Dobra dójka winna w ciągu roku dać minimalnie ilość mleka = pięciokrotnej swej żywej wagi. Np. ważąca 500 kg. — 2500 kg. = 2427 mleka. Mleczność dochodzi swego maximum po 5 m. cielęcia, poczem zwykle spada. Średni skład mleka krowiego i siary (kolostrusa) jest następujący:

	Mleko: od do	średnio	Siara: średnio
Wody	83—90%	87.5	74.1
Tłuszczu	0.8—8%	3.4	2.5
Sernika	2—4.5%	3.1	2.8
Albuminu itp.	0.2—0.9%	0.7	16.5
Cukru mlek	3.0—6.0%	4.5	3.0
Popiołu	0.6—0.9%	0.7	1.1

Średni ciężar właściwy mleka przy 15° C. = 1.03 (1.027—1.035). Litr waży 1.03 kg. Temperatura zmaślenia podkwaszonej śmietany 15—17° C., słodkiej 11—13° C. Dobre oddzielenie tłuszczu na wirówce ponad 90% czyli z pozostawieniem 0.3% tłuszczu w mleku chudem. Z mleka średniego, przy odebraniu 16% śmietany, otrzy-

mamy ze 100 kg. mleka: 84 kg. mleka chudego, 3.6 kg. masła, 12.4 kg. maślanki, a w nich:

	16 kg. śmietanki	84 kg. mleka chudego	12.4 kg. maślanki	3.6 kg. masła
Wody	11.24	76.06	10.89	0.53
Tłuszczu	3.13	0.27	0.13	3.00
Sernika	0.51	2.69	0.50	0.07
Albuminu	0.11	0.59	0.10	
Cukru mlek.	0.72	3·78	0.68	
Popiołu	0.11	0.59	0.10	

Waga rzeźna w stosunku do żywej.

Wół chudy w. rz. 48% w. żyw.	Skop średn. utrzym. cienki	43%
Krowa chuda w. rz. 45% » »	» » » mięsny	46%
Wół dobrze trzymany 50% w. ż.	» podpasiony cienki	47%
Krowa » » 48% » »	» » mięsny	53%
Wół podpasiony w. rz. 56% » »	» utuczony cienki	54%
Krowa » » 53% » »	» » mięsny	59%
Wół utuczony » » 60% » »	Świnie popr. niżej roku podp.	70%
Krowa » » 57% » »	» wyżej » »	75%
Ciele chude » » 58% » »	» niżej » tucz.	77%
» tłuste » » 65% » »	» wyżej » »	82%

Na 1 kg. mięsa wypada w gramach z wołu:

	mięsa	tłuszczu	wody
tłustego	356	239	390
chudego	308	81	597
	+ 48	+ 158	— 207

Udział poszczególnych części ciała w wadze żywej zwierząt.

Na 100 ż. w. przypada na	Wół: chudy	Wół: średnio utrzymany	Wół: podpasiony	Wół: tłusty	Skop: chudy	Skop: średnio utrzymany	Skop: podpasiony	Skop: tłusty	Skop: b. tłusty	Świnia: podpasiona	Świnia: utuczona	Ciele tłuste
Krew	5.0	4.7	4.2	3.9	3.9	3.9	3.6	3.2	3.2	7.3	3.0	4.8
Skórę, łeb, rogi	14.4	13.7	12.4	10.7	24.0	22.8	20.0	18.0	16.1	—	—	13.5
Wnętrznosci oczyszczone	10.3	9.9	7.2	7.7	8.5	8.1	7.7	6.6	5.3	9.8	6.0	7.7
Mięso i tłuszcz	46.0	49.7	58.6	64.8	46.3	49.4	54.3	59.6	65.1	74.5	84.6	62.4
Zawart. kiszek	20.2	18.0	15.0	12.0	16.0	15.0	14.0	12.0	10.0	7.0	5.0	7.0
Wagę rzeźną stanowią w % żywej wagi:												
Mięso	34.6	36.0	38.0	35.0	33.2	33.5	33.1	29.0	27.0	46.0	40.0	43.0
Tłuszcz w mięsie	1.0	2.0	7.9	14.7	2.0	3.3	8.0	14.7	20.5	16.5	32.4	5.5
Tłuszcz trzewi razem	2.3	4.3	4.5	8.0	4.0	6.0	7.3	10.4	12.4	3.6	6.4	4.6
Kości	8.1	7.4	7.3	7.1	7.1	6.6	5.9	5.5	5.2	8.0	5.8	9.3
Waga rzeźna t. z. mięso razem	46	49.7	58.6	64.8	46.3	49.4	54.3	59.6	65.1	74.5	84.6	62.4

Skład mięsa z różnych części ciała w %.

	Wół chudy			Wół tłusty		
	szyja	krzyżówka	żebro przedn.	szyja	krzyżówka	żebro przedn.
Woda	77.5	77.4	76.5	73.5	63.0	50.5
Tłuszcz	0.9	1.1	1.3	5.8	16.7	34.0
Popiół	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0
Substancya mięsna	20.0	20.3	21.0	19.5	18.8	14.5
Sucha substancya	22.5	22.6	23.5	26.5	36.6	49.5

Przyjmując (Wolff) wartość tłuszczu w mięsie o 25% wyższą jak substancyi mięsnej wypadnie wartość użytkowa najlepszego mięsa z tłustego wołu dwa razy wyższa, jak pośledniе gatunki, najlepsze chude będzie mniej pożywne, niż najgorsze z tuczonego zwierzęcia. Uwzględnienie smaku wymaga, by ceny gatunkowe mięsa były bardzo różne (w Anglii najlepsze jest 4 razy droższe od ostatniego z tegoż wołu). Mięsne rasy mają właśnie te części ciała, dające najlepsze mięso, silnie rozwinięte.

Grzanie się (latowanie) samic.

Rodzaj zwierząt	Trwanie okresu	Powrót po niezapłodnieniu	Powrót po porodzie
Klacz	5—7 dni	3—4 tygodni	5—9 dni
Krowa	2—3 »	3—4 »	21—28 »
Owca	2—3 »	17—28 dni	7 miesięcy
Świnia	2—4 »	9—12 »	4—5 tygod. m. × 9 tyg.

Trwanie ciąży — siedzenie na jajach.

Klacz $48^1/_2$ tygod. 340 dni średnio (wahania od 307—412 dni).
Krowa $40^1/_2$ » 284 » » » » 240—311 »
Owca 22 » 152 » » » » 146—157 »
Świnia 16 » 116 » » » » 112—120 »
Suka 9 » 63—65 dni. Kotka 8 tygodni, 46—60 dni. Kury siedzą średnio 21 dni (19—24) dni. Gołębie 18—19 dni. Indyki 26—29 dni. Kaczki 28—32 dni. Gęsi 28—33 dni.

Trwanie ssania przy chowie.

Źrebięta . . 3—5 miesięcy Jagnięta . . . 2—4 miesięcy
Cielęta . . $1^1/_2$—3 » Prosięta . . . 5—8 tygodni.

Cielę ras mlecznych wymaga mleka pełnego $^1/_7$—$^1/_8$ swej wagi dziennie. Cielęta ras mięsnych $^1/_5$—$^1/_6$. Mleka pełnego 10—12 kg. daje 1 kg. przyrostu cielęcia, mleka chudego 15—20 kg. daje 1 kg. przyrostu. Właściwie zużywa ciele w pierwszych dwóch tygodniach wieku na utworzenie 1 kg. przyrostu 1.04 kg. suchej substancyi mleka, później średnio 1.25 kg. s. s. mleka.

WETERYNARYA.

Podał prof. Stanisław Królikowski.

I. Odrażanie.

Odrażanie (odkażanie, dezynfekcya). W walce z chorobami zakaźnemi jednym z najpotężniejszych czynników tej walki jest zabicie lub usunięcie drobnoustrojów chorobotwórczych, znajdujących się w zetknięciu ze zdrowem jeszcze zwierzęciem lub w jego najbliższem sąsiedztwie. Osiągamy to zapomocą odrażania, które odbywać się może albo na drodze fizycznej albo chemicznej.

Do środków odrażających **fizycznych** należą:

Światło słoneczne, szczególniej nierozprószone, połączone z działaniem promieni cieplikowych. Światło, działając przez długi czas, zabija nawet dość odporne grzybki chorobotwórcze.

Przewietrzanie (wentylacya). Wskutek silnego ruchu powietrza zakaźniki zostają oderwane od przedmiotów, do których przylegają i rozprószone w przestrzeni atmosferycznej, gdzie stają się prawie nieszkodliwymi już to z przyczyny, że znajdują się tam w bardzo małej ilości, już to, że zostają osłabione lub nawet zabite przez czynniki takie jak światło, tlen i t. p.

Przedmioty poddane odwietrzeniu należy układać tak, aby wiatr wiał od nich w pole a nie wprost na sąsiednie budowle. Przy przewietrzaniu stajen, po usunięciu zwierząt, okna i drzwi otwierają się na przestrzał. Drzwi i okna sąsiednich stajen obór i t. p. powinny być wtedy zamknięte.

Trzepanie przedmiotów na wietrze ułatwia akt przewietrzania. Co do kierunku wiatru i stosunku do sąsiednich pomieszczeń dla zwierząt i ludzi, zachować należy te same co powyżej ostrożności.

Wycieranie. Uskutecznia się ono za pomocą ścierek, wiechci z rogoży lub strużek drzewnych, gąbek, chleba, zamszy. Przedmioty użyte jako narzędzie do wycierania winny być z początku lekko wilgotne, a później mokre: po użyciu należy je spalić lub dokładnie chemicznie odkazić.

Wyskrobywanie. Stosuje się ono do ścian, podłóg, przegród i t. d. i dokonywa przy pomocy ostrych rydlówek, na wilgotno, zwłaszcza gdy idzie o choroby, które przenoszą się na ludzi.

Zimno jest bardzo słabym środkiem odkażającym; na wymrożenie więc przedmiotów zapowietrzonych nie liczyć nie można.

Gorąco. Odpowiednio wysoka ciepłota zabija wszystkie zakaźniki. Można przyjąć, iż gotowanie w wodzie, para wodna dochodząca do 115° C. i powietrze suche mające ciepłotę 120° C., jeżeli działają wskroś przedmiotów odkażanych przez nas, od jednej do paru godzin, stanowczo zabijają wszelkie grzybki chorobotwórcze. Do łatwiejszego przeprowadzenia odkażenia zapo-

mocą wysokiej ciepłoty znajdują się w handlu wygrzewalnie (termostaty) różnego systemu.

Środki odkażające chemiczne. Rozwijają one swoją czynność w zupełności dopiero wtedy, gdy działają w stanie ciepłym lub gorącym.

Rozdzielamy je na gazowe i niegazowe.

Przed rozpoczęciem odkażenia gazowego należy wszystkie szpary w budowli pozatykać (najlepiej z zewnątrz), okna, drzwi i wentylatory dokładnie pozamykać, wreszcie zwierzęta wyprowadzić. Po dokonaniu dezynfekcyi przestrzeń odkażona winna zostać jeszcze przez dobę zamkniętą, następnie, zanim się doń zwierzęta wprowadzi, dobrze wywietrzona przez otwarcie na przestrzał okien i drzwi.

Środki odkażające gazowe działają znacznie energiczniej, jeżeli przedmioty im poddane są zwilgocone. Tutaj należą:

Chlor otrzymuje się różnymi sposobami; najtańsze z nich są:

a) Soli kuchennej 4 części na wagę, dwutlenku manganu (braunsztejnu) 3 części, zmięszać w miseczce glinianej i oblać 9 częściami kwasu siarkowego. Jeżeli mieszaninę podgrzeje się naprzykład na lampie spirytusowej, to chlor wywiązuje się prędzej.

b) Wapna chlorowego 1 część, kwasu solnego 2 części.

Odkażenie chlorem należy powierzać człowiekowi roztropnemu, a tenże powinien pamiętać, że wdychanie tego gazu jest dla płuc szkodliwe, ma więc mieć usta i nos przewiązane mokrą chusteczką. Sprawę trzeba załatwić prędko.

Chlor jako środek odkażający działa bardzo energicznie i pewniej niż inne gazy.

Bezwodnik kwasu siarkawego. Gaz ten otrzymuje się przez spalenie siarki. Działa mniej pewnie niż poprzedni; trzeba spalić ogromne ilości siarki, około 100 gramów na metr sześcienny przestrzeni stajennej, aby osiągnąć należyty skutek. Ostrożnie postępować, aby nie spowodować pożaru.

Formol. Pary formolu otrzymuje się już to za pomocą aparatu Lingnera (z Drezna) z t. zw. glykoformolu, już to za pomocą ogrzewania nad lampą spirytusową w przeznaczonych do tego przyrządach odpowiednio zrobionych (kołaczyków Schering'a. Na 1 m^3, powietrza potrzebne są dwa kołaczyki), które obecnie znajdują się już w handlu. Wreszcie metodą wrocławską przez wyparowywanie wodnych roztworów formolu w kotłach do tego odpowiednio urządzonych, ogrzewanych spirytusem.

Odkażenie formolem wypada obecnie jeszcze dość drogo, zwłaszcza że wymaga kosztownych aparatów, jednak jako środek dezynfekcyjny formol jest środkiem doniosłym. Nieprzyjemny zapach formaldehydu usuwa się zapomocą rozpylania amoniaku.

Kwas karbolowy (czysty), kreolina lub lyzol w 2—8% roztworze, rozpylone zapomocą pulweryzatorów lub ogrodowej rozpraszającej sikawki, także mogą służyć do odkażania przestrzeni i ścian.

Wapno niegaszone. Posypuje się niem podłogi a następnie zlewa wodą. Świeżo rozczynione z wodą używa się do smarowania ścian, żłobów, przegród i t. d. Suche wapno miesza się z ziemią wykopaną w stajniach odwietrzanych, posypuje się niem padlinę w dołach, nawóz i t. p.

Ług z popiołu drzewnego. Popiół gotowany z wodą w stosunku 1 litra popiołu na litr wody, daje wyborny środek

odkażający, którym myje się żłoby, drabinki, przegrody, drewniane ściany, podłogi, kubły, uprząż. Stosowane na gorąco działa lepiej niż na zimno. Tkaniny wełniane nie znoszą silnego ługu, zatem słabsze roztwory, których w tym razie używać musimy, służą tylko do odtłuszczenia przedmiotów.

Siarkan żelaza i siarkan miedzi (koperwas żelazny i miedziany) używa się w proszku lub roztworze wodnym dla odkażania ustępów, ścieków i t. d. Są one środkiem dezynfekcyjnym dość słabym. Siarkan miedzi odpowiada swemu celowi przy odkażaniu kopyt i racic u zwierząt, gdyż zarazem zapobiega ich gniciu. W tym ostatnim celu zlewa się dwa razy dziennie podeszwy, strzałkę rogową i szpary międzyraciczne.

Dziegieć. Wszelkie gatunki dziegciu nadają się do odkażania, szczególniej jednak do tego celu dobry jest dziegieć sosnowy. Jedna część dziegciu rozpuszcza się na ogniu z 20 częściami ługu popiołowego i natychmiast zużywa lub pozostawia w naczyniu zamkniętem w ciągu 24 godzin. Używa się do odkażania ścieków, dołów kloacznych, gnojówek, uprzęży i t. p.

Kreolina, krezolina i lizol: trzy środki odkażające podobne do siebie ze sposobu i siły działania; używają ich z wodą w rozcieńczeniu 3—5%. Stosują się one do odkażania wszelkiego rodzaju przedmiotów, nie wyłączając żywych zwierząt, gdyż z ostrożnością użyte nie działają szkodliwie na zdrowie tych ostatnich. Żłoby po odkażeniu tymi środkami należy wymyć ługiem i wypłukać wodą. W oborach krów mlecznych niezupełnie stosowne z przyczyny zapachu swego udzielającego się mleku.

Kwas karbolowy. Dzielny ten środek odkażający znajduje się w handlu już to jako t. zw. surowy, już to jako czysty. Surowy używa się nierozcieńczony dla odkażania rowków ściekowych, gnojówek, do polewania trupów zwierząt dobitych z powodu zarazy (czyni mięso wstrętnem więc zapobiega jego użyciu) lub padłych na nią.

Kwas karbolowy czysty znajduje się w handlu w stanie krystalicznym (do użycia niewłaściwy, gdyż manipulacya z nim trudna) i w stanie płynnym (Acidum carbolicum liquefactum). Używają się jego wodne roztwory (3—5%) dla odkażania powietrza (rozpylony), ścian, podłóg, przegród, żłobów (te po ukończeniu odkażenia muszą być dobrze wymyte), uprzęży, koców, derek i t. p. Rozpuszczalność kwasu karbolowego w wodzie podnieść można przez dodanie doń gliceryny lub spirytusu. Kwas karbolowy ma wielce nieprzyjemną woń (mleko i mięso łatwo przejmują ten zapach) i jest bardzo trującym (!!); w stanie stężonym (począwszy od 10% roztworu) łatwo wywołuje na ciele oparzenia. Dlatego też użycie jego wymaga ostrożności i może być polecone tylko osobom roztropnym.

Sublimat rtęciowy, najdzielniejszy ze wszystkich znanych dotąd środków odkażających. Pomimo swych bardzo silnie trujących własności użyty w odpowiedni sposób jest najodpowiedniejszym do wszelkiego rodzaju odkażania nawet dla odrażania żywych zwierząt, nie wyłączając bydła rogatego, które jest czulsze od innych czworonogów na preparaty rtęciowe. Najmniej odpowiedni jest sublimat do odkażania ścian, gdyż wtedy użyty być musi w zbyt wielkiej ilości. Żłoby po jego użyciu winny być spłukane obficie gorącą wodą, toż samo i podłogi. W handlu znajduje się krystaliczny czysty i w postaci pastylek Angerer'a (jedna pastylka zawiera jeden gram subli-

matu). Wydany być może tylko na zlecenie lekarskie. Dogodniej używać go w pastylkach; w stanie krystalicznym stosowanie jego jest z wielu względów znacznie niebezpieczniejsze. Roztwory w granicach 1:1000—10000 wody nie powinny być przekraczane!

Odkażenie gruntu. Trawy na gruncie, zakażonym przez szereg lat, wyłączyć od spasania i zbioru, a gdy dojrzeją lub skoszone wyschną — spalać na miejscu. Osuszenie zapomocą rowów lub drenów. Niewielkie przestrzenie (grzebowiska, dziedzińce, stajnie) przysypywać wapnem niegaszonem lub chlorowem.

Odkażenie wody. W niewielkich zbiornikach naturalnych lub sztucznych spuszczenie wody, wyszlamowanie, obfite sypanie wapna, jeśli rybostan nie przeszkadza. W naczyniach: kilkogodzinne odstanie się wody, gotowanie, dodatek wapna niegaszonego w stosunku 0·5 kg. (w proszku) na 100 litrów wody: dodatek ałunu w ilości 0·25—0·15 do litra wody, następnie po zmąceniu odstanie przez dobę.

Odkażenie karmy. Spalenie (wąglik, nosacizna, księgosusz, ospa owcza, pomór u swiń) a w przyjaznych po temu warunkach spaszenie jej zwierzętom niepodlegającym danej chorobie i to tylko z wiedzą i przy wskazówkach władz weterynaryjno-policyjnych. Zupełnemu zniszczeniu przez rzucenie do kompostów winno się poddać karmę zgniłą: niekiedy karma nadpsuta może być spasana po zaparzeniu lub przegotowaniu: karmę zabłoconą wymyć (okopowe), poddać działaniu deszczu, wymłócić cepami na wietrze (siano zamulone, słomy pokryte czernią), przesiać (owies) i t. p. lecz nie w stajni.

Odkażenie stajen. Gruntowna dezynfekcya stajen jest rzeczą kosztowną, uskuteczniać ją przeto należy przy chorobach zakaźnych ciężkich (wąglik, księgosusz, zaraza płuc bydła rogatego, ospa owcza, nosacizna i t. d.), których zakaźniki są wytrzymałe na wpływy zewnętrzne. Przed przeprowadzeniem dezynfekcyi zasięgnąć porady lekarza weterynaryjnego. Przy sprzyjających okolicznościach można niekiedy bez dokonania w całej rozciągłości kosztownej dezynfekcyi stajen wykorzystać je, zamieniając na użytek dla innego gatunku zwierząt. Stajnie zamienić na oborę (nosacizna, influenza), owczarnię na oborę lub stajnię (ospa owcza) i t. d. Przedsiębiorąc odkażenie pomieszczeń dla zwierząt, nakreślić sobie ścisły plan postępowania i dokładnie go wykonać, unikając niepotrzebnych wydatków a nie skąpiąc na niezbędne. W różnych warunkach plan musi być różny; przedstawiony tu szemat musi być niekiedy stosownie do okoliczności zmieniony. Oto on:

a) Wywiezienie karmy ze stajen i z poddasza, postępując z nią przytem stosownie do rodzaju choroby, używając pomocy zwierząt danej chorobie nie podlegających.

b) Pozatykanie z zewnątrz wszystkich szpar w ścianach.

c) Usunięcie ze stajni zwierząt i przeprowadzenie ich do innego pomieszczenia po poddaniu najdokładniejszemu odkażeniu (patrz odkażenie zwierząt).

d) Usunięcie ze stajni mierzwy (patrz odkażanie mierzwy).

e) Usunięcie warstwy półmetrowej ziemi, jeżeli niema podłogi lub jest przegniła drewniana, zrobiona z kamienia polnego, z gliny. Przegniłe dyle spalić, kamień przełożyć warstwami słomy i wypalić.

f) Powynoszenie sprzętów ruchomych ze stajni i poddanie ich właściwemu odkażeniu.

g) Spalenie żłobów drewnianych i drabinek małowartościowych.

h) Odkażenie pułapu i ścian. Ściany drewniane: wymycie ługiem, zlanie roztworem kreoliny (kwasu karbolowego, sublimatu w stosunku 1 : 5000), pobielenie wapnem (wapnem chlorowem); ściany tynkowane wyskrobać a od podłogi po wysokość uszu zwierząt odbić i wytynkować nanowo, pozostałą część wytrzeć i wybielić.

Przegrody, drążki, drabinki wyskrobać, wymyć ługiem następnie odkazić kreoliną (3%), sublimatem (1 : 2000); żłoby wymyć ługiem, drewniane zheblować, potem wymyć kreoliną, sublimatem (1 : 5000).

i) Odkażenie podłogi: wyskrobanie, wymycie ługiem, zlanie roztworem kreoliny (3%), sublimatu (1 : 2000), posypanie wapnem niegaszonem lub chlorowem.

k) Odkażenie rowków ściekowych: wyskrobanie, zlanie obfite kwasem karbolowym surowym, kreoliną (3%) lub sublimatem (1 : 1000).

l) Odkażenie przestrzeni stajennej przy pomocy gazów (chlor, bezwodnik kwasu siarkawego, formol).

m) Zamknięcie stajni na dobę.

n) Przewietrzenie.

o) wniesienie sprzętów.

p) Wprowadzenie zwierząt.

Odkażenie uprzęży: wytarcie, wymycie ługiem, pociągnięcie roztworem kwasu karbolowego (5%), kreoliny (3%).

Odkażenie derek, koców, odzieży. Wytrzepanie, wygotowanie w wodzie lub ługu stosownie do materyału. Z butami postąpić jak z uprzężą lub spalić.

Odkażenie sprzętów. Wymycie ługiem, roztworem kreoliny (3%) lub sublimatu (1 : 2000); łańcuszki, rydle użyte przy dezynfekcyi wypalić. Przedmioty drewniane lub małowartościowe spalić.

Odkażenie osób. Kąpiel, dokładne wymycie włosów na głowie, zmiana odzieży. Do odkażania rąk podczas trwania dezynfekcyi używać mydła sublimatowego lub kreolinowego polskiej fabryki »Tlen«, poczem roztwór kreoliny (2%) lub sublimatu (1 : 2000).

Odkażenie zwierząt. Zwierzęta długoszerstne ostrzydz, jeżeli pora na to pozwala, wymyć wodą z mydłem, opłukać wodą czystą i całe ciało rozczynem kreoliny (2%) lub sublimatu (1 : 2000). Po oczyszczeniu ciała odkazić racice, kopyta (woda z mydłem, szczotka, kreolina (3%) lub sublimat (1 : 2000) wreszcie roztwór 10% koperwasu miedzianego).

Odkażenie trupów i odpadków zwierzęcych. Zakopanie w dołach 2 metry głębokich, po przysypaniu wapnem niegaszonem lub zlaniu kwasem karbolowym surowym. Po zakopaniu na mogiłe narzucić słomy i chrustu, które następnie zapalić.

Odkażenie odchodów zwierząt i nawozu. Spalić (wąglik, księgosusz, nosacizna), zakopać lub wywieść na pole zwierzętami które zarazie nie podlegają.

Szczegółowy traktat o dezynfekcyi znaleść można w mojej książce p. t.: »Hygiena weterynaryjna«. Lwów 1897. (Cena w redakcyi »Przeglądu Weterynarskiego« we Lwowie 6 koron za pobraniem).

II. Pomór trzody chlewnej.

Zaraza znana pod tym nazwiskiem jest jedną z najwięcej morderczych, jakie napastują trzodę chlewną. Obraz chorobowy jest rozmaity, skutkiem czego dla niespecyalisty rozpoznanie pomoru jest z początku trudne, dopiero, gdy jedna i druga sztuka pada, zjawia się podejrzenie, iż z tą właśnie zarazą ma gospodarz do czynienia. Zapalenie płuc i jelit często także nerek są podstawą tej choroby. Świnie z początku tracą chęć do jadła, są osłabione, chwieją się na zadzie, chodzą i wstają z trudnością, krokiem drobnym, chętnie leżą, chrząkają ochrypłym głosem, cicho pokasłują; oddech ich jest szybki, utrudniony. Czasami występują wymioty, krwawa biegunka. Gorączka, dreszcze, zmienność ciepłoty uszu i nóg (to gorące, to znów chłodne), zatwardzenie, później ropienie oczu towarzyszą chorobie; koło uszu, na ryju, pod szyją i na brzuchu spostrzega się zaczerwienienie, później zasinienie. Zarazie towarzyszy wielki procent śmiertelności. Nasza pospolita trzoda chlewna jest znacznie więcej pod tym względem wytrzymałą niżli rasy uszlachetnione lub szlachetne.

Przyczyną choroby jest zakaźnik, a do rozwleczenia zarazy przyczynia się handel trzodą, szczególniej rzeźnicy chodzący od chlewu do chlewu, trzebiciele. Rzeź dokonywana w chlewie lub w obejściu gospodarskiem stwarza trwałe ogniska choroby. Wspólne pastwisko, odpadki rzeźniane, odchody chorych zwierząt, śluz wykształszany podczas kaszlu, resztki karmy i t. p. dzielnie sprzyjają rozwleczeniu się zarazy.

W celu jaknajszybszego tępienia pomoru rząd polecił z a b i j a n i e ś w i ń d o t k n i ę t y c h z a r a z ą, tudzież podejrzanych o zarazę lub o zarażenie się, to jest takich, które ze świniami dotkniętemi zarazą w ciągu ostatnich 40 dni były umieszczone w tejże zagrodzie, albo stanowisku, albo na tem samem pastwisku stykały się. Jeżeli nie trzeba obawiać się dalszego rozszerzania zarazy, a chodzi o cenne zwierzęta zwłaszcza rozpłodowe, wolno władzy politycznej krajowej z zastrzeżeniem rozporządzenia c. k. Min. z d. 4 grudnia 1901 r., na prośbę właściciela albo na wniosek komisyi pomorowej zaniechać wybicia sztuk podejrzanych o zarażenie się, a zarządzić 40 dniowe odosobnienie pod nadzorem weterynarskim. Jeżeli obserwacya nie jest zarządzona na żądanie właściciela lecz komisyi pomorowej, wtedy koszta obserwacyi ponosi rząd.

W kwestyi, czy zwierzęta podejrzane o zarażenie się mają być zabite, czy też tylko wzięte pod obserwacyę, można przeciw rozporządzeniu władzy politycznej krajowej wnieść rekurs do Ministerstwa spraw wewnętrznych. Obserwacya jednak natychmiast musi być uskuteczniona.

Sam proces tępienia uregulowany został szeregiem rozporządzeń i instrukcyj a mianowicie: Rozporządzeniem cesarskiem z d. 2 maja 1899 r. (Dz. u. p. Nr. 81), Rozporządzeniem ministeryalnem z d. 6 maja 1899 r. (Dz. u. p. Nr. 82), Instrukcyami c. k. Namiestnictwa z d. 19 maja 1899 r. l. 48—282, Rozporządzeniem cesarskiem z 15 września 1900 r. (Dz. u. p. Nr. 154), Rozporządzeniem Ministerstwa Spr. wew., handlu, kolei i rolnictwa z d. 18 września 1900 (Dz. u. p. Nr. 155), wreszcie Rozporządzeniem ministeryalnem z d. 4 grudnia 1901 r. L. 22190, (Patrz

obwieszczenie c. k. Namiestnictwa z dnia 6 stycznia 1902 r. L. 3067).

Rozporządzenie ministeryalne z d. 4 grudnia 1901 r. wprowadziło w celach tłumienia pomoru podział Galicyi na 3 strefy: zachodnią (I), środkową (II) i wschodnią (III). Do I-szej strefy niewolno bezwarunkowo wprowadzać świń przeznaczonych do użytku lub chowu w strefie II-ej i III-ej, natomiast sztuki rzeźne, z II-gej i III-ej strefy pochodzące, można — wyjąwszy ruch przewozowy w plombowanych wagonach, który jest dozwolony — prowadzić koleją tylko do oznaczonych rzeźni celem wybicia w ciągu 48 godzin (Biała, Bochnia, Busko, Jasło, Kraków-Grzegórzki i Prądnik Biały, Piaski wielkie, Podgórze, Tarnów i Wieliczka).

W strefie I-ej mają być z reguły wybijane wszystkie świnie chore na pomór, podejrzane o zarazę i podejrzane o zarażenie się. Tylko w wypadkach, gdyby chodziło o większą ilość świń, przedstawiających szczególniej cenny materyał rozpłodowy, może być wyjątkowo za osobnem zezwoleniem c. k. Ministerstwa Spr. wewn. zaniechane wybicie z urzędu świń. Natomiast w strefie II-ej i III-ej mają być na razie wybijane tylko świnie chore na pomór lub o zarazę podejrzane.

Za świnie, które po rzezi wykonanej z urzędu uznane będą za niedotknięte zarazą płaci się ze skarbu państwa odszkodowanie a mianowicie:

a) Za świnie rzeźne na podstawie stwierdzonej wagi zwierząt zabitych z nieodłączonemi płucami i sercem, przeponą, wątrobą, nerkami i tłuszczem nerkowym tudzież kiszkowym, wynagrodzenie wynoszące 95% średniej ceny targowej, którą ustanawia co miesiąc właściwa władza.

b) Za świnie użytkowe płacić się ma na podstawie wagi żywej, podług taryfy ustanawianej co kwartał, uwzględniając różnice wieku rasy i inne okoliczności, mające wpływ na cenę. Do świń użytkowych zaliczają się wszystkie sztuki nie należące do świń rzeźnych a nie nadające się już do chowu jakoteż wieprzki trzebione, prosięta i świnie młode. Do świń do chowu zaliczają się wieprze stadne, maciory prośne lub karmiące i świnie młode, dowodnie do chowu przeznaczone.

Za świnie z urzędu zabite a uznane za dotknięte zarazą płaci się wynagrodzenie w stosunku wagi po wypatroszeniu a wynoszące 50% wartości.

c) Za świnie do chowu płacić się będzie o 25% więcej jak za użytkowe. Jeżeli właściciel zaniechał przepisanego wczesnego doniesienia o wybuchu zarazy albo o podejrzeniu, że takowa istnieje, jeżeli zaraza zakradła się z winy właściciela lub jego zarządcy, jeżeli zaraza wybuchnie najpierw u świni, która mniej niż przed 40 dniami wprowadzoną została z kraju nienależącego do obszaru ważności powyżej przytoczonego cesarskiego rozporządzenia (z d. 2 maja 1899 r.) a nie zaraziła się po jej wprowadzeniu, natenczas właściciel zabitej świni otrzymuje tylko zwrot sumy, osiągniętej ze sprzedaży mięsa.

Przy ważeniu komisya pomorowa musi być obecną. Jeżeli między zabitemi świniami stała w przeciągu ostatnich 40 dni choćby tylko jedna świnia, wprowadzona do kraju w sposób przeciwny zakazowi, w takim razie nie wypłaca się żadnego wynagrodzenia temu, na którym ciąży wina albo współwina.

Należące się wynagrodzenie ma być wyasygnowane najpó-

źniej w przeciągu 4 tygodni po wykonaniu odwietrzenia. Wypłata uskutecznia się w miejscowym urzędzie podatkowym.

Przełożony gminy (obszaru dworskiego) ma obowiązek natychmiast, jak go dojdzie wiadomość o pojawieniu się pomoru świń, zawiadomić o tem władzę polityczną, która odpowiednie zarządzenia poczyni.

Posiadacz świń, względem których komisya pomorowa rzeż prowadzi, winien być pouczony o prawach mu przysługujących, co wraz z jego prośbą o zarządzenie obserwacyi a zaniechanie zabijania zwierząt, jeżeli takową uczynił, i opiniją pod tym względem komisyi winno być zapisane w protokole komisyjnym. Dopóki decyzya nie stanie się prawomocną, zarządzenia komisyi pomorowej lub poczynione później przez władze polityczne w celu zabezpieczenia podejrzanych zwierząt od rozwlekania zarazy winny być przez strony jak najściślej zastosowane. Przy tem trzeba mieć osobliwie na uwadze zachowanie cennego materyału hodowlanego. Ustalenie przytem warunków odosobnienia, karmienia, postępowania z wydzielinami, ściółką i t. d. pozostawia się komisyi pomorowej.

Przez czas trwania obserwacyi ilość konsygnowanych zwierząt nie powinna ulegać zmianie, nie wolno bez pozwolenia władzy powiatowej ani nowych zwierząt dodawać ani bądź to żywych bądź padłych usuwać. O wypadkach zachorowania albo padnięcia będących w obserwacyi zwierząt strona ma donieść przełożonemu gminy w przeciągu 24 godzin, tenże zaś winien uczynić doniesienie do przełożonej władzy politycznej natychmiast w drodze najkrótszej.

Szczegółowe pouczenie o postępowaniu przy pomorze trzody chlewnej znaleźć można w dziełku J a n a G u c k l e r a c. k. starszego komisarza powiatowego, pod tytułem: »Przepisy o pomorze świń dla użytku gospodarzy wiejskich«. Lwów 1902 r. Cena 40 groszy.

III. **Gruźlica czyli perlica** (Tuberculosis), dawniej zwana u bydła rogatego chorobą gruczołów, należy do chorób najbardziej rozpowszechnionych między bydłem rogatem; podlegają jej jednak i inne gatunki zwierząt. Człowiekowi udzielić się może gruźlica od zwierząt, przyczem mleko sztuk gruźliczych niewątpliwie jest jednym z najzgubniejszych czynników. Zaniedbanie choroby w początkach prowadzi do zarażenia i zniszczenia całej obory. Kaszel długotrwały, wychudzenie, często twarde guzy w wymieniu — charakteryzują chorobę rozwiniętą już w wysokim stopniu. Rozpoznanie choroby, gdy nie jest jeszcze rozwiniętą, jest nieraz bardzo trudne; znakomicie ułatwia je badanie zapomocą tuberkuliny, t. j. przetworu otrzymanego z hodowli bakteryj gruźliczych. Wstrzyknięcie odpowiedniej ilości tuberkuliny pod skórę zwierzęcia wywołuje w razie, gdy to jest chore na gruźlicę, charakterystyczną gorączkę. Wprawdzie zabieg ten nie jest bezwzględnie pewny, połączony jednak z badaniem klinicznem dokonanem przez weterynarza, pozwala wykryć w oborze wszystkie sztuki chore na gruźlicę, co w dalszym ciągu daje możność walki z tą chorobą w celu uwolnienia od niej stada. Walkę tę obecnie prowadzić trzeba według następującego planu: Zbadać całą oborę zapomocą tuberkuliny i badanie to powtórzyć kilkakrotnie w pewnych odstępach czasu. Bydło chore lub o gruźlicę podejrzane oddzielić od zdrowego, dać mu osobną

obsługę i wyprzedawać na rzeź. Cielętom dawać tylko mleko od krów niereagujących, zupełnie zdrowych, lub tylko przegotowane lub ogrzane poprzednio przynajmniej do 80° C. Obory, w których przebywało bydło gruźlicze, gruntownie odkazić. Nowo kupione sztuki wprowadzić dopiero po zbadaniu ich tuberkuliną.

Ponieważ gruźlica bydła rogatego nie jest dotychczas objęta ustawą o chorobach zaraźliwych, przeto walka z nią leży głównie na barkach kraju, towarzystw rolniczych i polega na osobistej inicyatywie hodowców.

W Galicyi kraj pod tym względem przychodzi z pomocą dość znaczną. Chcąc uzyskać tę pomoc postępuje się w sposób następujący:

Hodowca we wschodniej Galicyi zgłasza się do komitetu c. k. Gal. Tow. Gospodarczego we Lwowie a w Galicyi zachodniej do komitetu c. k. Tow. rol. w Krakowie z zawiadomieniem, że pragnie poddać swą oborę zabiegowi tępienia gruźlicy i wszystkim konsekwencyom, przewidzianym w ułożonym przez Wydział krajowy programie.

Komitet towarzystwa deklaracyę tę przedstawia Wydziałowi Krajowemu, który wedle uznania swego deleguje do danej obory na swój koszt swego weterynarza lub zdaje tę czynność na weterynarza Towarzystwa. W pierwszym razie koszty podróży weterynarza i jego dyety opłaca Wydział Krajowy, w drugim razie komitet, nadto zakupuje on termometry i tuberkulinę z tem zastrzeżeniem, że po skończeniu czynności hodowca zwróci sumę, przypadającą za zużytą tuberkulinę i rozbite termometry.

Z pomocy tej mają prawo korzystać w pierwszym rzędzie właściciele obór zarodowych, zostających pod nadzorem obu krajowych towarzystw gospodarskich, następnie właściciele obór prywatnych pełnej krwi i krzyżowanych, którzy wychowują materyał na własną potrzebę lub sprzedają takowy na chów. W przyszłości będą mogli korzystać z powyższej pomocy kraju włościanie, którzyby na zbiorowe wykonanie tej akcyi w gminie zdecydowali się pod tymi samymi warunkami, co i inni właściciele.

Warunkiem nieodzownym pomocy jest to, że obory zarodowe winny być przynajmniej dwukrotnie, w odstępach czasu pół do jednego roku zbadane i przeszczepione. Badaniem tem mają być objęte w każdej oborze nietylko wszystkie sztuki do obory zarodowej zapisane, ale i wszystkie inne, które razem z tamtemi są utrzymywane wspólnie w stajni i na pastwisku. W następnych latach każdy przybytek w stanie obory, powstały z przychowku lub kupna, winien być każdego roku dodatkowo badany i szczepiony.

Po dokonanem oczyszczeniu obory z gruźlicy, fakt uzdrowienia obory będzie urzędownie ogłoszony.

IV. **Parchy u koni i bydła.** Parchy u koni należą do chorób zaraźliwych udzielających się człowiekowi; spowodowane są one przez maleńkie pajęczaki zwane ś w i e r z b o w c a m i. Zwykle choroba rozpoczyna się na skórze głowy, szyi, łopatek, gdzie tworzą się strupy, rozsypujące się coraz dalej; włos wraz z odłuszczającymi się strupami wypada, wskutek tego miejsca obnażone są zaczerwienione, wilgotne i wkrótce nanowo zasychają. Zwierzę wskutek silnego swędzenia czochra się, gryzie skórę zębami, wreszcie chudnie, nawet ginie. O wybuchu parchów

u koni i owiec potrzeba zawiadomić władze. Konie bardzo wynędzniałe, u których skóra zgrubiała i pomarszczyła się, lepiej zabić, jako trudno uleczalne. Leczenie polega na ostrzyżeniu konia, posmarowaniu wszystkich miejsc pokrytych strupami szarem mydłem rozmieszanem z lekkim ługiem na gęste mazidło. Po 24 godzinach mydło zmywa się ciepłą wodą a strupy dokładnie oddziela zapomocą szczotek lub wiechci ze strużków drzewnych (wata drzewna), które to ostatnie należy zaraz palić. Następnie zwierzę zmywa się mięszaniną złożoną z kreoliny, mydła szarego po 50 części i 500 części spirytusu. Zwykle cały ten proces trzeba po tygodniu powtórzyć a nawet i trzeci raz go uskutecznić. Po oczyszczeniu koni należy przeprowadzić je do czystej stajni, a opróżnioną jak również i sprzęty należycie zdezynfekować. Konie, które stykały z końmi parszywymi, mają się znajdować pod urzędową obserwacyą weterynarską przez cztery tygodnie, przez ten czas jednak, dopóki są zdrowe, wolno ich używać do pracy w obrębie gospodarstwa. Leczenie p a r c h ó w u b y d ł a rogatego uskutecznia się tak, jak u koni.

V. **Kolka z niestrawności u koni.** Chore zwierzę zdradza objawy silnego bólu, ogląda się na brzuch, jest niespokojne, to kładzie się to wstaje, tłucze i tarza się po ziemi; odchodów stałych albo wcale niema lub też są skąpe, twarde. Śmierć może nastąpić już w kilka godzin. Przyczyną kolek bywa zwykle niestrawność z niewłaściwego sposobu karmienia: zbyt obfite karmienie otrębami, plewą breczaną, zbyt drobną sieczką, zbyt wielką ilością słomy, szczególniej żytniej i grochowinami, świeżą koniczyną, jęczmieniem, gdy do nich zwierzę nie przywykło, i wogóle przekarmienie, opojenie zimną wodą i inne. Leczenie zależy na zupełnem odjęciu karmy zwierzęciu (żarłocznym koniom nakładać w takim razie kaganiec, aby podściółki nie jadły) na zadawaniu obfitych lewatyw z chłodnej wody samej lub z dodatkiem mydła, rozcieraniu całego ciała, a szczególniej brzucha, garściami słomy po uprzedniem skropieniu skóry kamforowym spirytusem, wreszcie na dawaniu do wewnątrz środków przeczyszczających (funt soli glauberskiej, którą należy zagnieść z mąką i wodą na ciasto i dać w dwóch dawkach w trzygodzinnym odstępie czasu, albo soli glauberskiej 250 gramów, alocsu 25 gramów, mąki z nasion lnianych 100 gramów z wodą zarobić na powidełka i zadać w ciągu 2—4 godzin). W chwili, gdy koń wskutek bólów chce się kłaść na ziemię i tarzać, należy krokiem przeprowadzać go w ręku; gdy stoi spokojnie, pokryć i podwinąć brzuch derką. Po ustąpieniu kolek a zjawieniu się odchodów, jeszcze przez 24 godzin zachować jak najściślejszą dyetę.

VI. **Stłuczenia.** Stłuczone miejsca, natychmiast po uszkodzeniu, niezbyt ugniatając, rozetrzeć dobrze dłonią posmarowaną tłuszczem, wazeliną, lub skropioną spirytusem kamforowym, arniką... Po dokładnem roztarciu, jeżeli powstał obrzęk, dać z wody zimny okład, który należy zmieniać w miarę ogrzewania się go, lub kompres z grubego płótna, złożonego w kilkoro i zamoczonego w roztworze B u r o w a lub w wodzie, do której dodano na litr 20 gramów cukru ołowiowego i 10 gramów ałunu; okład taki w ciągu pierwszych 48 godzin należy często zmieniać, lub polewać temiż roztworami. W ciągu kilku dni następnych

okład pokrywać grubą suchą tkaniną i zmieniać trzy razy na dobę.

VII. **Obtarcia.** Świeże obtarcia dwa razy na dzień obsypywać proszkiem, złożonym z 5 gramów b i e l i c y n k o w e j (Zincum oxydatum), 20 gramów ałunu (Alumen crudum) i 25 części kredy (Creta preparata). Pudrowanie uskuteczniać przez dni kilka. Obtarcia nieco starsze, sączące ropiastą zasychającą w strupy wydzielinę, smarować maścią jodoformową (1 gram jodoformu na 10 gramów waseliny), a po kilku dniach, gdy powierzchnia obtarcia oczyści się, posypywać dwa razy dziennie proszkiem powyżej wskazanym. Uprząż, która spowodowała obtarcie, poprawić; zwierzę aż do zagojenia od pracy uwolnić. Gdy w miejscu stłuczenia lub obtarcia potworzyły się otwory sączące ropę, nie zwlekać z poradą weterynarską.

VIII. **Rany.** Wszystko co wchodzić ma w zetknięcie z raną, winno być bezwzględnie czyste; woda, używana do przemywania ran i do robienia środków opatrunkowych, ma być przegotowana w nowym garnku lub naczyniu, służącym stale i wyłącznie tylko do gotowania wody (samowar, kociołek i t. p.). Ręce przed rozpoczęciem opatrunku dokładnie wymyć wodą z mydłem, a następnie 2% roztworem kreoliny, toż samo po ukończeniu opatrunku. Pierwszą rzeczą po zranieniu winno być zatamowanie krwotoku, jeżeli ten jest znaczny, jeżeli nieznaczny i nie grozi życiu, pozostawić go samemu sobie i tylko zapewnić zwierzęciu zupełny spokój. Tamowanie krwotoku uskutecznia się przez wywołanie ucisku na ranę zapomocą nałożenia na nią lub wciśnięcia w nią tamponów zrobionych z waty, zawiniętych w gazę, które następnie przyciskamy do rany płóciennym bandażem. W braku waty i gazy należy robić uciskadełka z czystych chustek lub z ręczników złożonych w kilkoro i namoczonych w spirytusie. Uciskadła pozostawić należy do drugiego dnia. Opatrunek rany polega na usunięciu z niej zanieczyszczeń t. j. ziemi, brudu i t. d. zapomocą obfitego zlania jej z początku przegotowaną wodą a następnie jakim roztworem odkażającym np. kreoliną (2%), sublimatem (1 na 3000), kwasem karbolowym (3%). Robienie roztworów sublimatu rtęciowego i karbolu trzeba uskuteczniać ostrożnie, gdyż są to środki trujące. Po wymyciu rany przykrywa ją się gazą karbolową, jodoformową, ajrolową lub tym podobną, na którą kładzie się grubą warstwę takiejże samej waty i umocowuje bandażem. Opatrunek zmienia się raz na dzień lub rzadziej, stosownie do ilości wydzieliny przyrannej. Watę i gazę kupować w małych ilościach i dobrze zawijać, aby się nie brudziły. Rany mające zagłębienia, podminowane brzegi, poszarpane tkanki, wymagają umiejętnej, fachowej opieki.

IX. **Wrzody.** Opatrunek wrzodów wymaga jeszcze większej pieczołowitości niżli opatrunek czystych, świeżych ran, które zresztą, gdy będą zaniedbane, prędko zamieniają się na wrzody. Leczenie wrzodów polega na ich mechanicznem oczyszczeniu i użyciu środków dezynfekcyjnych, jak przy ranach, a obok tego na zapewnieniu swobodnego odpływu wydzielinie, zapomocą odpowiednich nacięć lub zakładaniu drenów, co już należy poruczyć znawcy. Początkowo, zanim wrzody wydzielać zaczną czystą ropę, roztwory odkażające winny być mocniejsze, stopniowo jednak w miarę oczyszczania się wrzodu i zmniejszania się wydzieliny, należy robić je słabszymi. Sposób doko-

nywania opatrunku jest taki sam, jaki był podany przy ranach. I tutaj najważniejszą rzeczą jest czystość, a wreszcie zażądanie w odpowiednim czasie umiejętnej pomocy.

X. **Gruda u koni.** Jest to złośliwe, uporczywe zapalenie skóry na pęcinach po stronie tylnej. Powstaje ono wskutek nieczystego utrzymania kończyn, delikatności skóry, zaniedbania obtarć i innych uszkodzeń w tych miejscach. Zapobieganie i leczenie: po powrocie zwierzęcia zbłoconego do stajni nogi wymyć wodą i obetrzeć do suchości. Obtarcia i świeżo dopiero powstający wyprysk po obmyciu i osuszeniu przysypywać dwa razy dziennie proszkiem złożonym z 1 cz. bieli cynkowej, 4 części ałunu i 5 części kredy preparowanej. Przy grudzie ropiejącej smarować miejsca opanowane przez wyprysk maścią jodoformową (1 część jodoformu na 10 części waseliny) a po kilku dniach, gdy wytwarzanie ropy się zmniejszy, obmyć wodą z mydłem, osuszyć i posypywać wyżej wskazanym proszkiem. Przy grudzie nieropiejącej, zastarzałej, oprócz proszkowania namaszczać raz na tydzień pęcinę gliceryną. W początkach choroby zwierzę na kilka dni od pracy uwolnić i pozostawić w spokoju. Przy grudzie zastarzałej ruch musi być bardzo ograniczony i to przez dość długi czas. Tak nazwana gruda zgorzelinowa, przy której wypadają obumarłe kawałki skóry, wymaga operacyjnych zabiegów, poruczyć zatem jej leczenie weterynarzowi.

XI. **Ochwat.** Ostre zapalenie mięsnych części kopyta, występujące zwykle nagle na obydwóch przednich lub na wszystkich czterech kończynach, czemu towarzyszy silny ból i kulawizna, nazywamy ochwatem. Powstaje on zwykle wskutek napojenia zimną wodą zgrzanego konia po szybkim ruchu lub wysilonej pracy, wystawienie takiego zwierzęcia na wiatr, przeciągi i t. p. Konia podejrzanego o ochwat winno się przedstawić do zbadania lekarzowi weterynaryjnemu, gdyż choroba ta niedość energicznie leczona ciągnie się długo i pozostawia ślady na całe życie zwierzęcia. Leczenie polega w samym początku na obfitym upuście krwi, następnie zaś na zadaniu środków przeczyszczających (350 - 500 gramów soli glauberskiej), skrapianiu (kilka razy na dzień) całego ciała kamforowym spirytusem i mocnem rozcieraniu (po każdem skropieniu) garściami słomy, szczotkami lub t. p wreszcie na wytrwałych zimnych okładach kopyt. Okłady te najłatwiej uskutecznić w ten sposób, że do oddzielnego stanowiska przywozi się wóz gliny, glinę zarabia wodą i wstawia się doń konia przedniemi lub wszystkiemi czterema kopytami, stosownie do tego, czy tylko przód, czy też i tył był zajęty. Na noc zwierzę przeprowadzić na kilka godzin do suchego stanowiska z obfitą podściółką, aby położywszy się mogło wypocząć. Dyeta początkowo winna być skąpą. Przez cały czas choroby dawać pokarm łatwo strawny.

XII. **Podbitek.** Powstaje on najczęściej przez dostanie się kamyka pomiędzy ramię podkowy a podeszwę rogową. Przy ściskaniu kleszczami lub uderzaniu czemś twardem po podeszwie kopyta powstaje w chwili, gdy ściskamy miejsce nagniecione (znajdujące się najczęściej przy końcu ramion podeszwy obok strzałki), lub uderzaniu po niem — wyraźny ból, który zwierzę zdradza przez wyrywanie nogi lub drganie mięśni. Z początku zapobiega złemu energicznie stosowany zimny okład (obwijanie grubem płótnem i zlewanie po niem zimną wodą, do której włożono

lodu) okład z gliny mieszanej z drobno tłuczonym lodem). Kowale mają zwyczaj, gdy podejrzewają podbitek, wybierać róg z podeszwy głęboko aż do żywego, poszukując ropy. Koń prowadzony z powrotem do domu nabija sobie do ranki ziemi i brudu, skutkiem czego niezadługo powstaje owrzodzenie podeszwy kopytowej, przerzucające się zwykle na chrząstkę kopytową, co pociąga za sobą wielomiesięczną chorobę. Mnóstwo koni w ten sposób się marnuje. Po zdjęciu rogu z miejsca chorego należy kopyta kąpać przez 20 minut w ciepłej wodzie, do której dodano (na pół kubła) dwie łyżki wapna chlorowego (Calcaria chlorata), następnie rankę przemyć 10% roztworem wodnym siarkanu miedzi (Cuprum sulfuricum), zasypać jodoformem, założyć gazę jodoformową i takąż watę, poczem obandażować płócienną obwiązką, szeroką na 10 ctm. a na 2 metry długą, obwinąć w ceratę (jeżeli pod koniem jest mokro) a na wierzch dać wojłok. Opatrunek zmieniać codzień, wyjąwszy kąpiel. Jeżeli ropa zapuszcza się pod róg kopytowy — wezwać pomocy lekarza weterynaryjnego.

XIII. **Nakłucia podeszwy lub strzałki rogowej** gwoździem (nagwoździenie) lub innem jakiem ostrokończystem ciałem są bardzo niebezpieczne, gdyż pociągają za sobą często owrzodzenie kości kopytowej, ścięgna mięśnia zginającego staw kopytowy, zapalenie ropne stawu kopytowego i t. d. Gdy spostrzeże się nakłucie, należy natychmiast ciało raniące z rany wyciągnąć, kopyto obwiązać, aby przez drogę nie nabiło się błota lub kurzu, a po przyprowadzeniu do domu, róg w ścianach otworu nieco wybrać, nogę wykąpać w roztworze wapna chlorowego. Opatrzywszy jak należy (patrz podbitek), konia zaprowadzić do lekarza weterynaryjnego.

XIV. **Gniole strzałki kopytowej.** Choroba polega na tem, że wskutek niedbałego i wilgotnego utrzymywania kopyt, strzałki rogowe gniją, rozpadają się, w rowku strzałkowym żywe tkanki obnażają się, ropieją, spowodowując znaczną kulawiznę. Kopyto takie wydziela z siebie wstrętny odór; zgłębnik wsunięty w rowek strzałkowy, szczególniej w miejscu, gdzie ramiona strzałki przechodzą w piętki, wywołuje ból, wyjęty zaś z rowka jest pokryty ropiastą, mazistą, brudną, cuchnącą cieczą. Takie kopyto przedewszystkiem należy dokładnie oczyścić, gnijący i rozpadający się róg oddzielić, rowki strzałkowe dobrze w głębi oczyścić kawałkami płótna, następnie zrobić kąpiel w roztworze wapna chlorowego (patrz podbitek); po kąpieli rowki osuszyć płótnem i zalawszy 10% roztworem siarkanu miedzi (koperwasu miedzianego v. sinego kamienia) rowki wypełnić mocno watą, gazą lub płótnem w celu rozszerzenia ich. Zalewanie uskuteczniać dwa razy dziennie, dopóki kulawizna nie przejdzie. Przed każdem zalaniem watę z rowka strzałkowego wyjąć. Gdy rowki zostaną rozszerzone, dalszego zakładania watą zaprzestać. Umiarkowany ruch na świeżem powietrzu podczas suchej pogody sprzyja prędkiemu wyleczeniu. Jako środek zapobiegawczy zaleca się czyste utrzymanie kopyt i suche stanowisko.

XV. **O chorobach i wadach zwrotowych czyli ewikcyjnych.** Gdy kto odstępuje drugiemu rzecz jaką pod tytułem obciążającym, natenczas winien jest ewikcyę na to, że rzecz ta ma własności, jakie wyraźnie umówione były, lub jakie zwykle są w niej dorozumiewane,

i że stosownie do natury interesu lub zaszłej umowy użytą być może (§ 922. Księgi ustaw cywil. z r. 1811 cz. II).

Kto zatem przydaje rzeczy własności, jakich nie ma, a które wyraźnie, lub też według natury interesu dorozumiewanie umówionemi były; kto zataja nadzwyczajne wady lub ciężary, kto pozbawia rzecz, która już nie istnieje lub do kogo innego należy, kto fałszywie uznaje, że rzecz do oznaczonego użytku jest zdatną, lub że jest wolną od zwyczajnych wad i ciężarów, ten, gdy pokaże się rzecz przeciwna, jest za to odpowiedzialnym. (§ 923).

Gdy bydle zachoruje lub padnie we dwadzieścia cztery godzin po odebraniu onego, natenczas jest domniemanie, że już przed oddaniem było chore (§ 924).

Uwaga. Domniemanie to rozciąga się na wszystkie zwierzęta, odnosi do wszystkich chorób. Sprzedawcy jednak przysługuje prawo dowieść, że choroba powstała u nowonabywcy.

Okresy zwrotowe dla poszczególnych chorób (§ 925).

Choroba.	Okres zwrotowy.
Wągry	8 dni
Ospa owcza	8 »
Parchy u owiec	8 »
Zołzy podejrzane	15 »
Nosacizna	15 »
Grużlica (choroba gruczołów)	15 »
Dychawica	30 »
Skołowacenie	30 »
Koler czyli wartoglowienie	30 »
Tylczak (nosacizna skórna)	30 »
Narowistość	30 »
Jasna ślepota lub kurza ślepota	30 »
Ślepota miesięczna	30 »
Motylica	2 miesiace
Robaki płucne	2 »

Uwaga. I przy tych chorobach nie jest wykluczony dowód przeciwny, iż wskazana wada powstała rzeczywiście dopiero u kupującego; jednakowoż fakt ten musi udowodnić oskarżony, co tylko przez rzeczoznawców stać się może.

Jednakże ten, kto bydlę odebrał, wtenczas tylko do wzmiankowanego prawnego domniemania (923—925) odwołać się może, gdy oddawcę czyli ewiktora natychmiast o dostrzeżonej wadzie zawiadomi, lub w jego nieobecności sądowi miejscowemu, albo w sztuce biegłym doniesie i o naoczne obejrzenie postara się (§ 926).

Jeżeli odbierający zaniedba tej ostrożności, natenczas do niego należy dowód, że bydlę już przed zawarciem umowy miało wadę. Zawsze jednak może oddawca dowodzić, iż zaskarżona wada dopiero po wydaniu powstała (§ 927).

Jeżeli wady rzeczywiście są widoczne, albo o ciężarach do rzeczy przywiązanych można się z ksiąg publicznych przekonać, natenczas żadna nie należy się ewikcya, wyjąwszy, gdyby wyraźnie danem było zapewnienie, że jest wolną od wszelkich wad i ciężarów (§ 443). Za długi i zaległości rzecz obciążające, zawsze należy się ewikcya (§ 928).

Jeżeli rzeczy oddawane są naogół, to jest tak, jak stoją lub

leżą, bez liczenia, mierzenia lub ważenia, natenczas oddawca nie odpowiada za wady w nich odkryte, chybaby rzecz nie miała jakiej własności, którą albo oddawca fałszywie udawał, albo też odbierający sobie wymówił. Nawet i przy ryczałtowem nabywaniu można żądać poręki, gdyby np. cała trzoda była innej rasy, aniżeli było umówionem (§ 930).

Gdy w interesach obustronnie obowiązujących, strona jedna, ze względu na zwyczajną wartość rzeczy, nie dostaje ani połowy tego od drugiej, co jej dała, natenczas dozwala ustawa stronie pokrzywdzonej żądać zniesienia umowy i przywrócenia do dawnego stanu. Może jednak druga strona utrzymać w całości umowę, ofiarując dołożyć tyle, ile do zwyczajnej wartości brakuje. Niestosunkowość wartości oznacza się według czasu, w którym umowa zawartą została (§ 934).

Wzmiankowany środek prawny niema zastosowania, gdy się go kto zrzekł wyraźnie lub oświadczył, iż ze szczególniejszego upodobania przyjmuje rzecz w nadzwyczajnej wartości, gdy pomimo, że mu prawdziwa wartość wiadomą była, przystał na niestosunkową wartość; gdy ze stosunku osób domniemywać się należy, iż chciałby zawrzeć umowę w części pod tytułem dawnym w części pod tytułem obciążającym; gdy prawdziwej wartości już dojść nie można; nakoniec gdy rzecz sądownie sprzedana była (§ 305, 1059, 1060, 1089, 1268).

XVI. **Oznaczenie wieku zwierząt domowych ssących. a) Koń.** Koń dorosły posiada w każdej szczęce po 3 pary zębów siecznych (1 para \/ przednia, 2 para \/ średnia, 3 para \/ okrajki), razem 12, nadto po jednej parze kłów, i po 6 par zębów trzonowych, razem w obydwóch szczękach zębów 40; klacze kłów zwykle nie posiadają.

z. trzonowe	kły	siekacze	kły	z. trzonowe
6 5 4 3 2 1	—1—	3 2 1 1 2 3	—1—	1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1	—1—	3 2 1 1 2 3	—1—	1 2 3 4 5 6

Rozpoznajemy lata konia głównie po siekaczach.

Siekacze mają na koronie wgłębienia (dołki, rejestry) otoczone wyniosłymi brzegami (przednim i tylnym).


Siekacze, kły i trzy pierwsze pary trzonowych zębów koń zmienia w ciągu pierwszych $2^1/_2$ lat swego życia; zęby te nazywamy mlecznymi, zęby zaś, które na miejsce mlecznych wyrosły, i trzy ostatnie pary trzonowych nazywamy stałymi.

Zmiany, jakie zachodzą na siekaczach, dzielimy na sześć okresów.

Okres I zębów mlecznych. Źrebię rodzi się zwykle z 1 parą przednią siekaczów, między 4-ym a 6-ym tygodniem dostaje drugą parę (średnią), między 5-ym 6-ym a 9-m miesiącem trzecią parę (okrajki). Natychmiast po wyrośnięciu siekaczów brzegi ich się ścierają, dołki stają się coraz płytszymi, wreszcie znikają zupełnie.

U 15 miesięcznego źrebięcia giną dołki na przedniej parze.
U 2 letniego źrebięcia giną dołki i na średniej parze
U $2^1/_2$ letniego źrebięcia giną dołki i na okrajkach.


Okres II zmiany zębów. Po $2^1/_2$ latach od urodzenia wypada przednia para siekaczów mlecznych, a zastępują je siekacze stałe, które w końcu trzeciego roku dorównywują wysokości pozostałym mlecznym.




Ząb sieczny konia widziany w podłużnym przekroju. Przestrzeń wskazana przez linie punktowane (D) nazywa się d o ł k i e m z ę b o w y m lub r e j e s t r e m.




Siekacze konia trzechletniego. Pierwsze pary w obu szczękach stałe, całkowicie wyrosłe. Drugie i trzecie pary jeszcze mleczne.



Siekacze (w dolnej szczęce) u konia 4 letniego. Pierwsza i druga para zębów stałych, na których dołki jeszcze nie starte, trzecia mlecznych, na których dołki już są starte.



Siekacze i kły konia 5 letniego. Wszystkie 3 pary zębów stałych. Dołki jeszcze niestarte na żadnej parze.



Siekacze konia 7 letniego. Wszystkie zęby stałe; na pierwszej i drugiej parze dołki zupełnie starte, i pozostały tylko ślady po nich; na trzeciej parze dołki kończą się ścierać.

Po $3^1/_2$ latach wypada srednia para, a wyrosłe w jej miejsce stałe zęby dorównywują pozostałym w końcu czwartego roku.

Po $4^1/_2$ latach wypadają okrajki, zastępujące je zaś zęby stałe zupełnie wyrastają w końcu piątego roku.

W piątym roku wyrastają u samców kły.

Okres III koron poprzecznie owalnych lub ścierania się dołków.

Koń pięcioletni ma już wszystkie zęby stałe, zarówno siekacze, kły jak i trzonowe.

Powierzchnia koron siekaczów ma wygląd poprzecznie owalny ⬭, który powoli zmienia się od 10 roku życia pokolei, zacząwszy od przedniej pary dolnej szczęki a skończywszy na okrajkach w górnej szczęce w kształt prawie okrągły ◯.

Jednocześnie następuje ścieranie się brzegów i znikanie dołków na koronach.

W końcu 6 roku znika dołek na pierwszej parze siekaczy szczęki dolnej.

W końcu 7 roku znika dołek na drugiej parze siekaczy szczęki dolnej.

W końcu 8 roku znika dołek na trzeciej parze siekaczy szczęki dolnej.

W końcu 9 roku znika dołek na pierwszej parze siekaczy szczęki górnej.

W końcu 10 roku znika dołek na drugiej parze siekaczy szczęki górnej.

W końcu 11 roku znika dołek na trzeciej parze siekaczy szczęki górnej.

Koń dwunastoletni ma starte dołki na wszystkich zębach siecznych, zarówno dolnej szczęki, jak i górnej.

Dalsze określanie wieku jest już niepewne.

Po dwunastu latach występuje:

Okres IV koron okrągłych, które stopniowo przyjmują kształt okrągły ◯, aż do lat 18, poczem zjawia się:

Okres V zębów o koronach trójkątnych △, zmieniający się wreszcie na:

Okres VI koron podłużno owalnych O, trwający do końca życia konia.

b) Bydło rogate. Siekaczy bydło rogate i owce posiadają 4 pary i to w dolnej szczęce; razem 8 siekaczy. (Pierwsza para V przednia, druga para V średnia pierwsza, trzecia para V średnia druga, czwarta para V okrajki), Kłów bydło nie posiada, trzonowych tak samo jak koń po 6 par w obu szczękach; razem bydło rogate posiada 32 zęby.

Trzonowe	Siekacze	Trzonowe
6 5 4 3 2 1 —		— 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 —	— 4 3 2 1 1 2 3 4 —	— 1 2 3 4 5 6

Bydlę rogate rodzi się z siekaczami mlecznymi, lub wyrastają mu one wszystkie w ciągu pierwszych 4 tygodni.

Od 18 do 20 miesięcy zmienia pierwszą parę siekaczy mlecznych na stałe.

Od 2 do $2^1/_2$ lat zmienia drugą parę siekaczy mlecznych na stałe.

Od $2^1/_2$ do 3 lat zmienia trzecią parę siekaczy mlecznych na stałe.

Od $3^1/_2$ do $3^3/_4$ roku zmienia czwartą parę siekaczy mlecznych na stałe.

Po rogach u krów poznaje się wiek w ten sposób, że gładki koniec rogu liczy się za trzy lata a każde obrączkowate wgłębienie (odpowiadające ciężarności) lub odpowiednia przestrzeń na rogu za rok.

c) Owca. Owce mają tyle samo zębów co bydło rogate i tak samo ułożonych. Do 5 tygodni wyrastają wszystkie siekacze mleczne.

Między 12 a 18 miesiącem zmienia się pierwsza para siekaczy mlecznych na stałe.

Między 18 a 24 miesiącem zmienia się druga para siekaczy mlecznych na stałe.

Między 30 a 33 miesiącem zmienia się trzecia para siekaczy mlecznych na stałe.

Między 36 a 45 miesiącem zmienia się czwarta para siekaczy mlecznych na stałe.

d) Świnia. Świnia posiada po 3 pary zębów siecznych w każdej szczęce, razem 12, po jednej parze kłów i po 7 par trzonowych — razem 44 zęby.

Trzonowe	Kły	Siekacze	Kły	Trzonowe
7 6 5 4 3 2 1	—1—	3 2 1 1 2 3	—1—	1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1	—1—	3 2 1 1 2 3	—1—	1 2 3 4 5 6 7

Okrajki mleczne i kły mleczne przynosi z sobą zwierzę na świat.

Między 2 a 4 tygodniem wyrasta pierwsza para siekaczy mlecznych.

Między 6 a 8 tygodniem wyrasta druga para siekaczy mlecznych w dolnej szczęce.

Między 8 a 12 tygodniem wyrasta druga para siekaczy mlecznych w górnej szczęce.

Między 8 a 9 tygodniem następuje zmiana okrajków i kłów mlecznych na stałe.

Między 11 a 13 miesiącem następuje zmiana pierwszej pary siekaczy mlecznych na stałe.

Między 16 a 17 miesiącem następuje zmiana drugiej pary siekaczy mlecznych na stałe w dolnej szczęce.

Między 16 a 18 miesiącem następuje zmiana trzeciej pary siekaczy mlecznych na stałe w górnej szczęce.

Rzecz poglądowo traktująca oznaczenie wieku konia znaleść można w mojej »Tablicy poglądowej do rozpoznawania wieku konia«. Lwów. Cena w redakcyi Przeglądu weterynarskiego 1 kor. 20 hal. za pobraniem.

UWAGI I DATY

Z ADMINISTRACYI GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO.

Ułożył Prof. Dr. Stefan Pawlik.

Zadanie administratora polega w takiem ustosunkowaniu kosztów produkcyi do otrzymanych wartości, czyli dochodu brutto, ażeby mógł uzyskać możliwie największy dochód czysty z danej produkcyi i w danych miejscowych warunkach. System produkcyi w gospodarstwie rolnem i leśnem, w którym małym nakładem w kapitałach i pracy wydobywamy z ziemi mały dochód brutto w stosunku do obszaru, ale wielki dochód czysty w stosunku do wartości ziemi nazywamy *systemem extensywnym* (obszarowym).

System zaś produkcyi, przy którym musimy używać znacznych nakładów kapitału i pracy, ażeby z drogiej ziemi wydobyć wysoki dochód brutto, a stosunkowo niski dochód czysty nazywamy *systemem intenzywnym* (forsownym, nakładowym). Odróżniamy forsę przez kapitał i forsę przez pracę, wreszcie razem wziętą forsę przez kapitał i pracę.

Odróżniamy systemy gospodarcze z przewagą:

I.	II.	III.
produkcyi roślinnej	**produkcyi zwierzęcej**	**produkcyi przemysłowej.**

Gospodarstwo wyda wówczas najwyższy możliwy dochód, jeżeli każda poszczególna gałęź produkcyi sama dla siebie przyniesie najwyższy dochód, względnie dopomoże drugiej do zwiększenia dochodu; ażeby to nastąpiło, potrzeba:

I.	II.	III
takie rośliny uprawiać, które w danych warunkach zapewniają największy dochód;	takie zwierzęta i płody zwierzęce utrzymywać wzgl. produkować, które w danych warunkach agronomicznych i ekonomicznych zapewniają największy dochód:	taki przemysł wprowadzać, który rzeczywiście z I i II produkcyą lub obydwoma jest ściśle związany i służy do ułatwienia a nawet umożliwienia zbytu płodów roślinnych lub zwierzęcych a opiera się na materyałach surowych w gospodarstwie wytwarzanych.

Nie mogąc się wdawać w szczegółowy rozbiór powyżej naszkicowanego podziału, przechodzimy do t. zw. typów organizacyjnych, opierających się na sposobie użytkowania z ziemi ornej i wskutek tego stojących w pewnym związku z uprawianemi roślinami. I tak mówimy n. p. o systemach zbożowych, w których przydzieliliśmy uprawie zbóż przeważną część pól. Typem zbożowego gospodarstwa jest *trójpolówka* z następstwem płodów: 1. ugór, 2. ozimina, 3. jarzyna; *ulepszona, poprawna trójpolówka:* 1. ugór, 2. ozimina, 3. jarzyna, 4. koniczyna, 5. ozimina, 6. jarzyna. *System przemienno-pastwiskowy* jest ten,

w którym po kilku latach uprawy zbożowych następują rośliny pastewne, zajmując połowę obszaru pól. Odróżniamy gospodarstwo *przemienno-pastwiskowe dzikie*, w którem po uprawie zbożowych aż do zmniejszenia plonów pozostawiamy rolę naturalnemu zadarnieniu i uregulowane, gdy z góry pewną ściśle określoną liczbę lat uprawiamy zbożowe rośliny, a następnie obsiewamy rolę koniczyną i trawami. I tak n. p. 1. ugór, 2. ozimina, 3. jarzyna, 4. ozimina, 5. jarzyna z konicz. i trawami, 6. koniczyna z trawami, 7—10 pastwisko. *System płodozmienny* polega na prawidłowej zmianie w następstwie roślin kłosowych i liściastych, ograniczeniu lub wykluczeniu ugoru i t. d. *Czteropolówka norfolcka* jest takim typem: 1. okopowe, 2. jęczmień z konicz., 3. koniczyna, 4. pszenica lub żyto. Wobec tego, że koniczyna czerwona przychodzi na to samo pole w okresie czteroletnim, a więc zawcześnie, odpowiedniejszą będzie ośmiopolówka: 1. okopowe, 2. jęczmień z konicz., 3. koniczyna, 4. pszenica, 5. groch, 6. żyto, 7. wyka, 8. żyto lub pszenica. *Systemem swobodnego gospodarstwa* zowiemy taką formę przedsiębiorstwa, przy której zrzekamy się pewnego ściśle określonego planu, urządzając i kierując rok rocznie przedsiębiorstwem stosownie do chwilowych stosunków gleby, klimatu i ekonomicznych. *System leśno-polowy* polega na połączeniu uprawy lasów i rolnictwa: 1. żyto, owies, hreczka, 2—5. pastwisko, 6—12. las niskopienny. *System stawono-rolny:* 1. Owies, 2. koniczyna, 3. koniczyna, 4. żyto, 5. staw. *Ogniowe* gospodarstwo polega na wypalaniu przestrzeni przeznaczonych do uprawy. *Przemysłowe* gospodarstwo ma znaczną uprawę roślin do przeróbki przeznaczonych: buraki na cukier, ziemniaki na spirytus lub krochmal, rzepak, len, konopie na olej i t. d. I tak n. p. 1. ziemniaki, 2. ziemniaki, 3. groch, 4. żyto, 5. ziemniaki, 6. ziemniaki, 7. jęczmień z koniczyną, 8. koniczyna, 9. pastwisko, 10. ugór, 11. żyto; albo też: 1. buraki cukr., 2. buraki cukr., 3. jęczmień, 4. buraki cukr., 5. ozimina; wreszcie: 1. buraki, 2. jęczmień, 3. koniczyna, 4. ozimina, 5. buraki, 6. jarzyna lub ozimina. *System Schulz-Lupitz* polega na zastosowaiu zielonych nawozów: 1. łubin na zielony pognój, 3. żyto, 3. łubin na siano, 4. żyto, 5. łubin na ziarno, 6. żyto; lub: 1. łubin na zielony pognój, 2. żyto z seradellą na paszę, 2. łubin na siano, 4. żyto, 5. ziemniaki, 6. jarzyna, 7. łubin z mieszanką, 8. mieszanka pastewna. *System z uprawą ścierniskową:* 1. ziemniaki, 2. ozimina, w ścierni turnips, 3. żyto, w ścierni hreczka, 4. jęczmień, w ścierni kukurydza lub wyka na zieloną paszę, W tym wypadku w 4 latach zbieramy 7 plonów. *Każdy z tych systemów nie może być wszędzie z równą korzyścią stosowany:* korzyści z gospodarstwa są właśnie wynikiem rozumnego wyboru systemu, odpowiadającego danym warunkom ekonomicznym i przyrodniczym gospodarstwa. Jedynie umiejętne kierownictwo gospodarstwa przy odpowiednim planie uprawy roślin i z nim związanej produkcyi zwierzęcej i przemysłowej może zapewnić trwały, możliwie najwyższy dochód czysty, co jest celem każdego gospodarstwa.

Zapisywanie, zebranie i systematyczne zestawienie w liczbach wszelkich danych, odnoszących się do stanu przedsiębiorstwa wiejskiego i czynności w niem dokonanych w pewnym oznaczonym okresie czasu zowiemy rachunkowością. Ma ona wykazać, czy stan przedsiębiorstwa był korzystnym lub nie, czy czynności odpowiadały celowi przedsiębiorstwa czy też nie. Rozróżniamy

głównie dwie metody rachunkowości: *a) pojedyncza* i *b) podwójna*. Każda będzie dobrą tylko wówczas, jeśli będzie się opierała na faktach, a nie na liczbach urojonych. W pojedynczej wszystko *raz tylko* się zapisuje, w podwójnej każdy interes, każda sprawa i każda osoba, z którą mamy rachunki, ma dwa t. zw. *konta*, w których zapisano, co nam wzięto, a co nam za to dano, co pewien interes kosztował, a co dał dochodu itp. Wszystkie zmiany majątkowe zapisujemy w odpowiednich *księgach;* księgi mogą być albo *szczegółowe* albo *zbiorowe*. W pierwszych notujemy na razie kolejno wszelkie zmiany dotyczące poszczególnych części składowych przedsiębiorstwa, w drugich systematycznie zestawiamy je zbiorowo celem ułatwienia poglądu na ogół stanu przedsiębiorstwa. Księgi szczegółowe dzielą się na: *a) dzienniki* i *b) księgi pomocnicze.* Do ksiąg zbiorowych zaliczamy: *a)* księgi inwentarzy, *b)* księgi porachunków osobistych, *c)* zbiornik, *d)* księgi główne i *e)* księgi bilansów. Urządzenie tych ksiąg, a więc i sposób prowadzenia będą różne, stosownie do metody rachunkowej, jaką obierzemy. *Ilość zaś ksiąg stosować należy* do rozmiaru i składu przedsiębiorstwa, do ważności poszczególnych gałęzi przedsiębiorstwa, zadań, jakie rachunkowości postawimy, i sił, jakiemi w celu prowadzenia rachunków rozporządzamy. *Sprawdzenie rachunków* odbywa się w 2 kierunkach: ze względu na formalną stronę rachunków, co nazywamy *rewizyą rachunkową*, i z uwagi na treść rachunków, albo odpowiednio co do rzeczy samej użycie składników majątkowych, co *rewizyą przedsiębiorstwa* nazwać można. Wyniki rachunków odpowiednio prowadzonej rachunkowości powinny być kamieniem probierczym dobrej organizacyi przedsiębiorstwa i stanowić podstawę do naprawy jej w danym wypadku.

Potrzebną ilość stałej czeladzi łatwo obliczyć każdorazowo dla danego gospodarstwa. Znając liczbę inwentarza pociągowego i użytkowego oraz skład tegoż i znając ilość osób w domowem gospodarstwie zatrudnionych, z łatwością wypośrodkować możemy liczbę stałych służących. Jako wskazówkę podajemy poniższe zestawienie:

Liczymy	Na jednego parobka przy żywieniu na stajni	Na pastwisku	Na jedną dziewkę przy żywieniu na stajni
Wołów roboczych	12—16	—	—
» opasowych	10—14	—	—
Krów mlecznych z dojeniem	12—16	—	10—12
» » bez dojenia	18—20	30—40	14—18
Jałownika	18—24	—	14—20
Owiec	240—300	300—400	—
Świń rozpłodowych	12—18	—	12—15
» opasowych	18—30	—	—
» różnego wieku	30—40	80	—

Do każdych 4-ch koni roboczych wystarcza jeden parobek; do 8 wołów rob. jeden wolarz.

Do usługi domowej na 2—12 osób prócz gospodyni lub kucharki jedna dziewka do pomocy.

Wskazówka dla oszacowania dochodu czystego z całego majątku ziemskiego.

A. **Szacowania gruntów pod kulturę rolną przeznaczonych.**

I. *Informacya.* 1. Położenie ogólne i miejscowe majątku, klimat, stosunki wodne. 2. Składowe części majątku: role orne, łąki, pastwiska, ogrody, stawy i inne użytki. 3. Zaokrąglenie lub rozkawałkowanie i średnie oddalenie składowych części majątku. 4. Szczegółowa bonitacya gruntów różnego użytku. 5. Budynki gospodarskie, ich stan i t. p., studnie, drogi. 6. Stosunki robotnicze, przeciętne ceny robocizny. 7. Stosunki handlowe, jak miejsca zbytu, oddalenie targów, odległość, łatwość komunikacyi i koszt. Przeciętne ceny targowe. 8. Zakłady przemysłowe połączone z gospodarstwem rolnem lub wywierające wpływ na nie. 9. Ciężary i daniny przywiązane do majątku. 10. Kontrakty kupna i sprzedaży.

II. *Plan gospodarski.* 1. Zmianowanie roślin i rozmiary ich uprawy; stosunek roślin handlowych do pastewnych. 2. Sposób uprawy roślin w gospodarstwie produkowanych. 3. Jakość i siła nawozowa. 4. Potrzebna ilość i koszt inwentarza roboczego; potrzebna ilość inwentarza dochodowego. 5. Potrzebna ilość i koszt inwentarza martwego. 6. Potrzebna ilość i koszt robocizny ręcznej najętej. 7. Ilość i koszt robocizny czeladnej. 8. Ilość i koszt organów administracyjnych.

III. *Oznaczenie ilości i jakości płodów.* 1. Plony roślin handlowych i pastewnych w ziarnie, słomie, sianie, głąbiach i t. d. 4. Płody otrzymywane ze zwierząt gospodarskich: mleko, mięso, wełna i t. p.

IV. *Oznaczenie przychodu brutto:* 1. z roli, 2. z łąk, 3. z pastwisk, 4. z ogrodów, 5. z innych użytków. Słoma, plewy i inne odpadki tudzież nawóz nie szacują się ani w przychodzie ani w nakładach jako produkta uboczne na miejscu dalej przerabiane.

V. *Oznaczenie kosztów produkcyi:* 1. Koszty budynków, 2. Koszty inwentarza martwego. 3. Koszty inwentarza żywego roboczego i użytkowego. 4. Koszty robocizny najętej. 5. Koszty utrzymywanej czeladzi. 6. Koszty utrzymywania organów administracyjnych. 7. Koszty przykupnych nasion, nawozów i t. p. 8. Koszty ogólne administracyjne. 9. Podatki i daniny. 10. Asekuracya.

VI. *Zestawienie dochodu czystego.* Porównanie dochodu brutto z kosztami produkcyi.

VII. *Oznaczenie stosunku procentowego* między przeciętnym średnim dochodem czystym a wartością kapitałową majątku a stąd:

VIII. *Prawdopodobna wartość kapitałowa majątku* z wyszczególnieniem 1. prawdopodobnej wartości budowli gospodarskich, a względnie koszty ich uzupełnienia lub doprowadzenia do stanu użytkowego, 2. prawdopodobna wartość melioracyi stałych do gruntu przywiązanych.

B. **Lasy należące do szacowanego majątku** ocenia się w regule osobno. Operat do taksacyi lasów obejmować powinien podobnie jak powyższy: 1. Część informacyjną: *a)* bonitacya, *b)* rodzaj i stan zadrzewienia, *c)* stosunki handlowe, *d)* zakłady przemysłowe i t. d. 2. Plan gospodarski, sposób i koszt exploatacyi. 3. Oznaczenie przeciętnego przychodu brutto. 4. Oznaczenie kosztów produkcyi. 5. Zestawienie normalnego dochodu czystego. 6. Oznaczenie prawdopodobnej: *a)* wartości ziemi, *b)* zapasów drzewa, *c)* zakładów przemysłowych.

Wskazówki do obliczania robót sprzężajnych i ręcznych.

a. Roboty sprzężajne.

Rodzaj pracy lub wyszczególnienie narzędzi i machin Uwaga: K. oznacza konie, W. woły.	W 12 godzinach można wykonać hektarów od do	W 12 godzinach można wykonać morgów od do
I. Uprawa ziemi i nawożenie.		
Orka płaska lub do średniej głębokości do 25 cm. (2 K.)	0.50	0.9
Orka głęboka 25—30 cm. (2 K.)	0.30	0.5
Orka do pełnej głębokości 35 cm. (4 K.)	0.30—0.50	0.5—0.9
Podór ścierniska 6—10 cm. głęboko (2 K.)	0.30—0.70	0.5—1.2
» koniczyska (2 K.)	0.30—0.50	0.5—0.9
Podorywka lekka pługiem	0.75—1.10	1.3—1.9
Radlonka 18—20 cm. głęboko (2 K.)	0.40—0.50	0.7—0.9
Extyrpatorowanie 7—9 radlic	0.60—2.25	1.0—3.9
Gruberowanie 20—25 cm. głęboko (4 K.)	1.50—2.00	2.6—3.5
Lekka brona na średnio zwięzłej glebie (2 K.)	2.10—2.75	3.7—4.8
» » » piasczystej glebie (2 K.)	2.80—3.60	5.0—6.2
Brona sprężynowa (4 K.)	3.5—4.0	6—7
» podpleciona	3.00—5.00	5.2—8.7
Wałek gładki (2 K.)	3.00—4.50	5.2—7.8
» pierścieniowy (4 K.)	5.00—8.00	9.0—14.0
» ciężki do kruszenia brył (Croskilla) (4 K.)	3.50—4.00	6.1—7.0
Znacznik Jordana (2 K.)	1.30—1.80	2.2—3.1
Pielnik pojedynczy (1 K.)	1.00—1.70	1.7—3.0
» podwójny (1 K.)	1.25—1.60	2.2—2.8
» kilkorzędowy (2 K.)	3.00—4.00	5.2—7.0
Obsypnik (1 K.)	1.00—1.30	1.7—2.2
Pług parowy do głębokości 35 cm.	3.00—4.50	5.2—7.8
» » » » 20—25 cm.	4.50—7.00	7.8—12.0
Gruber » » » 35—40 cm.	4.50—7.00	7.8—12.0
» » » » 18—25 cm.	7.50—10.00	13.0—17.0
Brona parowa	9.00—12.00	15.6—2.1
Siewnik do rozrzucania nawozów pomocniczych 2 m. szer.	3.00—4.00	5.2—7.0
Siewnik do rozrzucania nawozów pomocniczych 2.5 m. szer.	4.00—5.00	7.0—9.0
Wywózka gnoju stajennego (2 K.) na przeprząg (stos. do odległości) 8—10 wozów	0.35—0.50	0.6—0.9
2. Slew.		
Siewnik szerokorzutny (2 K.) szer. 4 m.	9.00—10.00	15.6—17.0
» rzędowy (2 K.) szer. 2 m.	4.00—4.50	7.0—7.8
» » (»), » 2 » przy wprawnych robotnikach	5.50	9.6
» taczkowy do koniczyn (1 K.)	8.00—10.00	14.0—17.0
Przykrywanie siewu broną	2.00—2.75	3.5—4.8
» » extyrpatorem	1.75—2.30	3.0—4.0
» » pługiem wieloskibowym zależy od ilości skib i zaprzęgu	—	—

Rodzaj pracy lub wyszczególnienie narzędzi i machin Uwaga: K. oznacza konie, W. woły.	W 12 godzinach można wykonać	
	hektarów od do	morgów od do
3. Roboty żniwne.		
Kośba kosiarką traw (2 K.)	3.50—4.00	6.8—7.0
» żniwiarką (największa wydatność przy przeprzęgu 6 ha) 2 K. na zmianę	3.5—4.0	6.1—7.0
Kośba żniwiarką samowiązałką	3.5—4.0	6.1—7.0
Przetrząsacz do siana (1—2 K.)	3.00—4.00	5.2—7.0
Grabienie ścierniska (1 K.)	5.00—6.50	8.7—1.3
» siana (1 K.)	3.00—4.50	5.2—8.8
Wyradlanie ziemniaków (3 K.)	1.20—1.75	2.1—3.0
» buraków (4 K.)	do 2.00	do 3.5
Kartoflarka z 12 ludźmi do zbierania ziemn. wykopie	1.00—1.25	1.7—2.2
Zwózka zboża na przeprząg przy dostat. liczbie ludzi do nakładania i zrzucania w miarę odległości 7—11 wozów (2 K.)	—	—
Zwózka siana (2 K.) 6—10 wozów	—	—
» potrawu (2 K.) 4—8 »	—	—

Prace, do których używamy wołów, są około 25% mniej wydatne.

Wydatek pracy sprzężaju konnego, względnie wołów, zależy od indywidualności zwierząt, a nadto od wielu czynników, ułatwiających lub utrudniających robotę, np. przy wszystkich robotach w roli, spoistość tejże ma wielkie znaczenie.

Ustanowienie odpowiedniej ilości inwentarza roboczego wpływa pośrednio na zwiększenie dochodu z gospodarstwa. Za mały inwentarz roboczy nie dozwala na prawidłowe wykonanie upraw i czynności wszelkiego rodzaju, za wielki obciąża, względnie podnosi wydatek na robociznę. *Ilość utrzymywanego inwentarza roboczego zależy: a)* od obszaru i sposobu użytkowania ziemi ornej; *b)* od spoistości ziemi ornej; *c)* od warunków klimatycznych, a zwłaszcza długości okresu robót; *d)* od odległości gruntów od zabudowań t. j. folwarku; *e)* od figury pól, ich rozpołożenia i rozrzucenia parcel; *f)* od stanu środków komunikacyjnych tak wewnątrz gospodarstwa jakoteż i do miejsc zbytu; *g)* od organizacyj polowego gospodarstwa; *h)* od łatwości donajęcia siły sprzężajnej w okresach robót.

Okres wiosenny trwa od rozpoczęcia robót polowych do ukończenia zasiewów wiosennych i w klimacie sprzyjającym wynosi 60—65 dni, w niesprzyjającym 45—50 dni; *okres jesienny* od 20-go sierpnia do pierwszych mrozów 70—75 dni, w niesprzyjającym klimacie 50—60 dni.

Utrzymujemy w gospodarstwach

intenzywnych	1 konia na	10—16 morgów
średnio intenzywnych	1 » »	12—20 »
extenzywnych	1 » »	18—27 »

Uwaga. Liczby podane w tablicy na 371 i 372 odnoszą się do wykonanej pracy przez dorosłych męskich i żeńskich robotników jako dziennych najemników — w akordzie pracując wykonają o $^1/_4$—$^1/_3$ więcej.

b. Roboty ręczne.

Wyszczególnienie rodzaju pracy	W 12 godzinach wykona pracę w hektarach		Na hektar potrzeba przeto		W 12 godzinach wykona pracę w morgach		Na mórg potrzeba przeto	
	robotnik		robotników		robotnik		robotników	
	męski	żeński	męskich	żeńsk.	męski	żeński	męskich	żeńsk.
1. Przy uprawie zbożowych roślin.								
Siew zboża ozimego	4—5	3—4	0.25—0.20	0.25	7—8.7	7.0	0.15—0.10	0.2
» » jarego	3.8—4.5	3.5	0.28—0.22	0.30	6.6—7.8	6.0	0.17—0.13	0.17
Kośba kosą zboża	0.5—0.6	—	2—1.6	—	0.9—1.0	—	1.1—0.9	—
Wiązanie zboża za kosą	—	0.5—0.6	—	1.6—2.0	—	0.9—1.0	—	0.9—1.1
Żęcie sierpem zboża	—	0.07—0.12	—	8—12	—	0.12—0.21	—	4.6—7.0
» » rzepaku	—	0.10—0.20	—	10—5	—	0.17—0.35	—	6.0—8.0
Przewracanie garści pokosów	—	2—2.5	—	0.5—0.4	—	3.5—4.3	—	0.3—0.2
Zagrabianie ścierniska	1—2	1—2	1—0.5	1—0.5	1.7—3.5	1.7—3.5	0.6—0.3	0.6—0.3
Podawanie i składanie zboża w snopie. 3 męskich i 3 żeńsk. robotn. podadzą i złożą dziennie 20 wozów. Licząc 5 wozów z ha potrzeba oprócz fornala	—	—	0.60	0.60	—	—	0.3	0.3
Młocka cepem zboża stosownie do więźby snopków 15—20	—	—	—	—	—	—	—	—
Młocka cepem zboża często bywa wykonywaną w akordzie								
Kośba strączkowych roślin (kosą)	0.25—0.40	—	2.7—4.0	—	0.4—0.7	—	1.5—2.3	—
2. Przy uprawie okopowych roślin.								
Sadzenie ziemniak. za pługiem	—	0.15—0.20	—	5—7	—	0.25—0.35	—	3—4
» buraków	—	0.08—0.12	—	8—12	—	0.14—0.20	—	5—7
Flancowanie (sadzonek)	—	0.04—0.06	—	16—24	—	0.07—0.10	—	9—14
Przerywanie buraków	—	0.05—0.06	—	16—20	—	0.09—0.10	—	9—11
Motyczenie ziemniak. lub burak.	—	0.06—0.08	—	12—16	—	0.10—0.14	—	7—9
Kopanie ziemniaków	—	0.03—0.04	—	24—32	—	0.05—0.07	—	14—18
Zbieranie ziemniak. za pługiem lub kartoflarką	—	0.02—0.06	—	16—50	—	0.03—0.10	—	9—29

Wyszczególnienie rodzaju pracy	W 12 godzinach wykona pracę w hektarach		Na hektar potrzeba przeto		W 12 godzinach wykona pracę w morgach		Na mórg potrzeba przeto	
	robotnik		robotników		robotnik		robotników	
	męski	żeński	męskich	żeńsk.	męski	żeński	męskich	żeńsk.
Kopanie buraków	—	0.06—0.08	—	12—18	—	0.10—0.14	—	7—11
Ładowanie ziemniaków lub buraków na wozy i składanie w kopce przy średnim plonie	—	—	2	2	—	—	1.2	1.2
3. Przy uprawie pastewnych roślin.								
Siew koniczyn lub traw	2.5—3.0	—	0.4	—	4—5	—	0.2	—
Kośba koniczyny	0.46—0.6	—	2.2—1.7	—	0.8—1.0	—	1.3—1.0	—
» traw (łąk)	0.28—0.5	—	2.0—3.6	—	0.5—0.9	—	1.2—2.1	—
Suszenie koniczów i traw wymaga bardzo różnej siły roboczej zależnie od stanu roślinności, metody susz. i stanu pogody; przeciętnie liczymy	—	0.06—0.10	—	10—16	—	0.10—0.17	—	6—10
Podawanie siana na wóz i skład.; dla 20 wozów 3 męsk. i 3 żeńsk. robotn. nadto fornal, jeśli plon mamy 5 wozów z ha, wówczas potrzeba	—	—	0.75	0.75	—	—	0.4	0.4
4. Różne roboty.								
Nakładanie nawozu. 1 robotnik nałoży dziennie 7—8 wozów po 10 q, przeciętnie 75 q. Jeśli na hektar dajemy 300 q, wówczas potrzeba	—	—	4	—	—	—	2.3	—
Jeden robotnik żeński rozrzuci tyle, co nałoży męski, przy powyższym przykładzie	—	—	—	4	—	—	—	2.0
Zagrabyw. nawozu za pługiem	—	0.4—0.5	—	2—2.5	—	0.7—0.9	—	1—1.4

TABELKA POMOCNICZA DO WYPŁAT.

Dni	PŁACA 0,24	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	0,90
1	0,24	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	0,90
2	0,48	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,50	1,60	1,80
3	0,72	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,25	2,40	2,70
4	0,96	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,00	3,20	3,60
5	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,50
6	1,44	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,50	4,80	5,40
7	1,68	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,25	5,60	6,30
8	1,92	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,00	6,40	7,20
9	2,16	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	6,75	7,20	8,10
10	2,40	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,50	8,00	9,00
11	2,64	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70	8,25	8,80	9,90
12	2,88	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,00	9,60	10,80
13	3,12	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	9,75	10,40	11,70
14	3,36	4,20	5,60	7,00	8,40	9,80	10,50	11,20	12,60
1/2	0,12	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,38	0,40	0,45
3/4	0,18	0,22	0,30	0,38	0,45	0,52	0,56	0,60	0,68

Dni	PŁACA 1,10	1,20	1,25	1,30	1,40	1,50
1	1,10	1,20	1,25	1,30	1,40	1,50
2	2,20	2,40	2,50	2,60	2,80	3,00
3	3,30	3,60	3,75	3,90	4,20	4,50
4	4,40	4,80	5,00	5,20	5,60	6,00
5	5,50	6,00	6,25	6,50	7,00	7,50
6	6,60	7,20	7,50	7,80	8,40	9,00
7	7,70	8,40	8,75	9,10	9,80	10,50
8	8,80	9,60	10,00	10,40	11,20	12,00
9	9,90	10,80	11,25	11,70	12,60	13,50
10	11,00	12,00	12,50	13,00	14,00	15,00
11	12,10	13,20	13,75	14,30	15,40	16,50
12	13,20	14,40	15,00	15,60	16,80	18,00
13	14,30	15,60	16,25	16,90	18,20	19,50
14	15,40	16,80	17,50	18,20	19,60	21,00
1/2	0,55	0,60	0,62	0,65	0,70	0,75
3/4	0,82	0,90	0,94	0,98	1,05	1,12

Dni	PŁACA 1,60	1,70	1,75	1,80	1,90
1	1,60	1,70	1,75	1,80	1,90
2	3,20	3,40	3,50	3,60	3,80
3	4,80	5,10	5,25	5,40	5,70
4	6,40	6,80	7,00	7,20	7,60
5	8,00	8,50	8,75	9,00	9,50
6	9,60	10,20	10,50	10,80	11,40
7	11,20	11,90	12,25	12,60	13,30
8	12,80	13,60	14,00	14,40	15,20
9	14,40	15,30	15,75	16,20	17,10
10	16,00	17,00	17,50	18,00	19,00
11	17,60	18,70	19,25	19,80	20,90
12	19,20	20,40	21,00	21,60	22,80
13	20,80	22,10	22,75	23,40	24,70
14	22,40	23,80	24,50	25,20	26,60
1/2	0,80	0,85	0,88	0,90	0,95
3/4	1,20	1,28	1,31	1,35	1,42

Obliczenie dla płacy po 12, 15, 20 gr. przeprowadza się według rubryk 24, 30, 40, dzieląc odpowiednie liczby przez 2.

Roboty akordowe.

Przez robociznę na wymiar, akordową, rozumiemy wynagrodzenie w stosunku do wykonanej pracy np. kośbę za mórg, hektar, wykopanie 1 q. buraków, wybranie 1 m^3 rowu i t. p. Stosować je należy przedewszystkiem w miejscowościach, gdzie brak robotnika, gdzie teuże na kilka godzin dziennie przychodzi, wogóle zaś *przy wszystkich robotach w gospodarstwie,* które dadzą się *po wykonaniu skontrolować nie tylko z uwagi na ilość ale i jakość wykonanej pracy.* Z obszerniejszem zastosowaniem pracy akordowej wzrastają wyniki z gospodarstwa wiejskiego, a zatem osiągamy i wyższe dochody. Za podstawę do obrachunku należy brać o ile możności wagę (ctn. metr.), lub miarę (mórg, hektar, metr b. metr^3), wreszcie sztuki, kopy lub setki (np. przy powrósłach, snopkach, strzyży owiec i t. p.).

W akordzie wykona męski robotnik dziennie w 12 godzinach:

uwiąże powrósel	12—20 kóp
wyszyje snopków przy dobrym podawaczu	10 »
omłóci zboża cepami	15—20 snopków
namierzy zboża	40—50 q.
przeszufluje zboża	50—60 q.
ustawi zboża ozimego w półkopki .	8—10 kóp
przebierze ziemniaków	7—10 hl.
ukraje ziemniaków do sadzenia . .	5—7 hl.
naładuje ziemniaków na wozy . . .	30—40 q.
» buraków na wozy	40—55 q.
rozrzuci kretowizn na łące	0.9—1.5 ha — 1.6—2.6 morga
» świeżego pokosu na łące .	1—1.4 ha — 1.7—2.5 »
wywiąże siana w porcye	6—8 q.
ustawi tyczek chmielowych	3—6 kóp
odkryje chmielu	4—5 »
zakończy i opali tyczek	4—5 »
wytyczkuje chmielu	10—12 »
rozniesie tyk chmielowych	5—6 »
obierze chmielu	8—12 ćwiatek
naładuje w wańtuchy chmielu . . .	1.5—2.5 q.
zastruga kołków do drzewek	60—70 sztuk
ukopie dołków do drzewek	12—15 »
ostrzyże owiec	25—30 »
wymyje owiec	16—20 »
urąbie drzewa opałowego	2.5 m^3
ukopie gliny w cegielni	6—7 m^3

Cen jednostkowych robót akordowych nie podajemy, należy je normować na podstawie prac wykonanych na dniówkę pod dobrym dozorem. Ceny jednostkowe przy poszczególnych pracach zmieniać się muszą w miarę plonu, np. przy ziemniakach, burakach, zbożu i t. d., nadto miejscowe warunki robocizny rozstrzygają o wysokości wynagrodzenia.

Zestawienie płacy i wymiaru robót drenarskich

według inż. J. E. Blautha.

Rodzaj roboty	Cena jednostki			Wymiar roboty na dzień			Robotników średnio	Zarobek średni dzienny	Koszta na mórg | hektar średnio odstęp 12 m. 20% dren. zbierających			
	minim.	maxim.	średnio	minim.	maxim.	średnio						
	groszy			m. b.				K.	K.	g.	K.	g.
	m³			m³								
Wykop rowu odpływowego	16	24	20	3	12	6	16	1.20	—	—	—	—
	jeden m. b.			m. b.								
Wykop drenów zbierających	7	14	10	16	50	28	20	2.80	9	60	16	60
	jeden m. b.			m. b.								
Wykop drenów ssących	3	14	6.5	20	160	34		2.21	24	96	43	18
	jeden m. b.			m. b.								
Ułożenie drenu zbierającego	1.5	4	3	40	200	80	1	2.40	2	88	4	98
	jeden m. b.			m. b.								
Ułożenie drenu ssącego	1.5	3	2	60	480	164	3	3.28	7	68	13	28
	jeden m. b.			m. b.								
Zasypanie drenów zbier. i ssących	$^2/_3$	1.5	1	25	200	90	8	0.90	4	80	8	30
	za dzień											
Dniówka piesza	30	200	70	—	—	—	5	0.70	49	92	86	34

Wydatność pracy narzędzi i machin gospodarskich.

Wyszczególnienie machin	Wykonują w 1 godzinie
Młocarnia kieratowa (2 k.) wymłaca zboża w słomie wagi	500 kg.
Młocarnia parowa z przyrządem oczyszczającym i wialnią zboża ozimego	
(bęben 152 cm.)	5000 kg.
(bęben 137 cm.)	4000 kg.

Wyszczególnienie machin	Wykonują w 1 godzinie
Obłuskiwacz pojedyn. do kukurydzy .	3 hl.
» podwójny » .	8—10 hl.
Tryer stósownie do wielkości oczyszcza zboża jednolitego	$1^1/_2$—7 hl.
Tryer stosownie do wielkości oczyszcza zboża zmieszanego	$^3/_4$—$3^1/_2$ hl.
Młynek rafkowy sortujący »Ideal« . .	7—25 q.
» » » »Tryumf« .	20—40 hl.
Wirówka do oddziel. chwastów Kaysera	5—10 hl.
» » » z tryerem	4—10 hl.
»Cuscuta« dla oddzielenia kanianki . .	5—20 q.
Sieczkarnia »Germania« użyna sieczki 10—25 mm. długiej	330—660 kg.
Sieczkarnia o 4 nożach »Lassa et Co« .	20—30 q.
Szrótownik »Planet« Eckerta ręczny .	$1^1/_2$—3 kg.
2—4 konny .	2—10 kg.
motorowy .	15—25 kg.
Szrótownik »Saksonia« 1—4 konny . .	450—1300 kg.
»Excelsior« podwójny 2—3 konny . . .	90—120—150—200 kg.
ręczny	20—40 kg.
3—12 konny . .	800—900—1400—1600 kg.
Młynek »Rapid« Bamforda (1—6 konny)	100—1100 kg.
Gniotownik (owsa, żyta, jęczmienia) stosownie do wielkości, poruszany kieratem	3.5—7.5 hl.
poruszany siłą pary . .	5—10 hl.
Gniotownik mały z wałkami o przekroju 40—60 cm.	40—100 kg.
Krajacz-szarpacz do buraków »Gardera« ręczny	400—700 kg.
Krajacz-szarpacz »Bentalla«	8 hl
Rozdrabniacz do makuchów ręczny . .	150 kg.
» » maszyn. .	400 kg.
Sortownik do ziemniaków	20 hl.
Prasy do słomy, siana i karmy:	**dziennie:**
ręczna Eckerta daje 75—40 pniaków po 60—120 kg.	580—800 kg.
kieratowa Böhmera daje 84—96 pniaków po 90—100 kg.	560—700 kg.
do motorów parowych zastósowana .	250—350 q.
Machiny i przyrządy mleczarskie:	**w godzinie:**
Wirówka Lefeldt M. B. E.	50—100 litr.
» » S. X.	100—300 »
» Lanza	70—525 »
» »Kronen Separat.« Eckerta	40—125 »
» »Alfa Colibri« Bergedorf .	125 l.
» »Alfa Baby« » .	250 l.
» »Alfa B.« » .	450 l.
Gniotownik do masła (duński) Bergedorf	30—250 kg.

Ładunek na wóz fornalski

zależy od wielkości i wytrzymałości wozu, względnie od siły pociągowej i stanu drogi. Na t. z. wóz średniej wielkości przyjmujemy następujące ładunki:

zboża różnego w ziarnie	od	8—12 q.
mąki, szrótu i t. p.	»	11—14 q.
buraków, ziemniaków i t. p.	»	10—12 q.
nawozu stajennego	»	5—10 q.
ziemi, stawarki	»	8—11 q.
gnojówki	»	9—12 q.
gontów	»	50—70 kóp.
cegły palonej	»	200—300 sztuk.
drzewa opał. metr. kubicznych	»	2—2.5 q.
węgla	»	12—18 q.
siana	»	6—8 q.
zboża w snopie zależnie od więźby	»	100—180 snopów.

Według Reinhardta potrzeba siły do pociągnięcia wozu wagi 1051 kg., obciążonego ładunkiem 1680 kg.:

	na szosie	na ściernі
	112 kg.	368 kg.
ciężar na przedniej osi	100%	100%
» równo rozłożony	96.8%	81.2%
» na tylnej osi	82.4%	89.2%
zaprzęgnięcie:		
pod dyszlem krótkie postronki	89.6%	96.0%
» » długie »	100.0%	100.0%
za koniec dyszla	—	109.0%

Objętość ładunku I wagonu (10.000 kg.) niektórych materyałów.

1 wagon	zajmuje przestrzeni	
Cegieł zwykłych	6.7—7.3	m^3
» mocno wypalonych	5.6—6.3	»
Iłu suchego	5.6	»
Iłu mokrego	5.0	»
Koksu	18.9—30.3	»
Piasku rzecznego wilgotnego	5.7	»
Torfu wysuszonego na powietrzu	24.4—30.8	»
» mokrego	15.4 . 18.2	»
Węgla brunatnego	12.8—15.4	»
» kamiennego	11.8—14.3	»
» z miękkiego drzewa	66.7	»
» z twardego drzewa	45.5	»
Żwiru rzecznego suchego	3.7—4.3	»
» » mokrego	3.5—4.0	»

Koszty naprawy i amortyzacya narzędzi i machin.

Zależą od swego przeznaczenia, rodzaju i sposobu obsługi i użycia, starania w utrzymywaniu i przechowywaniu i od materyału i wykonania narzędzi lub machiny. Poniżej podajemy przeciętne liczby w procentach od wartości nowych narzędzi i t. p.

Wyszczególnienie machin	Koszta naprawy w %	Amortyzacya (zużycie) w %	Razem w %
	z ceny kupna nowego narzędzia lub machiny		
Wozy wszelkiego rodzaju	10—15	5—10	20
Pługi (żelaznej konstrukcyi)	5—10	5—10	15
Podskibniki, obsypniki i t. p.	15—20	5—10	25
Pługi (drewn.)	20—25	10—15	35
Brony drewniane	20—35	10—15	40
» żelazne	10—15	5—7	18
Wałki drewniane	8—10	5—8	15
» żelazne	4—6	5—6	10
Siewniki	10—15	5—10	20
Sieczkarnie, szarpacze	10—15	5—7	18
Młocarnie kieratowe, młynki i t. p. . .	10—15	5—10	20
Kosiarki, żniwiarki	15—20	8—12	25
Uprząż końska lub wolarska	20—30	5—10	35
Drobny inwentarz stajenny i t. p. . . .	15—30	10—15	30
Wózki	20—30	10—20	40
Narzędzia ręczne	15—20	30—35	45
Średnio:	16%	6—10%	

Koszty naprawy, utrzymania i amortyzacya budynków gospodarskich.

Wszystkie budynki gospodarskie należy tak urządzić, by przy jak najmniejszym koszcie jak najdokładniej odpowiadały celowi, do którego są przeznaczone. Uwzględnić wygodę i piękność wewnętrzną i zewnętrzną budowli o tyle, o ile takowa nie wymaga większych nakładów i kosztów utrzymania. Starać się należy utrzymać jak największą trwałość, a stąd i najmniejsze koszta utrzymania przez staranny dobór materyałów, dobre wykonanie, dobre rozpołożenie i t. p. Zastosować rozmiary budynków do rzeczywistej potrzeby. O rozmiarach poucza tabelka na str. 379. Koszty ogółem zabudowań składają się z następujących pozycyi: 1) procentu od kapitału budowlanego, 2) ryzyka względnie asekuracyi od ognia, 3) amortyzacyi (w stosunku do trwania budynków) i 4) kosztów utrzymania, naprawy i t. p. Te ostatnie wynoszą:

dla budynków trwałych mieszkalnych i spichrzów $^1/_2$—1% wartości do ubezp. od ognia podanej,

dla budynków lekkich mieszkaln. i spichrzów $^3/_4$—$1^1/_4$ wartości do ubezp. od ognia podanej,

dla stajen trwałych 1—$1^1/_2$% wart. do ubezp. od ognia podanej.

» » lekkich $1^1/_2$—2% » » » » » .

Amortyzacya wynosi stosownie do przeznaczenia budynku i materyału i t. p. od 5—10%.

Rozmiary budynków gospodarskich.

Rodzaj budynków	Długość	Szerokość
	w metrach	
I. Stajnie.		
a. Stajnia końska.		
Stanowisko dla konia robocz. wraz ze żłob.	2.75—3.00	1.30—1.55
» » » zbytkowego	3.00—3.50	1.50—1.80
» » » w klatce, przedzielonego ścianką dr. . . .	3.50	1.50—1.66
» » klaczy ze źrebięciem . .	3.50—3.80	2.50—3.00
Wysokość brzegu żłobu dla koni średnich	1.10—1.20	—
» » » » » wielkich	1.25—1.40	—
» drabiny nad żłobem	0.25—0.30	—
Szerokość chodnika w tyle koni	—	1.25—1.50
» » środkowego pomiędzy 2 rzędami koni	—	2.20—2.80
Głębokość stajni jednorzędowej	4.00—5.00	—
» » dwurzędowej	9.50—11.0	—
Wysokość drzwi wchodowych	2.33—2.50	—
Szerokość » »	1.70—2.25	—
Wysokość stajni na 20—30 koni	3.10—3.75	—
» » » 30—50 »	3.75—4.50	—
Stanowisko dla źrebiąt wolno chodzących na każdą sztukę powierzchni	3.50—4.00 m.□	—
Spadek stanowiska ku rynnie 0.10—0.15 .	—	—
b. Stajnia bydlęca.		
Stanowisko dla małej krowy	2.00—	1.00—1.20
» » średniej »	2.10—2.20	1.10—1.30
» » wołu lub dużej krowy .	2.10—2.20	1.20—1.45
» » jałówki	1.85—2.00	1.00
Chodnik podwyższony pomiędzy dwoma żłobami na paszę	—	1.75—2.00
Chodnik zagłębiony na paszę	—	2.00—2.25
» przy jednym żłobie	—	1.25—1.50
Wysokość brzegu żłobu	—	0.60—0.75
Szerokość chodnika w tyle bydła	—	1.50—1.90
Cała głębokość stajni jednorzędowej . . .	4.50—5.00	—
» » » dwurzędowej . . .	8.00—9.00	—
» » » przy poprzecznych stanowiskach	12—14	—
Wysokość stajni	—	3.75—4.00
» wchodu względnie wjazdu . .	2.25—3.00	—
Szerokość » » .	1.25—3.00	—
Komórka na karmę na sztukę (pow.) . .	0.40—0.50 m.□	—
Powierzchnia na cielę od cycka } łącznie	2.50—4.00 »	—
» » półroczne } łącznie	2.50—4.50 »	—
Komórka dla służby na osobę	4—5 m.□	—

c. Owczarnia.

Powierzchnia na 1 sztukę w przecięciu	0.60—0.70 m.□
» » 1 matkę »	0.65—0.80 »
Powierzchnia na 1 matkę z jagnięciem	1.00—1.50 »
» » 1 barana stanownego	2.80—4.00 »
Wysokość stajni	3.10—4.00 m.
Głębokość »	9—12 m.
Wysokość wjazdu	2.25—3.00 m.

d. Chlewy dla świń.

Powierzchnia dla 1 maciory z prosiętami	3.00—4.00 m.□
» » 1 opasowej sztuki (oddzielonej)	1.50—2.20 »
» » 1 » razem po 2—4	1.20—1.50 »
» » 1 knura	2.00—2.50 »
» » 1 roczniaka	1.00— — »
» » prosięcia odłączonego	0.4 »
Wysokość chlewa	2.30—2.50 m.
» ścian przedziałowych	1.25—1.50 »

e. Kurniki dla drobiu.

Powierzchnia dla indyka	0.33 m.□
» » gęsi	0.25 »
» » kaczki	0.15 »
» » kury	0.12 »
Wysokość kurnika	1.90—2.25 m.

f. Gnojowiska murowane na 0.50—0.65 m. zagłębione, przy kilkorazowem wywożeniu do roku na 1 sztukę dorosłego inwentarza 4—6 m.□ pow.

II. Skład pasz.

Na 100 kg. siana lub potrawu na strychu	1.50 $m.^3$
» 100 » » » » w zabudowaniu na dole	1.00 »
» 100 kg. innej karmy suchej niewiązanej na strychu	1.70 »
» 100 » » » » » » dole	1.20 »
» 100 » karmy suchej wiązanej	1.40—1.00
Jedna fura siana = 500 kg zajmie na strychu	7.50 $m.^3$
» » » » w zabudowaniu na dole	5.00 »

III. Mieszkania robotników.

Do najprostszego mieszkania należą: pokój o powierzchni 12 $m.^2$, kuchnia 7—8 $m.^2$ i komora 6 $m.^2$ Wysokość izby mieszkalnej od tła do powały przyjmuje się na 2.5—3 m., a stósownie do rozmiarów 1 lub 2 okna średniej wielkości.

IV. Magazyny zbożowe.

a) w ziarnie. W spichrzu na 1 h. zboża . . . . . 0.1 $m.^3$

przy nasypie na 1 m. wysokości potrzeba na 1 h. 0.1 $m.^2$ powierzchni bez chodników;

licząc zaś chodniki i wolne zasieki do przeszuflowania potrzeba przy wysokości 1 m. powierzchni = 0.5 $m.^2$ na 1 h.

Do obliczenia wymiarów spichrza przyjmuje się zazwyczaj tylko połowę całej k r e s c e n c y i prawdopodobnego zbioru rocznego w zbożu.

b) w snopie — szopy: Zakładając tylko dół, t. j. przestrzeń między ścianami:	Potrzeba metrów sześciennych, na 100 snopów, jeżeli 1 snop waży kilogr.		
	10	9	7.5
Pszenica i żyto.			
1. zboża dobr. = 75 kg. wagi snop. na m.^{3}	13.20	11.90	9.90
2. » poległ. = 70 kg. » »	14.75	13.20	11.00
3. » cienk. = 80 kg. » »	11.75	10.60	8.90
Jęczmień i owies.			
1. zboża dobrego = 80 kg. wagi snopów	11.75	10.60	8.90
2. » poległego = 75 » » »	13.20	11.90	9.90
3. » cienkiego = 90 » » »	9.00	8.10	6.75
Zakładając dół i poddasze t. j. całą przestrzeń stodoły:			
Pszenica i żyto.			
1. zboża dobrego = 70 kg. snop: na m.^{3}	14.75	13.20	11.00
2. » poległego = 75 » » » »	16.25	14.63	12.20
3. » cienkiego = 75 » » » »	13.20	11.90	9.90
Jęczmień i owies.			
1. zboża dobrego = 75 kg. na m.^{3}	13.20	11.90	9.90
2. » poległego = 70 » » »	14.75	13.20	11.00
3. » cienkiego = 85 » » »	10.25	9.20	7.75

Rocznie potrzeba wody do picia (pojenia) i mycia i t. p.

Dla dorosłej osoby . . . . około 3—4 m.^{3}
Na 1 średn. m. konia . . . . » 12—18 »
Na 1 sztukę bydła rogatego przy żywieniu suchą karmą . . . . » 11—18 »
Na 1 szt. bydła rogat. przy żyw. zieloną karmą » 5—6 »
Na 1 owcę przy suchej karmie . . . . » $^1/_2$—1 »
Na 1 » » zielonej » . . . . » $^1/_5$—$^2/_5$ »
Na 1 sztukę nierogacizny stosownie do sposobu żywienia.

Potrzeba soli:

Dla konia . . . 7—16 gr. dziennie 2.5—5.5 kg. rocznie
» krowy . . 15—30 » » 5.5—11.0 » »
» owcy . . . 4—8 » » 1.5—3.0 » »
» świni . . . 4—8 » » 1.5—3.0 » »
Na 100 kg. masła potrzeba . . . . . 2—6 kg.
» 100 » sera » . . . . . . 2—3 »

Potrzeba oliwy dziennie:

Przy żniwiarce . . . . 1 kg.
» 8-konnej lokomobili . . . . 2 »
» siewniku . . . . 0.05—0.1 kg.

Amortyzacya inwentarza żywego wynosi przeciętnie:

Przy koniach roboczych	12—15%
» wołach »	2—6%
» » rob. 1 rok pracując. (przeznacz. dla opasu)	0%
» krowach mlecznych	6—8%
» buhajach	15%
» ogierach	10—12%

Strata produktów gospodarskich przy przechowywaniu.

Przy przechowywaniu niżej podanych produktów przez 9 miesięcy do 1 roku strata wynosiła następujący procent:

Buraki (nasienie)	4—5 %	Pszenica	1%
Jęczmień	1 »	Rzepak	12—15 »
Owies	1 »	Siano	8—10 »
Płody strączkowe	2—5 »	Spirytus	4—5 »
Potraw	8—10 »	Żyto	1 »

Strata na wadze przy przechowywaniu ziemniaków w piwnicy.

100 kilogramów przechowywanych w piwnicy traci od końca Października na wadze przez wyschnięcie:

		w miesiącu:
Do końca Listopada	0.595 kg.	0.595 kg.
» » Grudnia	3.500 »	2.905 »
» » Stycznia	4.620 »	1.120 »
» » Lutego	6.160 »	1.540 »
» » Marca	7.350 »	1.190 »
» » Kwietnia	8.990 »	1.610 »
» » Maja (silnie kiełkujące)	11.200 »	2.240 »
» » Czerwca (zwiędłe)	30.240 »	7.840 »


Zmiana zawartości skrobi przy przechowywaniu ziemniaków.

W 100 kilogramach ziemniaków było:

W Sierpniu	10 kg. skr.	W Styczniu	17 kg. skr.
We Wrześniu	14 » »	W Lutym	16 » »
W Październiku	15 » »	W Marcu	15 » »
W Listopadzie	16 » »	W Kwietniu	13 » »
W Grudniu	17 » »	W Maju	10 » »

Wzory dla obliczania powierzchni i objętości.

1. Trójkąt.




podstawa = p; wysokość = w

powierzchnia $= \frac{\text{podst.} \times \text{wysok.}}{2}$

np. $\frac{5 \cdot 2}{2} = 5$ m.²


2. Równoległobok.



powierzchnia = podstawie × wysokość

np. $4 \times 2 = 8$ m.²


3. Trapez.




Powierzchnia = sumie boków równoległych $\times$ przez połowę wysokości

np. $5 + 4 = 9$; $9 \times \frac{2}{2} = 9$ m.²

4. Koło.




Obwód = średnicy $\times$ 3.14.
Powierzchnia = $^1/_2$ średnicy $\times$ $^1/_2$ średnicy $\times$ 3.14; np. $2 \times 2 \times 3.14 = 12.56$ m.² ma powierzchni koło o średnicy 4 m.



5. Pryzma.

Objętość = powierzchni podstawy $\times$ wysokość


np. $5 \times 4 = 20$ m.³




6. Cylinder.

Objętość = powierzchni podstawy $\times$ wysokość = $^1/_2$ średnicy $\times$ $^1/_2$ średnicy $\times$ 3.14 $\times$ wysokość;
np. $4 \times 3.14 \times 8 = 100.48$ m.³

7. Piramida.




Objętość = powierzchni podstawy $\times$ $^1/_3$ wysokości;
np. $4 \times \frac{6}{3} = 8$ m.³



8. Stożek.

Objętośc = $^1/_2$ średnicy podst. $\times$ $^1/_2$ średnicy podst. $\times$ 3.14 $\times$ $^1/_3$ wysokości.




9. Objętość **ściętej piramidy** = połowie sumy płaszczyzn równoległych $\times$ przez wysokość

np. $\frac{8 + 12}{2} = 10$; $10 \times 6 = 60$ m.³

10. Objętość **kuli** = 0.524 $\times$ średnicę $\times$ średnicę $\times$ średnicę.

11. Objętość **beczki** (w przybliżeniu): Średnica beczki w środku $\times$ średnica beczki w środku $\times$ 2, do tego dodać średnicę beczki w dnie $\times$ średnicę beczki w dnie i sumę pomnożyć przez 0.262, a ten iloczyn znów pomnożyć ı rz z wysokość beczki.



$6 \times 6 \times 2 = 72$
$4 \times 4 = 16$

88; $88 \times 0.262 = 23.076 \times 8 = 184.6$ m.³

Waga 1 m.³

Siana drobnego*)	55—60	kg.
Siana trzciniastego	40—45	»
Potrawu	50	»
Słomy ozimej	90—101	»
Słomy jarej	74—81	»
Słomy z roślin groszkowych	54—62	»
Drzewa bukowego, dębowego, grabowego, wiązowego	670—600	»
Drzewa sosnowego, świerkowego, brzozowego, osikowego, modrzewiowego	350—470	»
Plew	204—230	»
Betonu z gruzu ceglanego	1800	»
Cegieł zwykłych	1400—1500	»
Cegieł mocno wypalonych	1600—1800	»
Iłu suchego	1800	»
Iłu mokrego	2000	»
Koksu	330—530	»
Piasku suchego	1600	»
Piasku mokrego	2000	»
Śniegu świeżo spadłego	80—190	»
Śniegu mokrego	200—800	»
Torfu wysuszonego na powietrzu	325—410	»
Torfu mokrego	550—650	»
Węgla brunatnego	650—750	»
Węgla kamiennego	700—850	»
Węgla z drzewa miękkiego	150	»
Węgla z drzewa twardego	220	»
Zaprawy wapiennej	1600—1800	»
Ziemi suchej	1600	»
Ziemi mokrej	2000	»
Żwiru	1800	»

Tabela pomocnicza do obliczania zawartości skrobi w ziemniakach i wydatek alkoholu z nich.

Za podstawę do obliczenia przyjęto wydatek 58⁰ litrostopni z 1 kg. skrobi. Wagi do badania kartofli na skrobię systemu Reimana wyrabia Waleryan Wdowicki, mechanik kraj. stacyi doświadczalnej w Dublanach po 40 K. za sztukę.

---

*) W dolnych częściach stogu lub szopy w stanie ubitym półtora raza tyle. Na furę wagi 6 q potrzeba liczyć 6—11 m.³ przestrzeni.

5 kilo ziemniaków, zważonych w powietrzu, waży w wodzie	Odpowiedni ciężar gatunkowy	Ilość w odsetkach		Wydatek spirytusu ze 100 kg. płókanych ziemniaków na litr 100% Trl.	5 kilo ziemniaków, zważonych na powietrzu, waży w wodzie	Odpowiedni ciężar gatunkowy	Ilość w odsetkach		Wydatek spirytusu ze 100 kg. płókanych ziemniaków na litr 100% Trl.
		suchej materyi	skrobi				suchej materyi	skrobi	
260	1.054	13.8	9.8	5.684	470	1.103	24.6	18.8	10.904
265	1.056	14.1	10.0	5.800	475	1.104	24.8	19.0	11.020
270	1.057	14.3	10.1	5.858	480	1.106	25.2	19.4	11.252
275	1.058	14.5	10.3	5.974	485	1.107	25.5	19.7	11.426
280	1.059	14.8	10.5	6.090	490	1.108	25.7	19.9	11.542
285	1.060	15.1	10.7	6.186	495	1.110	26.1	20.3	11.774
290	1.061	15.4	10.9	6.322	500	1.111	26.3	20.5	11.890
295	1.062	15.6	11.1	6.438	505	1.112	26.5	20.7	12.006
300	1.063	15.9	11.3	6.554	510	1.113	26.7	20.9	12.122
305	1.064	16.1	11.4	6.612	515	1.114	26.9	21.1	12.238
310	1.066	16.4	11.6	6.728	520	1.116	27.4	21.6	12.528
315	1.067	16.7	11.8	6.844	525	1.117	27.6	21.8	12.644
320	1.068	16.9	11.9	6.902	530	1.118	27.8	22.0	12.760
325	1.069	17.2	12.2	7.076	535	1.120	28.3	22.5	13.050
330	1.070	17.5	12.4	7.102	540	1.121	28.5	22.7	13.166
335	1.072	17.7	12.6	7.308	545	1.122	28.7	22.9	13.282
340	1.073	18.0	12.7	7.366	550	1.123	28.9	23.1	13.398
345	1.074	18.3	12.9	7.480	555	1.124	29.1	23.3	13.514
350	1.075	18.5	13.1	7.598	560	1.126	29.5	23.7	13.746
355	1.076	18.8	13.3	7.714	565	1.127	29.8	24.0	13.920
360	1.077	19.1	13.5	7.830	570	1.128	30.0	24.2	14.036
365	1.078	19.4	13.7	7.946	575	1.129	30.2	24.4	14.152
370	1.080	19.7	13.9	8.062	580	1.131	30.6	24.8	14.384
375	1.081	19.9	14.1	8.188	585	1.132	30.8	25.0	14.500
380	1.082	20.1	14.3	8.294	590	1.133	31.0	25.2	14.616
385	1.083	20.3	14.5	8.410	595	1.134	31.3	25.5	14.790
390	1.084	20.5	14.7	8.526	600	1.136	31.7	25.9	15.022
395	1.086	20.7	14.9	8.642	605	1.137	31.9	26.1	15.138
400	1.087	21.2	15.4	8.832	610	1.138	32.1	26.3	15.254
405	1.088	21.4	15.6	9.048	615	1.140	32.5	26.7	15.486
410	1.089	21.6	15.8	9.164	620	1.141	32.8	27.0	15.660
415	1.090	21.8	16.0	9.280	625	1.142	33.0	27.2	15.776
420	1.091	22.0	16.2	9.396	630	1.143	33.2	27.4	15.892
425	1.093	22.4	16.6	9.628	635	1.144	33.4	27.6	16.008
430	1.094	22.7	16.9	9.802	640	1.146	33.8	28.0	16.240
435	1.095	22.9	17.1	9.918	645	1.147	34.1	28.3	16.414
440	1.096	23.1	17.3	10.034	650	1.148	34.3	28.5	16.530
445	1.097	23.3	17.5	10.150	655	1.150	34.7	28.9	16.762
450	1.099	23.7	17.9	10.382	660	1.152	35.1	20.3	16.894
455	1.100	24.0	18.2	10.556	665	1.153	35.4	29.6	17.168
460	1.101	24.2	18.4	10.672	670	1.154	35.6	29.8	16.284
465	1.102	24.4	18.6	10.788	675	1.156	36.0	30.2	18.516

Wydatek mąki.

Ze 100 cz. ziarna	Otrzymuje się mąki	otrąb	strata
Pszenica	80	18.5	1.5
Żyto	75	23.5	1.5
Jęczmień	83	12	1.0

Względna wartość opałowa rozmaitego paliwa w kaloriach.

Kaloria = ilości ciepła potrzebnej do nagrzania 1 kg. wody na 1° C.

Drzewo suche 3600—4000 kalorii
Drzewo wysuszone na powietrzu z 20% wody 3000 kalorii
Węgiel drzewny 6500—7500 kalorii
Torf 1500—3700 » (zależnie od jakości i suchości)
Węgiel brunatny 4500 »
Węgiel kamienny 5900—7200 »
Koks z 10% popiołu 6600 »

Gdyby nic z ciepła nie ginęło, 1 kg. drzewa suchego byłby w stanie nagrzać 36—40 kg. od 1° do 100° wody, koks 66 kg.

Powierzchnia i obwody kół

dla średnic od 1 do 50 dla obliczania objętości okrągłego drzewa.

Średn. cm.	Powierzchnia cm.²	Obwód cm.	Średn. cm.	Powierzchnia cm.²	Obwód cm.
1	0.79	3.14	26	530.93	81.68
2	3.14	6.28	27	572.56	84.82
3	7.07	9.42	28	615.75	87.96
4	12.57	12.57	29	660.52	91.11
5	19.63	15.71	30	706.86	94.25
6	28.27	18.85	31	754.77	97.39
7	38.48	21.99	32	804.25	100.53
8	50.27	25.13	33	855.30	103.67
9	63.62	28.27	34	907.92	106.81
10	78.54	31.42	35	962.11	109.96
11	95.03	34.56	36	1017.88	113.10
12	113.10	37.70	37	1075.21	116.24
13	132.73	40.84	38	1134.11	119.38
14	153.94	43.98	39	1194.59	122.52
15	176.71	47.12	40	1256.64	125.66
16	201.06	50.27	41	1320.25	128.81
17	226.98	53.41	42	1385.44	131.95
18	254.47	56.55	43	1452.20	135.09
19	283.53	59.69	44	1520.53	138.23
20	314.16	62.83	45	1590.43	141.37
21	346.36	65.97	46	1661.90	144.51
22	380.13	69.12	47	1734.94	147.65
23	415.48	72.26	48	1809.56	150.80
24	452.39	75.40	49	1885.74	153.94
25	490.87	78.54	50	1963.50	157.08

Tablica ta służy do obliczenia objętości drzewa okrągłego. Biorąc w połowie ściętego drzewa średnicę i mnożąc znalezioną dla danej średnicy powierzchnię przecięcia przez długość kloca, otrzymuje się objętość drzewa; np. średnica drzewa wynosi 40 cm., a długość 25 metr., objętość wynosi 1256.6 × 25 = 3.14 m.²

Kubatura rzniętego materyału drzewnego.

1 łata	³/₄″ × 2″ — 6 metr. długa	=	0.006	mtr. kub.
1 rygiel	2″ × 4″ — 6 » »	=	0.033	» »
1 »	2″ × 6″ — 6 » »	=	0.050	» »
1 »	2″ × 8″ — 6 » »	=	0.067	» »
1 deska	³/₄″ × 8″ — 6 » »	=	0.025	» »
1 »	1″ × 10″ — 6 » »	=	0.041	» »
1 »	2½″ × 10″ — 6 » »	=	0.087	» »
1 belka	8″ × 8″ — 6 » »	=	0.267	» »
1 »	10″ × 10″ — 6 » »	=	0.415	» »
1 »	12″ × 12″ — 6 » »	=	0.599	» »
1 »	10″ × 16″ — 6 » »	=	0.664	» »
1 »	14″ × 18″ — 6 » »	=	1.049	» »

Miary i wagi metryczne.

I. Miara długości. Jednostką jest *metr* (m) = 0.527916 sążniom = 3 stopom 1 calowi 11.58 liniom = 1.286077 łokciom.

10 metrów = 1 Dekametrowi (dkm)
100 » = 1 Hektometrowi (hm)
1000 » = 1 Kilometrowi (km)
$^1/_{10}$ metra = 1 decimetrowi (dm)
$^1/_{100}$ » = 1 centimetrowi (cm)
$^1/_{1000}$ » = 1 milimetrowi (mm).

II. Miara powierzchni. Jednostką jest *metr kwadratowy* (m^2). Jako miara powierzchni pól i łąk służy dekametr kwadratowy czyli *Ar* (a) i hektometr kwadratowy czyli *hektar* (ha).

III. Miara objętości. Jednostkę tworzy *litr* (l) = 0.7068515 garnca = 0.01626355 mier‑yc.

100 litrów = 1 hektolitrowi (hl) = 1.769129 wiadr. Litr służy jako miara objętości dla płynów, hektolitr dla materyj stałych.

IV. Waga metryczna. Jednostką jest *kilogram* (kg) = 1.785523 funt. austr. = 2.442 funt. ros. = 2 funt. celn.

1000 kilogramów = 1 tonnie (t) = 2000 funt. celn.
100 » = 1 centnarowi metryczn. (q).

Tabela porównawcza miar i wag

francuskich, polskich i rosyjskich, oraz dawnych austryackich i pruskich.

I. Miary długości. *a) drobniejsze:*	Milim.	Cale austr.	Cale rosyjs.	Cale prusk.	Cale polskie
Austrya. Stopa wiedeń. = 12 calom = 144 liniom	316.08	12.—	12.48	12.10	13.17
Francya. Metr = 10 decimetrom = 100 centimetrom = 1000 milimetrom .	1000.—	37.96	39.37	38.28	41.66
Polska. Stopa = 12 calom = 144 liniom	288.—	10.94	11.34	11.03	12.—
Prusy. Stopa = 12 calom = 144 liniom	313.85	11.92	12.36	12.—	13.07
Rosya. Arszyn = 28 cal. = 16 werszkom	711.19	22.51	28.—	27.26	29.67

b) drożne:	Metry	Sążnie wied.	Sążnie ros.	Pręty pruskie	Sążnie polskie
Austrya. Mila austr. = 4.000 sążniom	7585.9	4000.—	3550.—	2014.—	4388.—
Francya. Kilometr = 1000 metrom	1000.—	527.2	468.7	265.6	531.8
Polska. Dawna mila polska . . .	8534.2	4497.8	—	2268.8	4938.—
Prusy. Mila = 24.000 stopom = 2.000 prętom	7532.5	3936.5	3530.—	2000.—	4356.—
Rosya. Wiorsta = 500 sążniom . .	1066.8	562.2	500.—	283.3	617.2
Anglia. Mila ang. = 1.760 yardom .	1609.3	848.5	754.1	427.5	931.3
Mila morska (włoska) = $^1/_{60}$ stopnia równikowego	1855.1	978.4	869.5	492.7	1073.5
Mila geograficzna = $^1/_{15}$ stopnia równ.	7420.4	3913.—	3479.—	1971.—	4294.—

II. Miary powierzchni.	Hektary	Morgi wied.	Dzies.	Morgi magd.	Morgi polskie
Austrya. Morg wied. = 1.600 sążniom kw.	0.57556	1.0000	0.5285	2.2540	1.0280
Francya. Hektar = 100 arom	1.0000	1.7377	0.9153	3.9170	1.7861
Polska. Morg nowopolski = 300 prętom kw.	0.5599	0.9735	0.5124	2.1920	1.0000
Prusy. Morg magdeb. (pruski) = 180 prętom kw.	0.2553	0.4440	2.2337	1.0000	0.4560
Rosya. Desiatyna praw. = 2.400 sążniom kw.	1.0925	1.8980	1.0000	3.8237	1.9512
Anglia. Akr = 160 kw. prętom . .	0.4047	1.4220	2.7052	0.6309	1.3842

III. Miary objętości. *a) płynów:*	Litry	Wiadro austr.	Wiadro rosyjs.	Wiadro pruskie	Garniec polski
Austrya. Wiadro (Eimer) = 40 garncom (Maas) = 80 półgarnc. Halb. = 160 Seidel = 325 Pfiff.	56.589	1.000	4.610	0.824	14.150
Francya. Hektolitr = 100 litrom . .	100.—	1.767	8.130	1.458	25.—
Polska. Garniec = 4 kwartom = 16 kwaterkom	4.—	0.071	0.325	0.056	1.—
Prusy. Wiadro (Eimer) = ankrom = 60 kwartom	68.701	1.215	5.584	1.—	17.175
Rosya. Wiadro = 10 sztofom = 100 krużkom = 1000 czarkom . . .	12.299	0.230	1.—	0.179	3.073

b) zbóż:	Hektolitry	Mierzyc austr.	Czetw. rosyjs.	Szefle pruskie	Korce polskie
Austrya. Mierzyca (Metzen) = 4 ćwierciom (Viertel) = 16 garncom (Massel)	0.6 4	1.—	0.292	1.116	0.483
Francya. Hektolitr = 100 litrom . .	1.—	1.623	0.476	1.819	0.783
Polska. Korzec = 4 ćwierciom = 32 garncom	.280	2.085	0.610	2.328	1.—
Prusy. Szefel = 4 virtelom = 16 massom	0.550	0.897	0.262	1.—	0.423
Rosya. Czetwert' = 2 ośminom = 8 czetwerykom = 64 garncom . .	2.099	3.410	1.—	3.817	1.640
Anglia. Quarter = 8 bushel = 8 gallons. bushel	0.363	1.692	5.787	1.517	3.526

IV. Wagi.	Kilogr.	Funt austr.	Funt rosyjs.	Funt pruski	Funt polski
Austrya. Funt wied. = 32 lutom = 128 kwintlom	0.561	1.—	1.371	1.122	1.380
Francya. Kilogram = 10 Hektogramom = 100 Dekagramom = 1.000 gramom	1.000	1.786	2.442	2.—	2.469
Polska. Funt = 32 łutom	0.405	0.720	0.999	0.810	1.—
Prusy. Funt = 32 łutom	0.500	0.893	1.221	1.—	1.235
Rosya. Funt = 32 łutom = 96 złotnikom = 9216 dolom	0.409	0.731	1.000	0.818	1.010
Anglia. Funt = 16 uncyi	0.453	1.239	0.903	1.104	0.894

1 pud = 16.48 kg. 100 kg. = 6 pudów 4 f.

Tabela porównawcza monet obcych z monetami waluty koronowej.

MONETY											
francuskie = walucie koronowej				niemieckie = walucie koronowej				rosyjskie = walucie koronowej			
franki	cen.	kor.	gr.	m.	fen.	kor.	gr.	rub.	kop.	kor.	gr.
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3
—	10	—	$9^1/_2$	—	10	—	$11^1/_2$	—	10	—	25
1	—	—	95	1	—	1	17	1	—	2	53
10	—	9	52	10	—	11	76	10	—	25	30
100	—	95	23	100	—	117	56	100	—	253	—
1000	—	952	26	1000	—	1175	63	1000	—	2530	—

MONETY								
angielskie = walucie koronowej					amerykańskie = walucie koronowej			
funt szt.	szyl.	pen.	kor.	gr.	dol.	cen.	kor.	gr.
—	—	1	—	10	—	1	—	5
—	—	10	1	—	—	10	—	49
—	1	—	1	20	1	—	4	94
—	10	—	12	—	10	—	49	35
1	—	—	24	01	100	—	493	51
10	—	—	240	17	1000	—	4935	10

Tablica do obliczania % za rok.

Kapitał	Przy stopie %															
	2%		2½%		3%		3½%		4%		5%		5½%		6%	
K.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.
1000	20	—	25	—	30	—	35	—	40	—	50	—	55	—	60	—
900	18	—	22	50	27	—	31	50	36	—	45	—	49	50	54	—
800	16	—	20	—	24	—	28	—	32	—	40	—	44	—	48	—
700	14	—	17	50	21	—	24	50	28	—	35	—	38	50	42	—
600	12	—	15	—	18	—	21	—	24	—	30	—	33	—	36	—
500	10	—	12	50	15	—	17	50	20	—	25	—	27	50	30	—
400	8	—	10	—	12	—	14	—	16	—	20	—	22	—	24	—
300	6	—	7	50	9	—	10	50	12	—	15	—	16	50	18	—
200	4	—	5	—	6	—	7	—	8	—	10	—	11	—	12	—
100	2	—	2	50	3	—	3	50	4	—	5	—	5	50	6	—
90	1	80	2	25	2	70	3	15	3	60	4	50	4	95	5	40
80	1	60	2	—	2	40	2	80	3	20	4	—	4	40	4	80
70	1	40	1	75	2	10	2	45	2	80	3	50	3	85	4	20
60	1	20	1	50	-	80	2	10	2	40	3	—	3	30	3	60
50	1	—	1	25	1	50	1	75	2	—	2	50	2	75	3	—
40	—	80	1	—	1	20	1	40	1	60	2	—	2	20	2	40
30	—	60	—	75	—	90	1	5	1	20	1	50	1	75	1	80
20	—	40	—	50	—	60	—	70	—	80	.	—	1	10	1	20
10	—	20	—	25	—	30	—	35	—	40	—	50	—	55	—	60
9	—	18	—	23	—	27	—	32	—	36	—	45	—	50	—	54
8	—	16	—	20	—	24	—	28	—	32	—	40	—	44	—	48
7	—	14	—	18	—	21	—	24	—	28	—	35	—	39	—	42
6	—	12	—	15	—	18	—	21	—	24	—	30	—	33	—	36
5	—	10	—	13	—	15	—	17	—	20	—	25	—	28	—	30
4	—	8	—	10	—	12	—	15	—	16	—	20	—	22	—	24
3	—	6	—	8	—	9	—	11	—	12	—	15	—	18	—	18
2	—	4	—	5	—	6	—	7	—	8	—	10	—	11	—	12
1	—	2	—	3	—	3	—	4	—	4	—	5	—	6	—	6

Tablica do obliczania % za miesiąc (= 30 dniom).

Kapitał	2% K.	2% gr.	2½% K.	2½% gr.	3% K.	3% gr.	3½% K.	3½% gr.	4% K.	4% gr.	5% K.	5% gr.	5½% K.	5½% gr.	6% K.	6% gr.
1000	1	67	2	8	2	50	2	92	3	33	4	17	4	58	5	—
900	1	50	1	88	2	25	2	63	3	—	3	75	4	13	4	50
800	1	33	1	67	2	—	2	33	2	67	3	33	3	67	4	—
700	1	17	1	46	1	75	2	4	2	33	2	92	3	21	3	50
600	1	—	1	25	1	50	1	75	2	—	2	50	2	75	3	—
500	—	83	1	4	1	25	1	46	1	67	2	8	2	29	2	50
400	—	67	—	83	1	—	1	17	1	33	1	67	1	83	2	—
300	—	50	—	63	—	75	—	88	1	—	1	25	1	38	1	50
200	—	33	—	42	—	50	—	58	—	67	—	83	—	92	1	—
100	—	17	—	21	—	25	—	29	—	33	—	42	—	46	—	50
90	—	15	—	19	—	23	—	26	—	30	—	37	—	41	—	45
80	—	13	—	17	—	20	—	23	—	27	—	33	—	37	—	40
70	—	12	—	15	—	18	—	20	—	23	—	29	—	32	—	35
60	—	10	—	13	—	15	—	18	—	20	—	25	—	28	—	30

Kapitał	Przy stopie %															
	2%		2½%		3%		3½%		4%		5%		5½%		6%	
K.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.
50	—	8	—	10	—	13	—	15	—	17	—	21	—	23	—	25
40	—	7	—	8	—	10	—	12	—	13	—	17	—	18	—	20
30	—	5	—	6	—	8	—	9	—	10	—	13	—	14	—	15
20	—	3	—	4	—	5	—	6	—	7	—	8	—	9	—	10
10	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	4	—	5	—	5
9	—	1	—	2	—	2	—	3	—	3	—	4	—	4	—	4
8	—	1	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	4	—	4
7	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3
6	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3
5	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2
4	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2
3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Przykład: Obliczyć procent za rok i 140 dni od kapitału 320 K. przy stopie % 5. Znajdujemy w odpowiednich liniach od 320 K: za rok 15 + 1 = 16 K., za 4 miesiące 1.25 + 8 = = 1.33 × × 4 = 5.32 K. i za 20 dni $\frac{1.33}{3} \times 2 = 88$ gr. W sumie więc 16 + + 5.32 + 88 = 22.20 koron.

Tablice składanych procentów.

I. Tablica.

Wykazuje do jakiej kwoty wzrasta 1 K. złożona na procent składany po upływie pewnej liczby lat. Aby dojść, wiele wynosić będzie pewna kwota po jakimś czasie, wystarczy wyszukać w tej tabeli liczbę z odpowiedniego roku i pomnożyć przez sumę, o którą chodzi.

Np.: Jeżeli ktoś chce wiedzieć, wiele uczyni 10 K. po upływie 28 lat złożone na procent składany 4, niech weźmie z 28-ej linii tej tabeli liczbę w rubryce 4% zamieszczoną, a więc 3 K. i pomnoży przez 10.

II. Tablica.

Wykazuje jaką sumę otrzyma po pewnej ilości lat ten, kto przez cały ten czas co roku oddawać będzie na procent składany po 1 K. Aby oznaczyć, jaki kapitał otrzyma po pewnej liczbie lat ten, kto co roku składać będzie pewną sumę, wystarczy w tej tabeli wyszukać liczbę odpowiadającą ilości lat i pomnożyc przez sumę, o którą chodzi.

Jeżeli np. ktoś chce wiedzieć, wiele będzie miał po 30 latach, jeżeli przez 30 lat co roku składać będzie 10 K. na procent składany 5, niech weźmie w 30-ej linii tabelki liczbę w rubryce 5% umieszczoną i pomnoży przez 10.

Tablica I.

Lat	po 3% K.	po 3% gr.	po 4% K.	po 4% gr.	po 4½% K.	po 4½% gr.	po 5% K.	po 5% gr.	po 5½% K.	po 5½% gr.	po 6% K.	po 6% gr.	Lat	po 3% K.	po 3% gr.	po 4% K.	po 4% gr.	po 4½% K.	po 4½% gr.	po 5% K.	po 5% gr.	po 5½% K.	po 5½% gr.	po 6% K.	po 6% gr.
1	1	3	1	4	1	4½	1	5	1	5½	1	6	26	2	16	2	78	3	14	3	56	4	2	4	52
2	1	6	1	8	1	9	1	10	1	11	1	12	27	2	22	2	88	3	28	3	73	4	26	4	84
3	1	9	1	12	1	14	1	16	1	17	1	19	28	2	29	3	—	3	43	3	92	4	48	5	18
4	1	13	1	17	1	19	1	22	1	24	1	26	29	2	36	3	12	3	58	4	12	4	71	6	42
5	1	16	1	22	1	25	1	28	1	31	1	34	30	2	43	3	24	3	75	4	32	4	99	5	74
6	1	19	1	27	1	30	1	34	1	38	1	42	31	2	50	3	37	3	91	4	54	5	21	6	2
7	1	23	1	32	1	36	1	41	1	45	1	50	32	2	58	3	51	4	9	4	76	5	48	6	81
8	1	27	1	37	1	42	1	48	1	53	1	59	33	2	65	3	65	4	27	5	—	5	72	6	78
9	1	30	1	42	1	49	1	55	1	62	1	69	34	2	73	3	79	4	46	5	25	6	12	7	32
10	1	34	1	48	1	55	1	63	1	71	1	79	35	2	81	3	95	4	67	5	52	6	51	7	69
11	1	38	1	54	1	62	1	71	1	80	1	89	36	2	90	4	10	4	87	5	79	6	80	8	23
12	1	43	1	60	1	71	1	80	1	90	1	98	37	2	99	4	27	5	10	6	8	7	22	8	78
13	1	47	1	67	1	79	1	89	2	1	2	13	38	3	7	4	44	5	33	6	39	7	53	9	15
14	1	51	1	73	1	86	1	99	2	11	2	25	39	3	17	4	62	5	57	6	70	7	95	9	72
15	1	55	1	80	1	94	2	9	2	22	2	40	40	3	26	4	80	5	82	7	4	8	51	10	29
16	1	61	1	88	2	3	2	20	2	36	2	56	41	3	36	4	99	6	8	7	39	9	2	10	99
17	1	66	1	96	2	13	2	31	2	51	2	72	42	3	46	5	19	6	35	7	76	9	61	11	54
18	1	71	2	4	2	23	2	42	2	66	2	88	43	3	56	5	40	6	64	8	15	10	33	12	20
19	1	76	2	12	2	32	2	54	2	81	3	5	44	3	67	5	62	6	94	8	56	10	65	12	88
20	1	81	2	19	2	42	2	65	2	92	3	21	45	3	78	5	84	7	25	8	99	11	12	13	76
21	1	83	2	28	2	53	2	78	3	7	3	42	46	3	90	6	7	7	57	9	43	11	90	14	54
22	1	86	2	37	2	66	2	93	3	23	3	63	47	4	1	6	32	7	92	9	91	12	60	15	62
23	1	91	2	46	2	79	3	8	3	40	3	84	48	4	13	6	57	8	27	10	40	13	80	16	74
24	1	99	2	56	2	90	3	25	3	60	4	6	49	4	26	6	83	8	64	10	92	14	—	17	79
25	2	9	2	67	3	1	3	39	3	81	4	29	50	4	38	7	11	9	3	11	47	14	51	18	42

Tablica II.

Lat	po 3% K.	po 3% gr.	po 3½% K.	po 3½% gr.	po 4% K.	po 4% gr.	po 4½% K.	po 4½% gr.	po 5% K.	po 5% gr.	Lat	po 3% K.	po 3% gr.	po 3½% K.	po 3½% gr.	l o 4% K.	l o 4% gr.	po 4½% K.	po 4½% gr.	po 5% K.	po 5% gr.
1	1	03.00	1	03.50	1	04.00	1	04.50	1	05.00	26	39	70.96	42	75.90	46	08.42	49	71.13	53	66.91
2	2	09.09	2	10.62	2	12.16	2	13.70	2	15.25	27	41	03.09	45	29.06	48	96.75	52	99.33	57	40.25
3	3	18.36	3	21.49	3	24.64	3	27.81	3	31.01	28	44	21.88	47	91.07	51	96.62	56	42.30	61	32.27
4	4	30.91	4	36.24	4	41.63	4	47.07	4	52.19	29	46	57.54	50	62.26	55	08.49	60	00.70	65	43.88
5	5	46.84	5	55.01	5	63.29	5	71.68	6	80.56	30	49	00.26	53	42.94	58	32.83	63	75.23	69	76.07
6	6	66.24	6	77.94	6	89.82	7	01.91	7	14.20	31	51	50.27	56	33.45	61	70.14	67	66.62	74	29.88
7	7	89.23	8	05.16	8	21.42	8	38.00	8	54.91	32	54	07.78	59	34.12	65	20.95	71	75.62	79	06.37
8	9	15.91	9	36.84	9	58.27	9	80.21	10	02 65	33	56	73.01	62	45.31	68	85.79	76	03.02	84	06.69
9	10	46.38	10	73.13	11	00.61	11	28.82	11	57.78	34	59	46.20	65	67.40	72	65.22	80	49.66	89	32.03
10	11	80.77	12	14.19	12	48.63	12	84.11	13	20.67	35	62	27.59	69	00.76	76	59.83	85	16.39	94	83.63
11	13	19.20	13	60.19	14	02.58	14	46.40	14	91.71	36	65	17.42	72	45.77	80	70.22	90	04.13	100	62.81
12	14	61.77	15	11.30	15	62.68	16	15.99	16	71.29	37	68	15.94	76	02.88	84	97.03	95	13.82	106	70.95
13	16	08.63	16	67.69	17	29.19	17	93.21	18	59.86	38	71	23.42	79	72.49	89	40.91	100	46.44	113	09.50
14	17	59.89	18	29 56	19	02.35	19	78.40	20	57.85	39	74	40.12	83	55.02	94	02.55	106	03.03	119	79.97
15	19	15.68	19	97.10	20	82.45	21	71.93	22	65.74	40	77	66.32	87	50.95	98	82.65	111	84.66	126	83.97
16	20	76.15	21	70.50	22	69.75	23	74.17	24	84.03	41	81	02.31	91	60.73	103	81.95	117	92.47	134	23.17
17	22	41.44	23	49·96	24	64.54	25	85.50	27	13·23	42	84	48.38	95	84.86	109	01.23	124	27.64	141	99.33
18	24	11.68	25	35.71	26	67.12	28	06.35	29	53.90	43	88	04.84	100	23.83	114	41.28	130	91.38	150	14.30
19	25	87.03	27	27.96	28	77.80	30	37.14	32	06.59	44	91	71.98	104	78.16	120	02.93	137	84.99	158	70.01
20	27	67.64	29	26.94	30	96.92	32	78.31	34	71.92	45	95	50.14	109	48.40	125	87.05	145	09.82	167	68.51
21	29	53.67	31	32.89	33	24.79	35	30.33	37	50.52	46	99	39.65	114	35.09	131	94.53	152	67.26	177	11.94
22	31	45.28	33	46.04	35	61.78	37	93.70	40	43.04	47	103	40.83	119	38.82	138	26.32	160	58.79	187	02.53
23	33	42.64	35	66.65	38	08.26	40	68.91	43	50.19	48	107	54.06	124	60.18	144	83.37	168	85.93	197	42.66
24	35	45.92	37	94.98	40	64.59	43	56.52	46	72.70	49	111	79.68	129	99.79	151	66.70	177	50.30	208	34.79
25	37	55.30	40	31.31	43	31.17	46	57.06	50	11.34	50	116	18.07	135	58.28	158	77.37	186	53.56	219	81.53

Rolnicze zakłady naukowe w Galicyi.

1. *Studyum rolnicze przy Wszechnicy Jagiellońskiej w Krakowie.* Kurs 3-letni. Warunki przyjęcia i opłata, jak w Uniwersytecie. Dyrektor prof. dr. Emil Godlewski.

2. *Akademia rolnicza w Dublanach.* Warunki przyjęcia: Ukończony 18-ty rok, świadectwo dojrzałości gimnazyum lub szkoły realnej, względnie egzamin wstępny dla tych, co byli w ostatniej klasie szkoły średniej, lecz świadectwa dojrzałości nie uzyskali. Słuchacze otrzymują mieszkanie i wikt w domu zakładowym za opłatą łącznie z czesnem 926 koron. Kurs trwa lat trzy. Akademia jest bogato wyposażona w środki naukowe. Posiada obszerne laboratorya, piękne zbiory; praktyczne demonstracye i ćwiczenia odbywają się na folwarku szkolnym (387 ha). Uczniowie mają możność zapoznania się praktycznie z gorzelnictwem i mleczarstwem. Rozpoczęcie roku 1. października.

3. *Krajowa średnia szkoła rolnicza w Czernichowie.* Warunki przyjęcia: Ukończony 15-ty rok, ukończona 4-ta klasa szkoły średniej. Internat. Utrzymanie wraz z czesnem 600 kor. rocznie. Kurs 3-letni. Rozpoczęcie roku 1. września.

4. *Krajowa szkoła gospodarstwa lasowego we Lwowie* Warunki przyjęcia: Ukończony 18-ty rok, 6 klas gimnazyalnych lub realnych, lub 4 klasy i egzamin wstępny (zgłoszenie przed 10. września); praktyka leśnicza przez rok jeden. Opłata: wpisowe 4 kor., czesne w półroczu 10 kor. Kurs 3-letni (dla maturzystów 2-letni). Rozpoczęcie roku 1. października.

5. *C. k. szkoła leśniczych w Bolechowie.* Warunki przyjęcia: 17 lat, ukończenie szkoły wydziałowej lub 3-iej klasy gimnazyalnej lub realnej, jednoroczna praktyka leśnicza. Utrzymanie i nauka 600 kor. Kurs roczny. Rozpoczęcie roku 1. października.

6. *Krajowe niższe szkoły rolnicze* w Dublanach, Jagielnicy, Bereźnicy (p. Stryj), Horodence, Suchodole (p. Krosno), Kobiernicy (p. Kęty). Warunki przyjęcia: 16 lat, ukończona szkoła ludowa, egzamin wstępny z zakresu kursu 4-klasowej szkoły ludowej. Opłata za całkowite utrzymanie i odzież (bez bielizny i obuwia) 448 kor. rocznie. Prawie wszyscy uczniowie są utrzymywani na koszt kraju. Kurs 3-letni. Rozpoczęcie roku dnia 17. czerwca.

7. *Krajowa szkoła ogrodnicza w Tarnowie.* Warunki przyjęcia: 15 lat, szkoła ludowa, egzamin wstępny. Opłata za całkowite utrzymanie 336 kor. rocznie. Kurs 3-letni. Rozpoczęcie roku 1. kwietnia.

8. *Szkoła Towarz. pszczelniczo-ogrodniczego we Lwowie.*

9. *Szkoła chmielarska w Starem Siele* (koło Lwowa). Warunki przyjęcia: Ukończona szkoła ludowa. Kurs 6 miesięcy od 1 marca. Uczniów wynagradza się za praktyczne zajęcia podług ich zdolności i miejscowych cen robocizny.

10. *Krajowa szkoła mleczarska w Rzeszowie*, dyr. dr. Rylski.

11. *Krajowa stacya doświadczalna botaniczno-rolnicza.* Lwów, Badenich 7.

12. *Krajowa stacya doświadczalna chem.-rolnicza* Dublany.

13. *C. k. Zakład doświadczalny rolniczy* w Krakowie.

14. *Sekcya rolnicza* komisyi fizyograficznej Akademii umiejętności w Krakowie.

15. *Towarzystwo dla popierania polskiej nauki rolnictwa.* Kraków. Grodzka 53. Prezes: prof. dr. Godlewski.

Najważniejsze wyjątki z ustaw, dotyczących gospodarstwa wiejskiego *).

Ustawa polowa z dnia 17 lipca 1876.

I. O własności polnej i przestępstwie polowem.

§ 1. Własnością polną są wszelkie przedmioty, które z prowadzeniem gospodarstwa wiejskiego w najobszerniejszem słowa tego znaczeniu w pośrednim lub bezpośrednim zostają stosunku, a to jak długo znajdują się na otwartem polu.

§ 2. Wszelkie uszkodzenie własności polnej oraz przekroczenie zakazów, zawartych w niniejszej ustawie lub wydanych na jej podstawie przez władzę do tego powołaną, uznaje się za przestępstwa polowe i mają być jako takie karane, jeżeli nie podpadają pod przepisy ogólnej ustawy karnej lub innych szczegółowych ustaw.

II. Postanowienia karne.

§ 13. Kto jeździ wierzchem lub zaprzęgiem po cudzym gruncie (ogrodach, rolach, łąkach itd.), podlega grzywnie po 2 kor. od sztuki bydła.

§ 14. Kto chodzi po gruntach lub wstępuje na drogi polne, według § 3 lit. b. wzbronione (zamknięte lub tablicami z zakazem lub innemi znakami opatrzone), podlega grzywnie 1 k.

§ 15. Kto nie zachowuje przepisów objętych w § 5—15 (o dozorze przy pasaniu bydła, o nocnem pasaniu, o ostrożnościach przed szkodą i t. p.), podlega grzywnie według następującej taksy: od sztuki nierogacizny 2 k., od sztuki bydła rogatego 1 k. 20 gr., od sztuki konia, muła lub osła 1 k., od sztuki kozy 80 gr., od sztuki owcy 40 gr., od sztuki prosięcia ssącego 20 gr., od sztuki gęsi lub indyka 20 gr., od sztuki innego drobiu 10 gr.

§ 16. Grzywna paragrafem poprzednim dla przestępstw §§ 5—10 postanowiona, będzie podwojona, jeżeli przestępstwo popełnione zostało:

a) z umysłu;

b) pod okolicznościami utrudniającemi wykrycie sprawcy, a w szczególności porą nocną;

c) na rolach uprawionych lub obsianych, w ogrodach, na łąkach wilgotnych lub grząskich, tudzież na gruntach ogrodzonych lub też tablicami ostrzegającemi, albo w inny w okolicy używany sposób jako zamknięte oznaczonych;

d) jeżeli szkodnik już raz za przestępstwo polowe w ciągu roku ukarany został.

§ 17. Kto niszczy lub uszkadza cudze drzewa i krzewy na pniu, czy to na gruntach prywatnych, czy publicznych, np. przy drogach, podlega grzywnie po 4 kor. od jednej sztuki.

§ 18. Kto bezprawnie łamie lub uszkadza gałęzie, obrywa owoce, kwiaty lub liście, psuje kosze, albo wyciąga lub psuje znajdujące się przy drzewkach pale ochronne, podlega grzywnie po 4 k. od sztuki drzewa, krzewu, pala lub kosza.

---

*) Szan. Czytelnikom polecamy dzieło 2 t. Wiktora Dzerowicza Podręcznik prawny w sprawach lasowych, polowych, łowieckich i o rybołostwie. Lwów 1898.

A. Ustawa o tępieniu kanianki i szkodliwych ostów z d. 17 lutego 1885.

§ 1. Każdy właściciel, posiadacz, dzierżawca lub zawiadowca gruntu obowiązanym jest tępić kaniankę, także wylubem zwaną, i wszelkie szkodliwe osty, znajdujące się na gruntach w jego posiadaniu, dzierżeniu lub pod jego zarządem będące, a to w takim czasie, zanim rośliny te zaczną kwitnąć lub dojrzewać.

§ 2. Gdyby ktokolwiek powyższego obowiązku swego w przepisanym czasie nie wypełnił, winien naczelnik gminy, względnie przełożony obszaru dworskiego, wezwać go do tego i stosowny wyznaczyć mu termin, a po bezskutecznym tegoż upływie zarządzić tępienie kanianki i ostów na koszt opieszałego.

§ 3. W ostatnim wypadku ulegnie opieszały grzywnie od 1 do 4 k., a w razie powtórnej opieszałości do wysokości 10 k.; w przypadku niemożliwości płacenia, aresztowi od 1 do 3 dni.

Grzywny wpływają do funduszu ubogich odnośnej gminy.

B. Rozporządzenie c. k. namiestnictwa z 20. sierpnia 1885 względem wykonania powyższej ustawy.

a) O tępieniu kanianki.

§ 2. W miejscach, gdzie okaże się kanianka, należy wszystkie tam znajdujące się rośliny, niemniej rośliny miejsca te okalające, a to w promieniu przynajmniej 30 centymetrowym od miejsc kanianką zagrożonych, przy samej ziemi sierpem zżynać i w kupy układać. Następnie pokrywa się takie miejsca grubą warstwą słomy, na długość jednej stopy pociętej, lub w braku tejże dostateczną ilością wiórów lub chrustu i w ten sposób pali zżętą kaniankę i koniczynę, poczem mają być dotyczące miejsca starannie przekopane.

b) O tępieniu szkodliwych ostów.

§ 6. Obok starannej uprawy roli i użycia czystego nasienia jedynym środkiem tępienia ostów jest wyplewienie ich z korzeniem.

Z początkiem wiosny, gdy osty są jeszcze małe, należy je niszczyć przez dosyć głębokie wykopywanie za pomocą motyki; skoro jednak podrosną, wykopywanie ich byłoby często bardziej szkodliwem, aniżeli pożytecznem, gdyż w ten sposób osty nie dadzą się usunąć z korzeniem, i w takim razie wskazanem jest wyrywanie ostów z korzeniem, która to czynność zaraz po obfitym deszczu bez wielkiej trudności rękami wykonaną być może.

§ 10. Jeżeliby pomimo to na gruntach ornych znajdowały się w czasie żniw osty szkodliwe w większej ilości, naczelnik gminy względnie przełożony obszaru dworskiego ma bacznie czuwać nad tem, aby po zżęciu lub skoszeniu zboża zostały osty na polu pozostawione i tamże spalone.

W żadnym razie nie wolno pozostające na polu osty wyrzucać na drogi polne, soglówki lub miedze, gdyż stąd mogłoby nasienie tej szkodliwej rośliny wszędzie być zawleczone przez wozy, którymi zboże z pola bywa zwożone.

Zwraca się uwagę: na rozporz. c. k. namiestn. z d. 17/4 1896 ***o przymusowem tępieniu myszy polnych***, oraz na pouczenie o postępowaniu, jakie należy zastósować przy tępieniu myszy polnych;

na *ustawę łowiecką* z d. 1 4 1898 (Dz. u. kr. nr 21);

na ustawę z d. 21/12 1874 (Dz. u. kr. nr 10 z r. 1875) wydaną *w celu ochrony zwierząt pożytecznych;*

na *ustawę o rybołowstwie* z dnia 31/10 1887 (Dz. u. kr. nr 37 z r. 1890);

na przepisy prawne, dotyczące *zbierania i sprzedaży grzybów* (Dz. u. p. nr 250 z r. 1850);

na ustawy i przepisy *w sprawach lasowych* (pat. ces. z dnia 3 grudnia 1852);

na ustawy i rozporządzenia *drogowe* (w opracowaniu M. Latoszyńskiego, Lwów 1898);

na nową *ustawę budowlaną* dla wsi i miasteczek z d. 13 paźd. 1889 nr 133 Dz. u. kr.-

na zmianę ustawy z d. 20/6 1888 o cle od płynów wyskokowych pędzonych, o opodatkowaniu *wódki*, jakoteż *wyrobu drożdży*, z wyrobem wódki połączonego. Rozp. ces. z d. 17/7 1899 (Dz. u. p. z 20/7 1899);

na ustawę z d. 25/10 1896 (Dz. u. p. nr 220) *o bezpośrednich podatkach osobistych* wraz z rozporz. wykonawczemi (w opracowaniu Fr. Szymusika. Lwów 1897).

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH.

1. Przy ratowaniu **wisielców, topielców, porażonych słońcem, zmarzniętych** i t. d. zastosowuje się *sztuczne oddychanie*. Jeśli oddychanie ustaje, t. j. jeśli klatka piersiowa przestaje regularnie się podnosić i opadać, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie i to tak: 1. Położyć chorego poziomo na podłodze lub stole, rozpiąć na nim ubranie i podłożyć mu pod plecy surdut zwinięty w wałek; 2. wyciągnąć mu język i przywiązać na brodzie chustką; 3. stanać z tyłu poza chorym, chwycić go obiema rękami za przedramienia poniżej łokcia i ciągnąć je ku sobie poza głowę chorego tak daleko, aż się jego dłonie zetkną. Następnie odprowadzić ramiona chorego tą samą drogą i przycisnąć je mocno, ale ostrożnie, do obu boków klatki piersiowej. Jeśli jest ktoś do pomocy, uciska podczas sztucznego wydechu brzuch obiema dłoniami, przez co wydech staje się silniejszym. Powtarzać te czynności mniej więcej 15 razy na minutę.

2. **Powieszenie lub uduszenie**. Ostrożnie odciąć wisielca, by nie padł na podłogę, usunąć z ciała stryczek (lub inny przedmiot duszący) i zastosować sztuczne oddychanie. Gdy oddech wraca, rozpiąć ubranie i wynieść na świeże powietrze. Użyć środków drażniących skórę, a mianowicie spryskać lub zmywać twarz zimną wodą, octem, wodą kolońską, dawać amoniak do wąchania, nacierać łydki. Gdy do przytomności wraca, podawać rum, koniak, wino, herbatę, kawę i t. d. Gdyby oddechy ustały, znowu rozpocząć sztuczne oddychanie. Nieprzytomnemu nie podawać nic do picia.

3. **Utonięcie**. Rozebrać chorego i wyczyścić mu usta i gardło palcem wskazującym zawiniętym w szmatkę, Ułożyć w poprzek kolan, bić w plecy, by woda wylała się z płuc, zastosować sztuczne oddychanie i nacieranie skóry. Po powrocie do przytomności ciepło przykryć i dać do picia ciepłe napoje, jak herbatę z rumem, kawę, koniak.

4. **Zmarznięcie.** Należy uważać, by zmarzniętego nie przenieść z zimna wprost do ciepła, dalej uważać bardzo przy braniu do ręki kruchych kończyn. Rozebrać na mrozie i nacierać śniegiem lub zimnemi chustami, przenieść do zimnej izby, wykąpać w zimnej wodzie; jeśli oddechy ustają, zastosować sztuczne oddychanie, włożyć do zimnego łóżka, dawać zimne napoje n. p. czarną kawę, rum. Po pewnym czasie dopiero przenieść do ciepłego pokoju i podawać ciepłe napoje. Opatrunek ran z odmrożenia jak ran sparzelinowych. Nagłe ogrzanie może wywołać natychmiastową śmierć.

5. **Udar słoneczny.** Położyć chorego w cieniu, podeprzeć plecy, zlewać wodą, dawać zimną wodę do picia. Sztuczne oddychanie.

6. **Poparzenie.** Ogarnięty płomieniem nie uciekaj, lecz rzuć się na ziemię i tarzaj się. Jeśli zobaczysz człowieka w płomieniach, rzuć go na ziemię, przykryj poduszkami, ubraniem, kocami, co masz pod ręką, i tarzaj go po ziemi, następnie należy oblać go obficie wodą, ubranie i buty porozcinać, a nie zsuwać, potem opatrzeć go, a mianowicie maścią jodoformową, borową, wazeliną, oliwą, a na to watę i chustkę; w razie potrzeby pęcherze przebić igłą, którą przedtem w ogniu rozżarzono i ostudzono, a następnie daje się na rany opatrunek antiseptyczny. Jeśli brak opatrunku antiseptycznego, wystarcza pokryć ranę watą i zawiązać czystą chustką, a nie zanieczyszczać rany mąką, ziemniakami, gliną i t. p. przedmiotami.

7. **Ukąszenie przez psy wściekłe, żmije i t. p.** Przy ukąszeniu przez psy wściekłe lub żmije należy szybko ściągnąć sznurem lub t. p. zranioną część ciała powyżej rany, t. j. między raną a sercem, aby jad nie dostał się do obiegu krwi, nacierać w kierunku od miejsca ściągniętego sznurem ku ranie (by wycisnąć jad), wypalić ranę rozżarzonymi metalami, n. p. gwoździem, drutem lub zapalonem cygarem albo kwasami żrącymi jak siarkowym, azotowym, solnym. Przy ukąszeniu przez żmiję najlepiej wypalić amoniakiem. Po wypaleniu zdjąć opaskę. Podawać napoje wyskokowe. Po ukąszeniu przez owady najlepiej puścić kroplę amoniaku na rankę.

8. **Złamanie kości i zwichnięcie.** Opatrunek tymczasowy: owinąć kończynę miękiemi materyami jak watą, konopiami, trawą, mchem, sianem, szmatami; założyć jedną szynę na wewnątrz, drugą na zewnątrz. Szyny należy wysłać miękim materyałem; za szyny mogą służyć deszczułki, linie, oprawki z książek, tektura, pudełka, laski, parasole, gałęzie, kora z drzew i t. p.; przywiązać szyny opaskami, chustkami, szpagatem, szelkami i t. p.; ustawić spokojnie złamaną kończynę. Przy zwichnięciach zimne okłady jak i przy złamaniu.

9. **Krwotoki.** Rany nie przemywać, lecz ją silnie ścisnąć. Jeśli to nie wystarcza, przywiązać zwierzchu mocno jakiś naciskający przedmiot (guzik, czysty kamyk). Lub związać około krwawiącej kończyny chustkę, włożyć laskę lub patyk i silnie skręcić. Przy krwotokach z żołądka zimne okłady, spokój, pozycya leżąca.

10. **Rany.** Zatamować przedewszystkiem **krwotok** (patrz Nr. 9). Umyć sobie ręce wodą ciepłą, mydłem i szczotką, następnie płynem przeciwgnilnym (antiseptycznym). Oczyścić okolicę rany watą zamaczaną w płynie przeciwgnilnym. Oblać ranę tymże płynem. Posypać ranę cieniutką warstwą proszku przeciwgnilnego (jodoform, dermatol). Pokryć ranę poczwórną warstwą gazy przeciw-

gnilnej (jodoformowej, dermatolowej). Nie wolno usuwać skrzepów z ran. Płyny przeciwgnilne są: 1% woda lysolu, 3% woda karbolowa, i $^1/_{10}$% woda sublimatowa, od biedy czysta gotowana lub studzienna woda. Nie zanieczyszczać rany. W braku materyi przeciwgnilnych można użyć zupełnie czystej chustki do pokrycia rany.

11. **Otrucia** Wzbudzać sztucznie wymioty przez łechtanie podniebienia, picie letniej wody z solą, masłem, musztardą. Następnie dawać pić mleko i dawać w razie zatrucia *jadowitemi roślinami* grzybami, morfiną, opium — kawę czarną bardzo mocną. Wstrząsać chorym, by mu nie dawać omdleć. Głowę zlewać zimną wodą. Synapizmy (chrzan, gorczycę) kłaść na serce i żołądek. W razie potrzeby sztuczne oddychanie. *Fosforem* (zapałkami) magnezya palona, stara terpentyna z wodą (nigdy tłuszcze!). *Kwasami* soda, potaż, magnezya, woda wapienna.

Uwagi i wskazówki z zakresu mleczarstwa

podał **dr Tadeusz Rylski**, kraj. inspektor mleczarstwa.

Zapłata dostawcom za mleko może się odbywać:

1) według stałej ceny za litr lub kilogram;

2) według zawartości tłuszczu;

3) według ilości masła (Butterantheile), którą z danego mleka wyrobić można.

1) Płacenie według umówionej z góry ceny za jednostkę wagi lub miary mleka — u nas przeważnie wprowadzone — jest najłatwiejsze do obliczenia, ale zupełnie niewłaściwe, gdyż np. ze 100 litrów mleka o 2·5% tłuszczu otrzymujemy 2·69 kg. masła, z tej samej zaś ilości mleka o 4·0% tłuszczu 4·49 kg. masła, czyli więcej o 1·80 kg., płacimy zaś jednakowo.

2) Sposób płacenia według zawartości tłuszczu jest dwojaki: a) Za litr (lub kilogram) mleka o oznaczonej zawartości tłuszczu płaci odbiorca stałą umówioną cenę, za mleko zaś o niższej lub wyższej zawartości odpowiednio mniej lub więcej np.: za mleko o 3·25—3·50% tłuszczu przyjęto cenę 8 groszy za litr, za każdy zaś $^1/_4$% mniej lub więcej o $^1/_2$ gr. Stosownie do tego należałoby zapłacić za mleko o 2·8% tłuszczu — 7 groszy, za mleko o 3·65% tłuszczu — 9 groszy. b) Oznacza się cenę za kiloprocent tłuszczu. Pod kilo-procentem tłuszczu rozumie się procent tłuszczu w kilogramie mleka, np. mleko o zawartości tłuszczu 3·7% ma 3·7 kiloprocentów tłuszczu.

Przedewszystkiem obliczyć należy cenę, którą za kiloprocent mleczarnia płacić może. Postępuje się w następujący sposób: Obliczono, że np. w roku zeszłym dostarczono 216.290 litrów mleka o przeciętnej zawartości tłuszczu 3·319%; ilość kiloprocentów wynosiła (216.290 × 3·319) = 717.923·46. Cały czysty dochód wynosił 21.252 koron, można zatem ofiarować dostawcom za kiloprocent tłuszczu (21.252 : 717923·46) = 2·96 grosza, przeciętna więc cena w powyższym wypadku za litr mleka wynosić będzie: 3·319 × 2·96 = 9·824 grosza.

(Na tej podstawie zestawiono dokładne tabele dozwalające ze znanej zawartości tłuszczu i ceny przyjętej za kiloprocent odczytać należytość za 1 kg. mleka (W. Mund: Die Bezahlung der Milch nach Fett-Prozenten. Bremen 1896 i inne).

Jest to sposób płacenia za mleko sprawiedliwszy jak poprzedni, jednak jeszcze niedoskonały. Wadą jego jest to, że na podstawie tego rachunku mleko ubogie w tłuszcz płaci się stosunkowo drożej jak tłuste. Najsprawiedliwszym sposobem płacenia jest:

3) **w stosunku do wyrobionego masła** (Butterantheile). Jeżeli więc np. dostawca A. dostarczał mleko o przeciętnej zawartości tłuszczu 3%, to ze 100 litrów mleka otrzymano masła 3·29 kg. (tabela str. 401), czyli **udziałów w maśle** należy mu policzyć 3·29 (za 100 litrów mleka). Pozostaje więc tylko oznaczenie ceny za jeden udział, co wykonuje się w podobny sposób jak przy kiloprocentach. (Tabele: W. Helm: »Tabelle für die Bezahlung der Milch nach Gewicht und Fettgehalt«. Mieck-Prenclau: Julius Frost: »Die Bezahlung von Milch und Rahm nach Butterantheilen«. Heinsius-Leipzig 1901).

Oznaczenie procentowej zawartości tłuszczu w śmietanie.

Znając zawartość tłuszczu w mleku i ilość litrów śmietany, otrzymanej ze 100 litrów mleka, możemy obliczyć zawartość tłuszczu w śmietanie na podstawie następującej formuły:

$$\frac{T - 0.20}{S} \times 100 = Ts.$$

(T = % tłuszczu w mleku: 0.20 = przeciętny % tłuszczu w mleku zbieranem: S = ilość śmietany; Ts = % tłuszczu w śmietanie).

Odtłuszczenie i rozwodnienie mleka.

Poniżej (str. 402) umieszczona tabela pozwala nam z wszelkiem prawdopodobieństwem stwierdzić, czy dane mleko jest normalne, czy też zostało sfałszowane przez rozwodnienie lub odtłuszczenie. Mleko odtłuszczone posiada ciężar gatunkowy większy. Dodatek wody obniża ciężar gatunkowy mleka.

Nazwy: »*zwykłe*«, »*rozwodnione*« i »*odtłuszczone*« są jasne i nie potrzebują bliższego wyjaśnienia. Pod »*wątpliwem*« rozumie się mleko, posiadające niezwykle nizki c. g. lub niezwykle małą zawartość tłuszczu — nie do tego jednak stopnia, aby je określić jako sfałszowane.

Pod »*nieodpowiedniem*« należy rozumieć mleko niefałszowane ale o zbyt nizkiej zawartości tłuszczu.

Wreszcie jako „*możliwe*“ uważa się takie, które zawiera dostateczną ilość tłuszczu i suchej masy odtłuszczonej, ale odznacza się nienormalnym stosunkiem w składzie suchej masy lub nienormalnym ciężarem gatunkowym.

Obliczenie wydatku masła z danej ilości mleka.


Ilość masła można obliczyć według formuły Hittcher'a: M = 1·2 T — 0·31.

(M = ilość masła za 100 ltr. mleka; T = % tłuszczu w mleku pełnem).

Na podstawie tej ostatniej formuły zestawiono następującą tabelkę (ilość masła podana w kg.).

Ilość mleka w kg.	Zawartość tłuszczu w mleku:														
	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
	Ilość masła, którą otrzymać można:														
10	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43
20	0.54	0.56	0.58	0.61	0.63	0.66	0.68	0.70	0.73	0.75	0.78	0.80	0.82	0,85	0,87
30	0.80	0.84	0.88	0.91	0.95	0.98	1.02	1.06	1.09	1.13	1.16	1.20	1.24	1.27	1.31
40	1.07	1.12	1.17	1.22	1.27	1.31	1.36	1.41	1.46	1.51	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75
50	1.34	1.40	1.46	1.52	2.58	1.64	1.70	1.76	1.82	.88	1.44	2.00	2.06	2.12	2.18
60	1.61	1.68	1.76	1.83	1.90	1.92	2.04	2.12	2.19	2.26	2.33	2.40	2.48	2,55	2,62
70	1.88	1.96	2.05	2.13	2.22	2.30	2.38	2.47	2.55	2.64	2.72	2.80	2.89	2.97	3,06
80	2.15	2.25	2.34	2.44	2.53	2.63	2.73	2.82	2.92	3.01	3.11	3.21	3.30	3.40	3,49
90	2.42	2.53	2.63	2.74	2.85	2.96	3.07	3.17	3.28	3.39	3.50	3.61	3.71	3.82	3,93
100	2.69	2.81	2.93	3.05	3.17	3.29	3.41	3.53	3.65	3.77	3.89	4.01	4.13	4,25	4,37
1 kg. masła = kg. ml.	37.08	35.58	34.14	32.78	31.54	30.40	29.32	28.32	27.38	26.52	25.70	24.94	24.22	23.52	22.88

Ciężar gatunkowy od 1.024 do 1.037.



Uwagi i wskazówki z zakresu gorzelnictwa.

Podał inż. Zygmunt Chmielewski,
asystent kraj. Stacyi chem. rolniczej w Dublanach.

1) **Woda.** Woda używana w gorzelni przedewszystkiem powinna być wolną od gnijących materyi organicznych i szkodliwych drobnoustrojów; woda nie odpowiadająca temu warunkowi nie nadaje się do przygotowania zacierku drożdżowego, moczenia słodu i sporządzania zacieru. Woda przeznaczona do kotła powinna być miękką, gdyż w przeciwnym razie spowodowuje obfite nagromadzenie się kamienia, i wskutek tego musimy używać większe (nieraz o 40%) ilości opału.

2) **Produkty surowe.** a) Ziemniaki zawierają od 9 do 29% skrobi (zawartość pozostałych składników p. str. 291 i 330). Oznaczenie skrobi najlepiej wykonywać na wadze dziesiętnej Reimana (p. str. 384 i 385), zachowując temperaturę wody 14° R; dokładność ± 1%.

b) Ziarna zbożowe. Dane co do składników na str. 288 i 329 należy uzupełnić zawartością skrobi: *jęczmień* 48·5—68.0, *średnio 54.2%*; *proso* 62.0—68.0%; *żyto* 49.5—68.0, *średnio 56.4%*; *owies* 45.0—62.0, *średnio 55.0%*; *pszenica* 49.0—75.0, *średnio 55.9%*; *kukurudza* świeża 50.0—60.0, *średnio 56.0*, stara 55.0—65.0, *średnio 60.0%*.

3) **Przygotowanie słodu.** Ze względu na konieczność utrzymywania wzorowej czystości podłoga w słodowni powinna być zrobiona z asfaltu, cementu, w najgorszym razie z cegieł spajanych asfaltem lub cementem i mieć wymiary odpowiadające 25 m² na 1000 kg. zacieranych ziemniaków, ściany zaś pomalowane olejną farbą lub smołą (2 części mazi pogazowej i 2½ części asfaltu). Wycementowana zalewnia powinna mieć wymiary odpowiadające 3 l. na każdy 1 kg. moczonego ziarna. Temperatura w słodowni przy prowadzeniu długiego słodu powinna wynosić około 8° R.

Ilość słodu: na każde 100 kg. ziemniaków trzeba przygotować 3—4 kg. wyborowego długiego słodu (co odpowiada 2—2⅔ kg. jęczmienia), a 4—6 kg. gorszego słodu (2⅔—4 kg. jęczmienia); na każde 100 kg. żyta lub kukurudzy słodu trzy razy więcej jak wyżej.

Jęczmień przeznaczony na słód: najkorzystniej brać cztero lub sześcio rzędowy, drobnoziarnisty i dokładnie przesortowany na trieurze, by mieć do czynienia z ziarnami jednej wielkości. Przed moczeniem należy go dobrze wyczyścić na młynku. Na 100 ziarn powinno co najmniej 95 kiełkować (100 ziarn umieścić w odpowiednio złożony wilgotny ręcznik i po 3—5 dniach przeliczyć skiełkowane): należy używać jęczmień niezbyt młody (co najmniej 4-tygodniowy po zbiorze) i niezbyt stary (dwuletni np. ma już siłę kiełkowania 80—85%); waga 1 l. powinna wynosić 6·3—6·5 kg.

Moczenie. Wsypuje się ziarno do zalewni, dopuszcza dostateczną ilość wody, miesza dokładnie, po ½ godzinie spławki usuwa i odpuszcza wodę, zalewa świeżą, dodaje mleko wapienne (na każde 100 litrów wody w zalewni rozpuścić w od

dzielnem naczyniu 0·4 kg. wapna palonego) i miesza. Po 6 godzinach odmywa się dokładnie z wapna, przerzuca do drugiej zalewni dla zetknięcia z powietrzem, zalewa na 6 godzin, 6 godzin trzyma bez wody, i tak na zmianę, aż ziarno ustawione na długość między palcami daje się ścisnąć nie kłując, przyczem plewa pęka i oddziela się od ziarna. Wogóle lepiej jest w zalewni ziarno nie domoczyć niż przemoczyć. Temperatura wody w zalewni (4—10° R) wpływa na długość moczenia (70—100 godzin).

Rostkowanie. Dostatecznie wymoczone ziarno składa się na kupkę wysokości 40—45 cm., po 3—6 godz. (temp. 10—11° R), rozrzuca na grzędy 15—20 cm. (temp. 11—12 R) i przerabia co 8—10 godz. na grzędy coraz niższe aż do 6 cm. (temp. najwyżej 13° R), przyczem skąpo polewa od czasu do czasu wodą o temp. 13° R. Rostkowanie prowadzi się tak długo (15—22 dni), aż korzonki dosięgną $1^1/_2$, a kiełek najmniej 3 długości ziarna. Gotowy słód rozsypuje się dosyć cienko, aby owiędł i przestał rostkować.

100 kg. jęczmienia daje około 160 kg. zielonego słodu.

Gniecenie słodu. Należy słód dokładnie rozmiażdżyć przez dwukrotne przepuszczenie go przez gniotownik, co uskutecznia się bezpośrednio przed sporządzeniem zacieru (by uchronić od działania drobnoustrojów). Gniotownik powinien być natychmiast po ukończonej robocie starannie obmyty.

4) **Przygotowanie zacierku drożdżowego.** Drożdżarnia powinna mieć podłogę wycementowaną o spadku 1—2 cm. na każdy 1 m. ściany pomalowane olejno lub smołą, dobry piec, utrzymujący możliwie stałą temperaturę 18—20° R. i wreszcie rury doprowadzające wodę i parę. Kadki do zacierku z dębowego drzewa utrzymuje się we wzorowej czystości przez wyparzanie parą po każdem użyciu i smarowanie kwaśnym siarczynem wapniowym w razie podejrzanego zakażenia. Kadki odstawione od roboty należy dokładnie wywapnować.

W celu przygotowania pierwszego zacierku w kampanii do dokładnie wyparzonej kadki wsypuje się mąkę żytnią ($1—1^1/_2$ kg. na każde 100 kg. ziemniaków), zalewa letnią wodą, rozbija w ciągu 10 minut dokładnie wiosłami, ogrzewa wiosłem parowem lub wężownicą z parą do 64° R, po $^1/_2$ godz. (temp. 52° R) dodaje słód (ilość odpowiadająca na wagę 12% ilości zacieranej skrobi w ziemniakach, co przeciętnie wynosi $1^1/_2$—2 kg. słodu na 100 kg. ziemniaków), podgrzewa do 52° R, po 2 godzinach (po scukrowaniu) ochładza do 44° R. wlewa czystą kulturę kwasu mlekowego (adres: Hefezuchtanstalt, Berlin, Seestrasse 4; cena flaszeczki 1 marka) i, podegrzewając co 3—4 godziny, starannie utrzymuje w przykrytej kadce temp. 40—44° R. Gdy po 16—18 godz. kwasowość zacierku wynosi 1·5—2°, odbiera się 1—2 l. w celu zakwaszenia następnego, a zacierek ogrzewa do 65° R w celu zabicia szkodliwych drobnoustrojów.

Przygotowanie dalszych zacierków: słód (ilość patrz wyżej) wsypuje się do dobrze wyparzonej kadki, rozbija z małą ilością wody (52° R), wlewa przecedzony słodki zacier (tyle, by ostatecznie gęstość wyniosła około 20° Bal.), podgrzewa do 52° R, po 2 godz. ochładza do 44° R, dodaje zakwaskę z poprzedniego zacierku i dalej postępuje jak wyżej.

5) **Sporządzanie drożdży.** Przygotowany i wyjałowiony zacierek po upływie godziny z pomocą wężownicy chłodzącej ochładza

się do 15° R i dodaje rozbite na mleczko drożdże t. zw. rasy XII (na 1000 kg. zacieru z ziemniaków $^{2}/_{3}$—$^{3}/_{4}$ kg; adres jak wyżej; cena 5 mar. za 1 kg.). Po 20—24 godz. temperatura podnosi się do 21—23° R; gdy drożdże odfermentowały z 18—20° B (p. saccharometrya) na 5—6° B, odbiera się z nich mniej więcej $^{1}/_{10}$ część dla przeszczepienia w następnym zacierku, co uskutecznia się możliwie niezwłocznie, lub, w razie niemożności przeniesienia drożdży zadatkowych bezpośrednio do przygotowanego zacierku, wlewa się do miedzianego »mateczuika« i w temp. 6—8° R przechowuje do chwili zadania następnego zacierku. Przy sporządzaniu następnych drożdży wyjałowiony zacierek ochładza się do 20° R, dodaje »matkę«, ochładza do temp. 13$^{1}/_{2}$—15° R (jeśli zawartość skrobi niższa, temp. ustawiania drożdży powinna być wyższa i odwrotnie) i po należytem sfermentowaniu odbiera jak wyżej matkę.

Bardzo ważnem przy sporządzaniu drożdży jest unikanie t. zw. martwych punktów t. j. prowadzenje roboty w ten sposób, by matka nie stała w mateczniku, lecz zaraz była użyta do zadania następnych drożdży. Prócz stopnia odfermentowania ważną wskazówką należytego biegu roboty jest wzrost kwasowości, który przeciętnie wynosi 0·2 (najwyżej 0·3°), a który trzeba bezwarunkowo codziennie badać.

6a) **Parowanie ziemniaków** jest dosyć umiejętnie wykonywane w naszych gorzelniach. Zalecić tutaj jedynie można w tych wypadkach, gdy się ma do czynienia z nisko procentowymi ziemniakami, odpuszczanie wody płodowej, co stanowi jeden ze skutecznych środków opanowywania pienistej fermentacyi.

Ziemniaki zmarznięte gotuje się w parniku $^{3}/_{4}$—1 godziny przy otwartym wlazie, a potem $^{1}/_{4}$—$^{1}/_{2}$ godz. paruje przy 2$^{1}/_{2}$ atm. Wyciskanie naogół ziemniaków, uparowanych do barwy słomkowej (nie białej i nie brunatno-czerwonej!), powinno się odbywać pod ciśnieniem 3$^{1}/_{2}$ atm., gdyż wtedy tylko masa będzie należycie rozdrobnioną.

6b) **Parowanie kukurudzy lub żyta.** Do parnika Henzego wlewa się wodę (140—160 l. na 100 kg. kukurudzy, 160—200 l. na 100 kg. żyta), zagotowuje i, ciągle mieszając, wsypuje ziarno bardzo wolno, zwracając pilnie uwagę, by gotowanie i krążenie płynu nie ustawało ani na chwilę. Poczem przy lekko otwartym wentylu gotuje 1$^{1}/_{2}$ godziny (ciśnienie pod koniec 2$^{1}/_{2}$—3$^{1}/_{2}$ atm.), przy zamkniętym wentylu paruje $^{1}/_{2}$—1 godziny przy 3$^{1}/_{2}$—4 atm. i wyciska z parnika.

7) **Zacieranie.** Z chwilą rozpoczęcia parowania ziemniaków, sypie się do kadzi zaciernej potrzebną ilość słodu (2—3 kg. na 100 kg ziemniaków, 6—15 kg. na 100 kg. ziarna) i rozbija z wodą na gęste mleczko. Uparowane ziemniaki wpuszcza się do kadzi z taką szybkością, by temperatura w kadzi szybko podniosła się do 40° R. i możliwie najdłużej utrzymywała przy 42—46°; gdy zejdzie $^{3}/_{4}$ zawartości parnika, resztą doparza się zacier do 51—52°, odbiera potrzebną ilość l. na zacierek (p. wyżej), po $^{1}/_{2}$ godzinie schładza szybko do 24° R., dodaje drożdże, szybko schładza do temperatury ustawienia (12—16° R) i przenosi robotę do kadzi fermentacyjnej.. Jeśli kadź zacierna działa nienależycie i wskutek tego ma miejsce częściowe przeparzanie się słodu, przed wpuszczeniem ziemniaków daje się do kadzi tylko $^{1}/_{3}$ słodu, drugą część przy 40° i trzecią przy 51°.

Po skończonem zacieraniu kadź zacierna i przewód do ka-

dzi ferm. powinny być spłukane, a kadź zacierna jeszcze należycie wymyta szczotką i wyparzona.

8) **Fermentacya**. Sala fermentacyjna powinna mieć podłogę wyasfaltowaną lub z cegieł spajanych asfaltem, o należytym spadku, ściany pomalowane olejno lub smołą, możliwie stałą temp. 10—12° R. i świeże czyste powietrze (wentylacya dolna). Kadzie fermentacyjne po każdorazowem użyciu należy staranie wyszorować szczotką, potem wysmarować wapnem gaszonem, a od czasu do czasu kwaśnym siarczynem wapniowym i przed ponownem użyciem ponownie spłukać i wymyć.

W przebiegu fermentacyi odróżniamy trzy okresy: początkowy (rozmnażanie się drożdży), środkowy (sfermentowanie wytworzonego cukru słodowego) i końcowy (przeróbka dekstryn). Okres początkowy, w którym chodzi o wytworzenie największej ilości drożdży, powinien trwać możliwie najdłużej (a więc około 24 godz.), co się osiąga: 1) przez odpowiednie obniżenie temperatury spuszczenia do kadzi i 2) przez łączenie z drożdżami słodkiego zacieru przy 22—24° R. i przez następne ochłodzenie do temp. spuszczenia.

W okresie głównym należy zwracać uwagę na nieprzekroczenie temp. 24° R., najkorzystniejszej dla działania drożdży; w razie jej podwyższenia dolewa się odpowiednią ilość chłodnej a czystej wody i dokładnie miesza. Fermentacya pienista, o ile nie wynika z właściwości użytych surowych produktów, jest dowodem energicznej pracy drożdży. Gdy chodzi o opanowanie zbyt silnego pienienia się kadzi, należy stosować następujące środki: 1) polewanie zacieru olejem, 2) daleko idące (do 3—4° B.) sfermentowanie drożdży i 3) słabe scukrowanie zacieru w kadzi zaciernej przez użycie części ($^1/_3$) zwyczajnej porcyi słodu i dodanie reszty pod koniec chłodzenia; główne działanie diastazy występuje wówczas w okresie końcowym fermentacyi.

Okres końcowy fermentacyi powinien być otoczony szczególną pieczą, gdyż od jego przebiegu w największym stopniu jest zależny wydatek alkoholu: dekstryny muszą tutaj zmienić się pod wpływem diastazy w cukier, a ten ma być przez drożdże przerobiony na alkohol. Niezbędnem jest tutaj utrzymanie temp. 20—22° R. najkorzystniejszej dla działania drożdży i diastazy. W razie stygnięcia kadzi poniżej tej temp. (stępienie drożdży wskutek znacznej zawartości alkoholu) dolewa się odpowiednią ilość ciepłej wody i silnie miesza.

9) **Odpęd**. Aparaty odpędowe o działaniu przerywanem (Pistoryusza, Galla itp.), jakkolwiek u nas bardzo rozpowszechnione, są wielce nieekonomiczne, gdyż zużywają niepomiernie dużo pary i dają gorszy produkt. Dla oceny aparatów ciągłych mogą służyć następujące wskazówki: 1) ilość zużywanej pary można w przybliżeniu określić z ilości otrzymywanego wywaru — ze 100 l. roboty powinno być 110—120 l. wywaru; 2) zużycie wody: na 100 l. roboty powinno wypadać 75—100 l. wody chłodzącej o temp. początkowej 8° R.; 3) wywar nie powinien zawierać alkoholu i 4) alkohol odpędzony powinien mieć conajmniej 90°.

10) **Badanie przebiegu roboty**. a) Saccharometrya. Saccharometr Ballinga wskazuje gęstość płynu. Wskazanie sacchar. jest prawdziwem tylko dla temp. 14° R., trzeba zatem odpowiednio ogrzać lub ochłodzić badany przesączony płyn; w ostateczności można otrzymać przybliżone oznaczenie przez dodanie lub odjęcie od wskazania sacchar. po 0·1° na każde 2° różnicy od

14° R. Sacchar. przed użyciem powinien być czysty i suchy, i należy zanurzać go powoli. W 100 częściach ekstraktu, wykazanego przez sacchar., znajduje się ciał mogących uledz fermentacyi: w zacierach z bardzo wysoko procentowych ziemniaków średnio 90 (86—92), z wysoko procentowych 85 (83—86), średnioprocentowych 82 (80—85), w zacierach kukurudzianych 90—91, w żytnich 84—87.

b) Oznaczenie kwasowości uskutecznia się z pomocą kwasomierza. Do 20 cm³ przesączonego zacieru, mieszając pałeczką, dopuszcza się z biuretki kwasomierza po kropelce ług normalny tak długo, aż kropla badanego płynu nie zabarwia papierka lakmusowego na różowo. 1 cm³ ługu odpowiada 0·09 gr. kwasu mlekowego, 0·06 octowego, 0·049 siarkowego i oznacza 1° kwasowości. Oznaczenie kwasowości powinno być bezwarunkowo codziennie dokonywane: po całkowitem ukwaszeniu zacierku i w gotowych drożdżach (wzrost kwasowości żaden, albo 0·2°, najwyżej 0·3°), w nastawionym do fermentowania zacierze (0·4—0·5) i w odfermentowanym (0·6—0·8°). Im mniejszy jest wzrost kwasowości, tem lepsze jest odfermentowanie.

c) Oznaczenie alkoholu w odfermentowanym zacierze. 100 cm³ przecedzonego zacieru miesza się ze 100 cm³ wody, wlewa do kolbki na ½ l. łączy kolbkę z chłodnicą, oddestylowuje dokładnie 100 cm³ i w nich przy pomocy małego dokładnego alkoholometru oznacza zawartość alkoholu.

11) **Obliczanie wydatku alkoholu.** Według teoryi z 1 kg. skrobi powinno się otrzymać 71·61 l. % = 716.1 cm³ alkoholu. W praktyce otrzymuje się z 1 kg. skrobi: przy znośnej robocie 56 l. % (= 78% wydatku teoretycznego), przy dobrej 58 l. % (81%), przy doskonałej 60 l. % (84%), w wyjątkowych wypadkach 62 l. % alkoholu (86%). Wydatek oblicza się w stosunku do ilości zatartej skrobi, do czego niezbędnem jest codzienne oznaczanie skrobi w zacieranym surowym produkcie. Np. zatarto 2000 kg. ziemniaków o zawartości 18% skrobi tj. 360 kg. skrobi i 80 kg. słodu (o przeciętnej zawartości 40% skrobi) tj. 32 kg. skrobi, razem 392 kg. skrobi; otrzymano 23520 absolutnego alkoholu, wydatek zatem wynosi $\frac{23520}{392} = 60$ l. % z 1 kg. skrobi. Wydatek alkoholu można też obliczać z ilości odfermentowanych stopni saccharometrycznych, jak to uwidacznia następujący przykład: początkowa zawartość cukru = 18·5° B., po odfermentowaniu w przesączonym zacierze = 1·5° B., ilość odfermentowanych stopni zatem = 17·0° B. Według niżej podanego zestawienia odfermentowaniu 17·0° B. odpowiada zawartość 9·18% alkoholu. Jeżeli mamy 2400 l. zacieru, to przedewszystkiem od tej objętości należy odciągnąć objętość łupin (2% dla wysokoprocentowych ziemniaków lub kukurudzy o cienkiej łusce, 3½% dla średnioprocentowych ziemniaków lub kukurudzy o grubej łusce i 5% dla niskoprocentowych ziemniaków, jęczmienia itp.); odejmijmy np. 3½ : 2400 — 84 = 2316 l. 2316 × 9·18 = 21260 l. % alkoholu.

Odfermentowaniu 20° B. odpowiada w przesączonym zacierze zawartość 10·96% alkoh., 19°—10·35%, 18°—9·77%, 17°—9·18%, 16°—8·59%, 15°—8·03%, 14°—7·45%, 13°—6·89%, 12°—6·32%, 11°—5·78%, 10°—5·22%. Tabelka ta odpowiada zacierom gęstym: w zacierach rzadszych u nas praktykowanych na 1° odfermentowania wypada cokolwiek mniejsza ilość alkoholu.

I. TABLICA

oczekiwanych wydatków z produktów surowych.

100 kilogramów		daje z 1 kg. skrobi przy wydatku		
		60 L%*	58 L%*	56 L%*
		1 %	1 %	1 %
Ziemniaków o	15% skrobi	900	887	840
»	18% »	1080	1044	1008
»	20% »	1200	1160	1120
»	22% »	1320	1276	1232
»	24% »	1440	1392	1344
Słodu jęczm.	50% »	3000	2900	2800
Kukurudzy	60% »	3600	3480	3360
Żyta	56% »	3360	3248	3136
»	50% »	3000	2900	2800
Prosa	62% »	3720	3596	3472
»	68% »	4080	3944	3808

*) 1 L% = 10 cm^3, czyli $^1/_{100}$ litra absolutnego alkoholu.

II. *Tabela do dokładnego obliczenia procentów okowity.*

Temperatura podług Reaum.	Alkoholometr wskazuje procentów: 71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
	Rzeczywista siła w procentach																								
—5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.5	98.0	99.0
4	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	84.5	85.5	86.5	87.5	88.5	89.5	90.5	91.0	92.0	93.0	94.0	94.5	95.5	96.5	97.0	98.0	99.0
3	77.0	78.0	79.0	79.5	80.5	81.5	82.5	83.5	84.5	85.5	86.5	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	92.5	93.5	94.5	95.5	96.0	97.0	98.0	98.5
2	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.5	94.0	95.0	96.0	97.0	97.5	98.5
1	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	84.5	85.5	86.5	87.5	88.5	89.5	90.5	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.5	98.3
0	75.8	76.7	77.7	78.6	79.6	80.5	81.5	82.4	83.4	84.4	85.3	86.3	87.2	88.1	89.1	90.0	90.9	91.9	92.8	93.7	94.6	95.4	96.3	97.2	98.1
+1	75.4	76.4	77.3	78.3	79.2	80.2	81.1	82.1	83.1	84.0	85.0	85.9	86.9	87.8	88.8	89.7	90.6	91.6	92.5	93.4	94.3	95.2	96.1	97.0	97.8
2	75.0	76.0	76.9	77.9	78.9	79.8	80.8	81.8	82.7	83.7	84.6	85.6	86.6	87.5	88.5	89.4	90.3	91.3	92.2	93.1	94.0	94.9	95.8	96.7	97.6
3	74.7	75.6	76.6	77.5	78.5	79.5	80.4	81.4	82.4	83.3	84.3	85.3	86.2	87.2	88.1	89.1	90.0	91.0	91.9	92.8	93.8	94.7	95.6	96.5	97.4
4	74.3	75.2	76.2	77.2	78.2	79.1	80.1	81.1	82.0	83.0	84.0	84.9	85.9	86.9	87.8	88.8	89.7	90.7	91.6	92.5	93.5	94.4	95.3	96.2	97.1
5	73.9	74.9	75.8	76.8	77.8	78.8	79.7	80.7	81.7	82.7	83.6	84.6	85.6	86.5	87.5	88.5	89.4	90.4	91.3	92.3	93.2	94.1	95.1	96.0	96.9
6	73.5	74.5	75.5	76.4	77.4	78.4	79.4	80.4	81.3	82.3	83.3	84.3	85.2	86.2	87.2	88.1	89.1	90.1	91.0	92.0	92.9	93.9	94.8	85.7	96.7
7	73.1	74.1	75.1	76.1	77.1	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	82.9	83.9	84.9	85.9	86.8	87.8	88.8	89.8	90.7	91.7	92.6	93.6	94.5	95.5	96.4
8	72.8	73.7	74.7	75.7	76.7	77.7	78.6	79.6	80.6	81.6	82.6	83.6	84.6	85.5	86.5	87.5	88.5	89.4	90.4	91.4	92.3	93.3	94.3	95.2	96.2
9	72.4	73.3	74.3	75.3	76.3	77.3	78.3	79.3	80.3	81.2	82.2	83.2	84.2	85.2	86.2	87.2	88.1	89.1	90.1	91.1	92.0	93.0	94.0	94.9	95.9
10	72.0	73.0	73.9	74.9	75.9	76.9	77.9	78.9	79.9	80.9	81.9	82.9	83.9	84.9	85.8	86.8	87.8	88.8	89.8	90.8	91.7	92.7	93.7	94.7	95.6
11	71.6	72.6	73.0	74.6	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5	82.5	83.5	84.5	85.5	86.5	87.5	88.5	89.5	90.5	91.4	92.4	93.4	94.4	95.4
12	71.2	72.2	73.2	74.2	75.2	76.2	77.2	78.2	79.2	80.2	81.2	82.2	83.2	84.2	85.2	86.1	87.1	88.1	89.1	90.1	91.1	92.1	93.1	94.1	95.1
13	70.8	71.8	72.8	73.8	74.8	75.8	76.8	77.8	78.8	79.8	80.8	81.8	82.8	83.8	84.8	85.8	86.8	87.8	88.8	89.8	90.8	91.8	92.8	93.8	94.8
14	70.4	71.4	72.4	73.4	74.4	75.4	76.4	77.4	78.4	79.4	80.4	81.4	82.4	83.4	84.5	85.5	86.5	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.6	94.6
15	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.1	81.1	82.1	83.1	84.1	85.1	86.1	87.1	88.2	89.2	90.2	91.2	92.2	93.3	94.3
16	69.6	70.6	71.6	72.6	73.6	74.6	75.6	76.6	77.7	78.7	79.7	80.7	81.7	82.7	83.7	84.8	85.8	86.8	87.8	88.8	89.9	90.9	91.9	93.0	94.0
17	69.2	70.2	71.2	72.2	73.2	74.2	75.2	76.3	77.3	78.3	79.3	80.3	81.3	82.4	83.4	84.4	85.4	86.4	87.5	88.5	89.5	90.6	91.6	92.7	93.7
18	68.7	69.8	70.8	71.8	72.8	73.8	74.9	75.9	76.9	77.9	78.9	80.0	81.0	82.0	83.0	84.1	85.1	86.1	87.1	88.2	89.2	90.3	91.3	92.4	93.4
19	68.3	69.3	70.4	71.4	72.4	73.4	74.5	75.5	76.5	77.5	78.6	79.6	80.6	81.6	82.7	83.7	84.7	85.8	86.8	87.8	88.9	89.9	91.0	92.1	92.8
20	67.9	68.9	70.0	71.0	72.0	73.1	74.1	75.1	76.1	77.1	78.2	79.2	80.2	81.3	82.3	83.3	84.4	85.4	86.4	87.5	88.5	89.6	90.7	91.7	92.1

III. Tabela do obliczenia zawartości czystego alkoholu

W kg.	69%	69.5%	70%	70.5%	71%	71.5%	72%	72.5%
0.5	38.73	39.07	39.40	39.74	40.08	40.42	40.76	41.10
1	77.47	78.14	78.81	79.48	80.16	80.84	81.52	82.20
2	154.94	156.28	157.62	158.96	160.32	161.68	163.04	164.40
3	232.41	234.42	236.43	238.44	240.48	242.52	244.56	246.60
4	309.88	312.56	315.24	317.92	320.64	323.36	326.08	328.80
5	387.35	390.70	394.05	397.40	400.80	404.20	407.60	411.00
6	464.82	468.84	472.86	476.88	480.96	485.04	489.12	493.20
7	542.29	546.98	551.67	556.36	561.12	565.88	570.64	575.40
8	619.76	625.12	630.48	635.84	641.28	646.72	652.16	657.60
9	697.23	703.26	709.29	715.32	721.44	727.56	733.68	739.80

W kg.	73%	73.5%	74%	74.5%	75%	75.5%	76%	76.5%
0.5	41.44	41.79	42.13	42.48	42.83	43.18	43.53	43.88
1	82.89	83.58	84.27	84.97	85.66	86.36	87.07	87.77
2	165.78	167.16	168.54	169.94	171.32	172.72	174.14	175.54
3	248.67	250.74	252.81	254.91	256.98	259.08	261.21	263.31
4	331.56	334.32	337.08	339.88	342.64	345.44	348.28	351.08
5	414.45	417.90	421.35	424.85	428.30	431.80	435.35	438.85
6	497.34	501.48	505.62	509.82	513.96	518.16	522.42	526.64
7	580.23	585.06	589.89	594.79	599.62	604.52	609.49	614.39
8	663.12	668.64	674.16	679.76	685.28	690.88	696.56	702.16
9	746.01	752.22	758.43	764.73	770.94	777.24	783.63	789.93

W kg.	77%	77.5%	78%	78.5%	79%	79.5%	80%	80.5%
0.5	44.24	44.59	44.95	45.31	45.67	46.03	46.40	46.76
1	88.48	89.19	89.91	90.63	91.35	92.07	92.80	93.53
2	176.96	178.38	179.82	181.26	182.70	184.14	185.60	187.06
3	265.44	267.57	269.73	271.89	274.05	276.21	278.40	280.59
4	353.92	356.76	359.64	362.52	365.40	368.28	371.20	374.12
5	442.40	445.95	449.55	453.15	456.75	460.35	464.00	467.65
6	530.88	535.14	539.46	543.78	548.10	552.42	556.80	561.18
7	619.36	624.33	629.37	634.41	639.45	644.49	649.60	654.71
8	707.84	713.52	719.28	725.04	730.80	736.56	742.40	748.24
9	796.32	802.71	809.19	815.67	822.15	828.63	835.20	841.77

W kg.	81%	81.5%	82%	82.5%	83%	83.5%	84%	84.5%
0.5	47.13	47.50	47.87	48.24	48.61	48.99	49.37	49.75
1	94.26	95.00	95.74	96.49	97.23	97.99	98.74	99.50
2	188.52	190.00	191.48	192.98	194.46	195.98	197.48	199.00
3	282.78	285.00	287.22	289.47	291.69	293.97	296.22	298.50
4	377.04	380.00	382.96	385.96	388.92	391.96	394.96	398.00
5	471.30	475.00	478.70	482.45	486.15	489.95	493.70	497.50
6	565.56	570.00	574.44	578.94	583.38	587.94	592.44	597.00
7	659.82	665.00	670.18	675.43	680.61	685.93	691.18	696.50
8	754.08	760.00	765.92	771.92	777.84	783.92	789.92	796.00
9	848.34	855 00	861.66	868.41	875.07	881.91	888.66	895.50

(litrop.) podług nettowagi i wykazanej rzeczywistej siły okowity.

W kg.	85%	85.5%	86%	86.5%	87%	87.5%	88%	88.5%
0.5	50.13	50.51	50.90	51.29	51.68	52.07	52.47	52.86
1	100.26	101.03	101.81	102.58	103.36	104.15	104.94	105.73
2	200.52	202.06	203.62	205.16	206.72	208.30	209.88	211.46
3	300.78	303.09	305.43	307.74	310.08	312.45	314.82	317.19
4	401.04	404.12	407.24	410.32	413.44	416.60	419.76	422.92
5	501.30	505.15	509.05	512.90	516.80	520.75	524.70	528.65
6	601.56	606.18	610.86	615.48	620.16	624.90	629.64	634.38
7	701.82	707.21	712.67	718.06	723.52	729.05	734.58	740.11
8	802.08	808.24	814.48	820.64	826.88	833.20	839.52	845.84
9	902.34	909.27	916.29	923.22	930.24	937.35	944.46	951.57

W kg.	89%	89.5%	90%	90.5%	91%	91.5%	92%	92.5%
0.5	53.26	53.67	54.07	54.48	54.90	55.31	55.73	56.15
1	106.53	107.34	108.15	108.97	109.80	110.63	111.46	112.31
2	213.06	214.68	216.30	217.94	219.60	221.26	222.92	224.62
3	319.59	322.02	324.45	326.91	329.40	331.89	334.38	336.93
4	426.12	429.36	432.60	435.88	439.20	442.52	445.84	449.24
5	532.65	536.70	540.75	544.85	549.00	553.15	557.30	561.55
6	639.18	644.04	648.90	653.82	658.80	663.78	668.76	673.86
7	745.71	751.38	757.05	762.79	768.60	774.41	780.22	786.17
8	852.24	858.72	865.20	871.76	878.40	885.04	891.68	898.48
9	958.77	966.06	973.35	980.73	988.20	995.67	1003.14	1010.79

W kg.	93%	93.5%	94%	94.5%	95%	95.5%	96%	96.5%
0.5	56.58	57.01	57.44	57.88	58.33	58.78	59.23	59.69
1	113.16	114.02	114.89	115.77	116.66	117.56	118.47	119.39
2	226.32	228.04	229.78	231,54	233.32	235.12	236.94	238.78
3	339.48	342.06	344.67	347.31	349.98	352.68	355.41	358.17
4	452.64	456.08	459.56	463.08	466.64	470.24	473.88	477.56
5	565.80	570.10	574.45	578.85	583.30	587.80	592.35	596.95
6	678.96	684.12	689.34	694.62	699.96	705.36	710.82	716.34
7	792.12	798.14	804.23	810.39	816.62	822.92	829.29	835.73
8	905.28	912.16	919.12	926.16	933.28	940.48	947.76	955.12
9	1018.44	1026.18	1034.01	1041.93	1049.94	1058.04	1066.23	1074.61

W kg.	97%	97.5%	98%	98.5%	99%	99.5%
0.5	60.16	60.63	61.11	61.60	62.10	62.60
1	120.32	121.27	122.03	123.21	124.20	125.21
2	240.64	242.54	244.46	246.42	248.40	250.42
3	360.96	363.81	366.69	369.63	372.60	375.63
4	481.28	485.08	488.92	492.84	496.80	500.84
5	601.60	606.35	611.15	616.05	621.00	626.05
6	721.92	727.62	733.38	739.26	745.20	751.26
7	842.24	848.89	855.61	862.47	869.40	876.47
8	962.56	970.16	977.84	985.68	993.60	1001.68
9	1082.88	1091.43	1100.07	1108.89	1117.80	1126.89

Sposób obliczenia podany na str. 412.

Objaśniający przykład sposobu podobnego wyliczenia. Ile czystego alkoholu zawiera beczka okowity, ważąca netto 437 kg. o sile 88° Trall. przy + 6° Reaumura? Przy takiej pozornej sile okowity i tym stopniu temperatury, podaje II. tabela rzeczywistą siłę okowity na 90° $_{0}$ a ta zaś w odnośnej kolumnie powyższej tabeli wskazuje nam

dla 4 × 100 = 400 kg. — 43260 00 litroproc. (l. %)
» 3 × 10 = 30 kg. — 3244.50 »
7 kg. — 757.05 »

a zatem dla 437 kg. — 47261.55 litroproc. = 472,62 litrom czystego alkoholu.

Wynikające z powyższej tabeli ułamki muszą przy obrachunku być zredukowane w ten sposób, że 0.1 i 0.2 nie uwzględniają się wcale, 0.3, 0.4, 0.6 i 0.7 uważa się jako 0. 5, a 0.8 i 0.9 liczy się jako następną całość.

IV. Ilość paliwa

zużywana przy eksploatacyi dobrego kotła parowego.

Na godzinę zużywa:

Stopień natężenia kotła	Ilość pary z 1 kg. opału	1 metr kwadr. powierzchni ogrzewalnej: zużywa opału	1 metr kwadr. powierzchni ogrzewalnej: daje pary	1 m. kw. pow. rusztów zużywa opału	Rodzaj paliwa
	Kilogr.	Kilogr.	Kilogr.	Kilogr.	
Łagodny	8	2	16.6	70	dobre węgle kamienne szląskie
Średnio natężony .	7	3.3	23.3	90	
Silnie natężony .	6	5	30	110	
Łagodny : . . .	3.3	8.3	10	150	dobry torf prasowany lub drzewo
Średnio natężony .	2.7	8.7	23.3	250	
Silnie natężony .	2.3	12.8	30	400	

V. TABELA PORÓWNAWCZA

skali sacharometru Ballinga w zestawieniu z ciężarem właściwym płynu przy 14° R.

Ciężar właściwy	° Ballinga	Ciężar właściwy	° Ballinga	Ciężar właściwy	° Ballinga	Ciężar właściwy	° Ballinga
1.000	0.00	1.023	5.75	1.047	11.60	1.071	47.25
1.001	0.25	1.024	6.00	1.048	80	1.072	50
1.002	0.50	1.025	25	1.049	12.00	1.073	70
1.003	0.75	1.026	50	1.050	29	1.074	90
1.004	1.00	1.027	65	1.051	50	1.075	18.15
1.005	25	1.028	7.00	1.052	75	1.076	40
1.006	50	1.029	22	1.053	13.00	1.077	60
1.007	75	1.030	46	1.054	25	1.078	80
1.008	2.00	1.031	71	1.055	50	1.079	19.00
1.009	25	1.032	8.00	1.056	72	1.080	27
1.010	50	1.033	20	1.057	14.00	1.081	50
1.011	75	1.034	43	1.058	20	1.082	73
1.012	3.00	1.025	70	1.059	43	1.083	20.00
1.013	25	1.037	9.00	1.060	70	1.084	25
1.014	50	1.038	40	1.061	90	1.085	50
1.015	75	1.039	70	1.062	15.15	1.086	75
1.016	4.00	1.040	10.00	1.063	40	1.087	21.00
1.017	25	1.041	15	1.061	60	1.088	25
1.018	50	1.042	40	1.066	16.00	1.089	50
1.019	75	1.043	62	1 067	30	1.091	75
1.020	5.00	1.044	10.86	1.068	50	1.092	22.00
1.021	25	1.045	11.10	1.069	77		
1.022	50	1.046	33	1.070	17.00		

VI. Wzory dzienników.

I.

Drożdże. *Miesiąc* ....

Data	Drożdżarka	Rodzaj materyału					Temperatura				Sach.		Kwasu		Dodano do kadzi	Uwaga
		słodu	zboża	zacieru	wywaru	wody	po zaturciu	przed chłodzeniem	po odstawieniu	przy odbiorze matki	hołowicy	przy odbiorze matki	w hołowicy	w drożdżach		
	Nr.	kg.		litrów			stopni R.				%		stopni		Nr.	

II.

Zacier główny. *Miesiąc* ....

Data	Sporządzenie zacieru														Wydatek				Uwaga
	Kadź	Zawartość	Materyał surowy					Temperat.			Sach.		kwas w zac. słodkim	kwas w zac. odferment.	ilość spirytusu	zawartość alkoholu	suma procentów litr.	z 1 kg. skrobi	
			ziemn.	zaw. skrobi	zboża	słodu zielon.	suma zat. sk.	zacierania	po odstaw.	zacier og. się	przy odstaw.	po sferm.							
	Nr.	l.	kg.	%	kg.			stopni R.			%		stopni		l.	%		l. %	

ZUŻYTKOWANIE TORFU NA OPAŁ I ŚCIÓŁKĘ.

podał

inż. Z. Chmielewski.

asyst. kr. chem.-roln. Stacyi doświadczalnej w Dublanach.

I. **Zużytkowanie na opał.** 1) **Badanie jakości torfu** najłatwiej i najlepiej uskutecznia się przez oznaczenie wartości opałowej (kalorymetrycznej); wykonywa je Krajowa Stacya chemiczno-rolnicza w Dublanach po cenie 11 kor. od każdej próbki (dla członków T-wa popierania uprawy torfowisk zbadanie 1 pr. bezpłatnie). Przed wysłaniem próbki należy zażądać nadesłania przepisu sposobów jej pobrania.

2) **Obliczanie rozmiarów i wydajności torfowiska.** Na całej przestrzeni torfowiska w odległości 25—50 m. jeden punkt od drugiego za pomocą świdra ziemnego*) mierzy się głębokość pokładu, wiercąc do podłoża; poczem dodaje wartości, otrzymane przez wiercenie, i, dzieląc tę sumę na ilość wierceń, otrzymuje średnią głębokość. Mnożąc średnią głębokość na przestrzeń poznaje się rozmiar torfowiska.

Z kilku, kilkunastu punktów torfowiska pobiera się próbki o postaci kostki 25×25×25 cm. rozkruszone suszy tak, by zawartość wody wynosiła około 20%, waży i, mnożąc wagę na 64, otrzymuje wydajność suchego torfu z 1 m³ surowego. Wreszcie, mnożąc tę liczbę na rozmiar torfowiska w m³ i odliczając ⅓ na straty przy eksploatacyi, poznaje się wydajność torfowiska w kg. lub q. suchego torfu.

3) **Osuszenie torfowiska.** Na torfowisku posiadającem naturalny spadek wód, wykopuje się rów główny (szerokość dna conajmniej 1 m., pochylenie ścian przeciętnie w stosunku 1½:1) wzdłuż najniższej linii; jeśli można, wyzyskuje się w tym celu rzeczkę lub już istniejący kanał. Poczem przeprowadza się sieć rowów bocznych (głębokość ½—¾ pokładu), w miejscach o głębokim pokładzie i mniejszym spadku w odległości 85—175 m. jeden od drugiego, w płytkich i spadzistych 350 m. W gotowych rowach urządza się zastawy, by módz utrzymywać w torfowisku minimalną zawartość 70% wody. Plac przeznaczony dla suszenia osusza się albo siecią rowków (szer. 20 cm., głęb. 30—40 cm., odległ. 30—50 m.), albo faszynami albo najlepiej drenami.

W braku spadku z miejsc przeznaczonych do kopania odprowadza się wodę rynną do kanału lub rzeczki, używając do przenoszenia wody ślimaka lub pompy centryfugalnej.

4) **Sposoby eksploatacyi.** Torfy, zachowujące po wysuszeniu swą konsystencyę, najlepiej jest eksploatować bez przeróbki. Wydobywanie dokonywa się albo łopatą na torfowiskach osuszonych, albo torfiarką Brossowskiego (fabr. Cegielskiego w Poznaniu, cena 480—724 marek) na torfowiskach głębokich lub nie dających się osuszyć i gdy torf nie zawiera wtrąceń drze-

---

*) Świdry żądanej długości wyrabia W. Wdowicki mechanik w Dublanach.

wnych. Przeciętnie używany wymiar cegiełek 30×12×12 cm. Suszy się je na powietrzu układając w koziołki z 3—5, a później 25—50 sztuk; po wyschnięciu składa się w kopce o pionowym przekroju pięciokąta o ostrym szczycie. Koszta ręcznej produkcyi 100 kg. suchego torfu wynoszą 12—20 centów.

Torfy, lasujące się po wysuszeniu lub poprzecinane smugami gatunków mniej wartościowych, trzeba poddawać przeróbce. Jeśli torf należy do zbitych, nie dających się ręcznie przerobić, używa się maszyn mieszadeł, wprowadzanych w ruch przez konia (cena u Cegielskiego 350—900 marek) lub lokomobilą (leżącę mięszadło bez lokomobili kosztuje 800 m.). Dobór mięszadła do gatunku torfu należy powierzyć specyaliście lub godnej zaufania fabryce. Ręczna przeróbka polega na wymięszaniu z dodatkiem wody i dokładnem rozdrobnieniu wydobytego torfu i następnem przeniesieniu go do form (torf deptany), albo na przelaniu przerobionej masy do zagród i po pewnym czasie pokrajaniu na cegiełki (torf zlewny). Koszta 100 kg. suchego torfu przerabianego ręcznie wynoszą 25—40 ct., maszynowo 35—55 ct. Podniesienie jakości dzięki przeróbce przedstawia się w ten sposób, że 100 m³ torfu nieprzerabianego odpowiada 63—72 m³ przerobionego.

5) **Palenie torfem.** Piece w mieszkaniach opalanych torfem powinny być zaopatrzone w ruszty, hermetyczne drzwiczki i wysuwalne skrzynki do popiołu: przy paleniu kładzie się na ruszty całą porcyę torfu, zapala, zamyka szczelnie górne drzwiczki, a po upływie ½ godziny i dolne. Paleniska pod kotłami (całkowitą powierzchnię, wysokość i wolne odstępy między rusztami) należy dostosować do gatunku torfu: wszelkie umiejętnie podjęte w tym kierunku przebudowy znakomicie się opłacają.

6) **Zyskowność opału torfem.** Zdatnym na opał jest tylko torf zawierający najwyżej 25% popiołu, 15—30% wody i którego 1 kg. daje conajmniej 2500 kaloryj, tj. teoretycznie jest w stanie ogrzać 25 kg. wody od 1—100° C., albo odparować 4 kg. wody o zwykłej temperaturze. Można przeciętnie powiedzieć, że torf o wartości opałowej 2700 kaloryj wagowo odpowiada drzewu jodłowemu lub sosnowemu, torf 3000 kal. odpowiada drzewu dębowemu, torf 3300 kal. odpowiada drzewu grabowemu, brzozowemu, i bukowemu. Dalej można średnio liczyć, że 200 kg. torfu wysuszonego na powietrzu o wartości opałowej 2800 kal. odpowiada sążniowi drzewa miękkiego. Są to dane dostateczne do porównania ceny względnie kosztów produkowanego torfu z miejscowemi cenami drzewa. Liczne przykłady eksploatacyi na ziemiach polskich wskazują, że wprowadzenie opału torfem daje oszczędność ⅓ nawet do ⅘ kosztów opału drzewem.

7) **Dokładne wskazówki** znaleźć można: E. Małyszczyski »Zużytkowanie torfu« Encyklopedya rolnicza t. XI. Warszawa 1902 i w broszurze »Uprawa torfowisk« J. Profica i Z. Chmielewskiego Lwów 1903.

II. **Zużytkowanie na ściółkę.** 1) **Badanie jakości** uskutecznia się przez poznanie zdolności nasycania się wodą (torf zdatny na ściółkę powinien pochłaniać conajmniej 8-krotną swą wagę wody), zawartości wody w stanie wysuszonym na powietrzu (maximum 30)%, zawartości azotu (około 1%) i popiołu; badanie to wykonywa kraj.-chem. rolnicza Stacya w Dublanach. Na

ściółkę najlepiej nadają się torfy wyżynne, a z nizinnych tylko pilśniowe nie przegniłe.

2) **Sposoby ekspioatacyi.** a) Sposób tańszy, lecz dający stosunkowo materyał gorszy: część torfowiska, przeznaczoną na kilkuletnią eksploatacyę, odwadnia się rowami przeprowadzonymi w odległości 10—20 m. W późnej jesieni orze się do średniej głębokości i na wiosnę kilkakrotnie bronuje; poczem zgrabia się torf na małe kupki, które powiększa się w miarę wysychania, a po wyschnięciu przenosi pod szopę i używa na ściółkę. W ciągu suchego lata można orkę i następne bronowanie przeprowadzić około 10 razy.

b) Sposób droższy, lecz dający lepszy matetryał: Torf wydobywa się łopatą lub torfiarką i suszy na placu (p. wyżej). Wysuszone cegiełki rozdrabnia się w przyrządzie zwanym wilkiem lub szarpaczem, poruszanym ręcznie lub z pomocą kieratu. Po rozdrobnieniu zaleca się odsianie na specyalnych sitach części grubszych, zdatnych na ściółkę, od proszku szkodliwego dla płuc zwierząt, a nadającego się do dezynfekcyi wychodków, izolacyi lodowni itp.

3) **Użycie torfu na ściółkę.** Tylko torf o należytej jakości (p. wyżej), dobrze wysuszony i rozdrobniony nadaje się na ściółkę. Pierwszy raz daje się pod każde bydlę warstwę grubości 10 do 20 cm., codziennie raz lub kilka razy usuwa stałe odchody, a torf zmoczony równomiernie rozdziela, uzupełniając ubytek zużytego torfu dodatkiem świeżego (2—4 kg. na każdą sztukę). Jeżeli daje się czuć ostry zapach amoniaku, lub gdy zwierzęta są mokre, należy starą ściółkę całkowicie wyrzucić, a dać nową. Najlepiej jest używać ściółkę torfową pod konie, dobrze pod krowy i drób; nie powinno się jej dawać samej pod owce, gdyż silnie zanieczyszcza runo, ani też pod prosięta, gdyż te mogą ginąć z najedzenia się torfem.

UWAGA. Pragnąc stworzyć z »Dublańskiego Kalendarza« podręcznik pod każdym względem przystosowany do potrzeb naszego rolnictwa, prosimy łaskawych czytelników o nadsyłanie swych uwag i życzeń co do układu, jak również i co do dostrzeżonych pomyłek pod adresem **profesora Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego, Dublany, Akademia rolnicza.**

BIBLIOGRAFIA DZIEŁ ROLNICZYCH.

Gospodarstwo wiejskie wogóle. Administracya i ekonomika gospodarstwa wiejskiego. Rachunkowość.

Au I. dr. Nauka rachunkowości do potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej. K. 4.
Birnbaum E. dr. prof. O oszacowaniu dóbr ziemskich. K. 2.10.
Blauth J. inż. Komasacya. K. 1.
Boehme G. dr. Grzechy gospodarskie, z 4-go wyd. przełożył i do naszych stosunków przerobił St. Rewieński. K. 4.70.
Caro L. dr. Zawodowa organizacya rolników. K. 1.
Chłapowski Dezydery. O rolnictwie. K. 2.60.
Czarnomski Franc. Pisma rolnicze. 2 tomy. K. 8.
Filipowicz Karol. Zarząd gospodarczy, tom I. K. 4.
Goltz T. dr. Organizacya gospodarstwa wiejskiego, przekł. z niem. K. 7.80.
Grus R. Przypomnienie czynności gospodarczych na każdy miesiąc dla leśnika, łowczego, rybaka i bartnika. K. 2.40.
Hupka Jan. Zawodowe stowarzyszenia rolnicze. 60 hel.
Jankowski St. Rolnictwo czeskie. K. 1.60.
Jak prowadzić gospodarstwa? Rozprawy odznaczone na konkursie »Gazety roln.« K. 2.60.
Jastrzębowski L. Rachunki praktyczne ziemianina, z licznemi tablicami. K. 2.60.
Jełowicki Adolf. Wskazówki gospodarskie, podręcznik dla zarządzającego majątkiem Studnickim, z 50-letniego doświadczenia. K· 5.20.
Jeziorański J. Jak obecnie gospodarować? K. 1.60.
— O terminowym handlu zbożem. 80 hel.
Komar Wł. Wzory rachunków gospodarskich. K. 3.20.
Kozicki St. i Lutosławski. Przewodnik po ważniejszych wyższych zakładach rolniczo-naukowych zagranicą. K. 1.60.
Kraft G. dr. Nauka organizacyi gospodarstwa. Tom I. K. 2.60.
— Wielki majątek ziemski naszych czasów. Opis ordynacyi książąt Schwarzenbergów w Czechach. K. 7.20.
Krakowski N. Kredyt ludowy i nasze stowarzyszenia współdzielcze. K. 3.40.
Krzyżanowski Adam. Rolnictwo wobec polityki handlowej. K. 2.
Kudelka Tad. Nasze kółka rolnicze. 40 hel.
Lambl I. B. dr. Dochód z ziemi. Przyczynek do reformy błędnych zasad organizacyi, rachunkowości i taksacyi dochodu. K. 2.60.

Langle K. Jak dźwigać bez nakładów zniszczone gospodarstwa rolne? K. 1.
— Wskazówki do obliczania wartości majątków ziemskich. K. 1.50.
Lenkiewicz Wł. Rolnik podolski. Krytyczny pogląd na gospodarstwo rolne Podola. K. 3.
Lutosławski J. Szkoły rolnicze i leśne. K. 2.60.
Łyskowski Ignacy. Gospodarz, wydanie nowe. K. 2.
Madeyski K. Praktyka rachunkowości wiejskiej, czyli sposób racyonalnego rachowania się w przedsiębiorstwach gospodarstwa ziemskiego, z poglądem administracyjnym. K. 4.
Mańkowski W. Notaty gospodarcze z podróży po Anglii. K. 2.
Miczyński K. prof. dr. Rolnik wzorowy, czyli przypomnienie co, kiedy i jak w gospodarstwie czynić należy. K. 1.
Moskalewski B. Rolnicze stacye doświadczalne. 40 hel.
Osuchowski B. Polanin, czyli notatki, uwagi i rady, długoletniem doświadczeniem stwierdzone. Wyd. drugie. K. 2.
Owsiński Jan. Nowy system rolnictwa, wyd. II. powiększone. K 5.20.
— Nowy sysetm rolnictwa wobec postępów i w praktyce lat ostatnich. 52 hel.
Patzig G. C. Praktyczny rządca ekonomiczny. 2 tomy. K. 10.
Pawlik St. prof. dr. Pruskie izby rolnicze, ze szczególnem uwzględnieniem kosztów i zakresu działania Izby rolniczej w Poznaniu. 60 hel.
Prout I. & Kuester A. Gospodarstwo dochodowe bez inwentarza, spolszczył W. Kocent-Zieliński. K. 2.10.
Reisky R. br. Podręcznik gospodarski dla właścicieli ziemskich. 52 hel.
Rewieński St. Rachunkowość gospodarska. K. 2.60.
Ryx J. Rolnik przedsiębiorca. K. 1.10.
Schneider R. A. dr. Rolnik wzorowy, podręcznik racyonalny gospodarstwa, z 14 rycinami. K. 5.80.
Sękowski K. Rachunkowość rolnicza, ułożona na podstawie buchalteryi podwójnej. K. 4.
Skórzewski Br. O ekstenzywnem i intenzywnem gospodarstwie i skąd plony i dochody pochodzą. K. 2.
Spett J. Przyczyny upadku i sanacyi rolnictwa. K. 1.
Stefczyk Fr. dr. Rolnicze spółki magazynowe. 20 hel.
Szulc Kr. prof. Grady Galicyi, z mapą Galicyi i tablicą graficzną. K. 2.
Thaer A. dr. Zarząd gospodarczy, przekład z 3-go wydania niem. K. 2.10.
Weiss Hier. Nasze rolnictwo. 40 hel.
Weitz M. dr. Rolnictwo rabunkowe, tłum. z niem. 52 hel.

Gleboznawstwo. Uprawa roli i roślin. Chemia rolnicza. Nawozy. Choroby roślin

Barta M. O nawozach. K. 1.60.
— Szczegółowa uprawa roślin. I. Uprawa naszych zbóż. K. 1.60.
— Część II. Uprawa roślin okopowych. K. 1.
— O własnościach i uprawie roli. K. 1.
Biegański J. Rośliny lekarskie i ich uprawa. K. 13.
Birnbaum E. dr. prof. Grunta piaszczyste i ich uprawa, przekład St. Rewieńskiego. K. 5.20.

Blauth J. Melioracya łąk i pól w Dublanach. z tablicą. K. 1.
Blomeyer A. dr. Uprawa roślin motylkowych, część I. K. 2.20.
— Część II: Rośliny motylkowe pastewne, z ryc. K. 2.
Boberski Wł. Choroby roślinne. 80 hel.
Bogucki A. Prawidłowy sposób zasiewu i hodowli morwy. 26 hel.
Böhmer E. dr. Zbiór i przechowywanie roślin pastewnych. Praktyczne wskazówki do rozmaitych sposobów konserwowania paszy. Z 26 rycinami. K. 2.20.
Chełchowski St. O uprawie owsa. 26 hel.
— Owies, jego uprawa i stanowisko w naszych gospodarstwach. 26 hel.
— Jaka jest przyczyna tegorocznego nieurodzaju pszenicy, czyli o musze heskiej i jej szkodliwości. 52 hel.
Danysz P. O żywieniu się roślin gospodarskich, 26 hel.
— O płodozmianie i gospodarstwie płodozmiennem. Dla użytku gospodarzy wiejskich. 26 hal.
Dehlinger C. dr. Gospodarstwa bez obornika na gruntach ciężkich. K. 1.10.
Dobrski M Błogosławiona roślina łubin, jego uprawa i pożytek. 15 hel.
Dobrzański E. Meliorowanie gruntów za pomocą łubinu. Łubin i jego uprawa. 52 hel.
— Łubin, jego uprawa i użytki melioracyjne, pastewne i nawozowe. Wyd. III uzupełnione. K. 1.30.
Dyakowski B. Rośliny pokarmowe w różnych krajach, z 31 rycin. 90 hel
Elsbein C. J. dr. Chwasty i ich tępienie. K. 2.60.
Frank A. B. dr. Wykład fizyologii roślin, ze szczególnem uwzględnieniem roślin uprawnych. K. 4.80.
Frank A. B. dr. i Sorauer P. dr. Choroby roślin. Wskazówki praktyczne dla rolników w celu poznania chorób i uszkodzeń roślin uprawnych i środków zaradczych. Przekład z II wyd. niem., przejrzany i uzupełniony przez prof. dra Miczyńskiego. Z 44 ryc. i 6 kolor. tabl. K. 3.60.
— Ochrona roślin. K. 5.20.
Fruwirth G. Chmiel, jego uprawa i użycie, wyd. II z ryc. K. 2.
Fürst K. dr. Ściółka torfowa. K. 1.60.
Gałecki Wł. O nawozach sztucznych. K. 1.30.
— O kiszonce z łubinu. 80 hel.
— Palące kwestye nawozowe. 80 hel.
Gawroński Fr. Podręcznik uprawy buraków cukrowych. K. 2.40.
— Szkodniki i choroby buraków cukrowych, wyd. II. K. 1.30.
— Uprawa roślin przemysłowych, z 94 rycinami. K. 4.70.
Girard Aime. Intensywna uprawa kartofli. Streścił, ocenił i uzupełnił G. Plewako. K. 6.
Gniewosz Wł. Trzy lata upraw próbnych na ziemi torfowej. K. 2.
Godefroy C. Ogólne zasady uprawy i nawożenia roli. K. 2.60.
Godlewski E. dr. prof. Pogadanka o pokarmach roślin i nawozach sztucznych. 50 hel.
Górski P. B. O uprawie buraków cukrowych. 20 hel.
Heinrich R. dr. prof. Margiel i marglowanie. Wpływ marglu i wapna na role, oraz wskazówki stosowania ich jako nawozu. K. 2.60.
— Nawozy i nawożenie. K. 2.10.
— Pasza i żywienie zwierząt gospodarskich. Przekład H. Kotłubaja. K. 4.

Herget A. Warzywnictwo. Przerobił i uzupełnił dr. F. Ciesielski. 60 hel.
Hoffmann M. Bakterye i drożdże w przemyśle rolnym i rolnictwie. K. 1.60.
Janowski Br. Hodowla nasion i traw pastewnych. K. 1.20.
— O własnościach i ocenianiu ziarna zbóż. 80 hel.
Jaroszewski Z. Uprawa roślin zbożowych, pastewnych, groszkowych, koniczynnych i traw. Wyd. 3-cie. K. 8.
— Wczesne sorgo cukrowe amerykańskie. 80 hel.
Jastrzębowski L. Nawozy chemiczne, dobytek i gnój. 52 hel.
— Rzecz o chwastach i o sposobach zupełnego ich wytępienia. K. 1.30.
— Warunki dochodności z uprawy kartofli. 80 hel.
Jentys St. dr. Nawozy pomocnicze. K. 3.60.
Jentys St. dr. i Pawlikowski J. G. dr. O potrzebie i środkach poprawy stosunków handlu nawozowego u nas. K. 1.
Karpiński W. J. dr. Nematody jako przyczyna małych plonów buraków cukrowych i sposoby ich tępienia. 52 hel.
— Choroby buraków cukrowych. I. Zgorzel siewek buraczanych. Zgorzel liści buraczanych. Bakteryoza buraków. Z 4 tabl. kolor. K. 3.30.
— Szczerk. 80 hel.
Kokurewicz M. O uprawie chmielu. 80 hel.
Kostyczew P. Czarnoziem, jego uprawa i nawożenie. K. 4.
— O walce z posuchą w pasie czarnoziemnym zapomocą uprawy roli i nagromadzenia na niej śniegu. K. 1.10.
Kotłubaj H. Pasza i żywienie zwierząt gospodarskich. K. 4.
Krafft G. dr. Uprawa roślin gospodarskich, część szczegółowa, z 136 rycinami. K. 5.20.
Kudelka S. dr. Burak cukrowy i jego uprawa. Wyd. II. K. 3.60.
— Choroby roślin gospodarskich, ich przyczyny i środki zaradcze. K. 4.
Lubomęski W. Obliczanie opłacalności płodów rolniczych. K. 1.20.
Łuniewski T. Uprawa kartofli, opracowana na podstawie długoletniego doświadczenia. K. 6.60.
Maercker M. dr. Nawozy potażowe pod względem ich wartości dla podniesienia produkcyi rolniczej i zmniejszenia jej kosztów. K. 6.
Maizières. Praktycz. wskazówki użycia nawozów sztucznych. 70 h.
Meyer J A. Kartofle, ich uprawa i zastosowanie w gospodarstwie i przemyśle. Tom I: Uprawa kartofli. K. 4.
Tom II: Wyrób krochmalu z kartofli, z rycinami, kosztorysami i planami na budowę fabryki. K. 3.20.
Tom III: Wyrób doktryny cukru, syropu i saga z krochmalu. K. 2.10.
Mikułowski-Pomorski J. i Karpiński A. Sprawozdanie z działalności kraj. stacyi chemiczno-rolniczej w Dublanach. Doświadczenia nawozowe, polowe i łąkowe przeprowadzone w r. 1900 i 1901. K. 1.20.
— VII Sprawozdanie za rok 1902. K, 1.20.
Müntz i Gérard. Straty azotu w mierzwie i środki do ich ograniczenia. K. 1.20.
Mukułowski St. Popularny podręcznik chemii rolniczej, z 2 tabl. kolor. K. 2.40.
Nowacki A. dr. Krótkie wskazówki do praktycznego badania gruntu. K. 2.10.

O kulturze wierzby koszykarskiej. 80 hel.
Oleskow J. dr. Podręcznik hodowli nasion gospodarskich. K. 1.50.
Owady szkodliwe i środki ich tępienia. Praca zbiorowa. K. 4.
Owsiński J. Soja wczesna. 20 hel.
Paprocki St. Walka z mrozem w rolnictwie. 90 hel.
Pawłowski M. Tępienie chwastów. K. 1.10.
Piechowski M. i Zaleski A. Kapusty, kalafiory i kalarepa. (Uprawa inspektowa i gruntowa). Podręczna bibl. ogrodnicza. K. 1.04.
Plantacye wiklowe i ich ważność ze względu na zdziczenie rzek naszych. 50 hel.
Pogadanki rolnicze, zbiór wykładów popularnych. Tom I. Uprawa pod zboża wiosenne. K. 1.60.
Tom II. Uprawa łąk. K. 1.60.
Tom. IV. Uprawa roślin okopowych. K. 1.60.
Pohl J. Fizyologia roślin w zastosowaniu do rolnictwa. K. 2.60.
Prawdzic M. Jak uprawiać ziemię, siać i zbierać plony. Dla pożytku mniejszych gospodarstw. Pod kierunkiem K. Promyka. 70 hal.
Raciborski M. dr. prof. Choroby tytoniu w Galicyi. 80 hel.
Risler E. Uprawa pszenicy, z 22 ryc. K. 5.20.
Rogoyski K. dr. O obchodzeniu się z obornikiem. 80 hel.
Rostafiński J. dr. O maku. 50 hel.
— Przewodnik do oznaczania pospolitszych roślin. Wyd. II. K. 1.
Rozmanit A. Kilka słów o uprawie cykoryi. 60 hel.
Saalfeld A. dr. Szczepienie ziemi pod rośliny motylkowe. K. 1.20.
Schloesing T. Zasady chemii rolniczej, tłum. z II wyd. K. 2.40.
Schultz-Lupitz. Uprawa międzyplodów na ziemi lekkiej. K. 2.40.
Sempołowski A. dr. Nasze trawy łąkowe, ich opis, produkcya nasienia i układanie mieszanek, z 77 ryc. K. 4.
— Kanianka i jej tępienie. 80 hel.
Sikorski J. F. Uprawa łąk i pastwisk, z 65 ryc. K. 8.
— Mechaniczna uprawa gleby. K. 3.60.
Smoleński A. Teorya i praktyka konserwowania paszy zielonej oraz wszelkiego rodzaju wodnistych surogatów pastewnych. K. 8.
Śniegocki A. Hodowla nasion i roślin przemysłowych, z 22 rycin. K. 2.60.
— Nawozy główne i pomocnicze w rolnictwie, ich własność, wartość i wpływ na urodzajność roli. z 11 ryc. K. 5.20.
Spitzer A. dr. Nauka o nawozach. Krótkie wskazówki o własnościach i użytkowaniu nawozów używanych w rolnictwie. Przekład z 13-go wydania niem. K. 2.40.
Stebler F. dr. i Schützer C. dr. Rośliny łąkowe i pastewne, 15 tablic chromolitograf. poprzedzonych opisem. K. 4.
Stodolski R. Nawadnianie łąk, z 8 ryc. i 2 tabl. K. 2.60.
Strzelecki Ant. Gospodarstwo pastewne. Tom I: Uprawa roślin szerokolistnych i wązkolistnych, z 166 ryc. Tom II: Rośliny okopowe. Wyd. II. K. 6.50.
— Kamienie jako nawóz. 80 hel.
— Nauka o dobrej gospodarce polnej. 52 hel.
— Rok postępowego rolnika, w 2 częściach. K. 3.20.
— O uprawie łubinu. 90 hel.
— Uprawa kartofli. K. 1.20.
Szaniawski A. Ciężkość gatunkowa zboża. 80 hel.
— O niektórych własnościach zboża. K. 1.04.
— Sprzęt, suszenie i przechowywanie zboża. K. 2.

Szybiński A. Nauka o nawozach. 60 hel.
— Sztuczne nawozy. 80 hel.
— Kainit jako nawóz. 80 hel.
Szymański A. Jak siać, aby i praca ludzka i ziarno nie szły na marne, z ryc. K. 1.20.
Tomalski J. dr. Przychód z ziemi w gospodarstwie rolnem. K. 2.40.
Tomaszewski W. O uprawie roli i zasilaniu jej nawozami naturalnymi i sztucznymi. Wyd. II uzupełn. K. 2.40.
Turnau J. Uprawa buraków. 60 hel.
Tyniecki Wł. O wierzbach koszykarskich. K. 1.
Tyniecki Wł. Zgnilizna kartofli. wyd. II. K. 1.
Ullmann M. dr. Wapno i margiel. K. 2.
Uruski S. hr. Gospodarstwo łąkowe. K. 1.60.
Wagner P. dr. prof. Kwestye nawozowe z uwzględnieniem najnowszych badań. K. 2.10.
— Krótkie wskazówki do racyonalnego nawożenia azotem roślin uprawnych, ze szczególnem uwzględnieniem saletry chilijskiej. K. 1.10.
— Zasady racyonalnego używania nawozów sztucznych. K. 1.60.
— Żużle Thomasa, ich użycie i zastosowanie jako nawozu sztucznego. K. 1.60.
Warming E. Zbiorowiska roślinne, zarys ekologicznej geografii roślin. K. 4.
Weinberg A. dr. Pogadanki z chemii rolniczej. K. 2.10.
Weinzierl T. dr. O zestawieniu i uprawie mieszanek traw, z tabl. wysiewów. Tłum. St. P. Gurski. K. 1.
Wildt E. dr. Katechizm chemii rolniczej, przekład z 6-go wydania niem. K. 3.20.
Wolny. Rozkład ciał organicznych w roli, mierzwie i paszy, streścił dr. W. Święcicki. K. 2.10.
Wskazówki praktyczne uprawy cykoryi. K. 1.30.
Zaremba B. Kwestye nawozowe. K. 1.30.

Hodowla zwierząt. Owczarstwo. Weterynarya.

Aleksandrowicz St. Kuniza klucz do klasyfikacyi owiec, poprzedzony pobieżnym poglądem na ogólny stan gospodarstwa, na chów owiec, a szczególnie na wybór ras, odpowiednich obecnym warunkom rolnictwa krajowego, z 7 tablic. K. 2.60.
Baldamus Ed. Dr. Hodowla drobiu. Opisanie ras wszystkich gatunków gospodarskiego ptactwa wraz ze sposobami hodowania, pielęgnowania, żywienia i użytkowania tegoż. Praktyczny poradnik dla gospodarzy i gospodyń utrzymujących drób. Z 33 drzeworytami w tekście. Wyd. 2-gie. K. 2.60.
Barański A. dr. Chów koni, poprzedzony wykładem ogólnych zasad hodowli zwierząt gospodarskich, z 21 rycin. K. 13.60.
— Konie gospodarskie, ich wychów i utrzymanie. Wyd. 2-gie. 32 hel.
— Żywienie bydła. K. 3.
— Mały podręcznik weterynaryi. Wyd. 3. K. 2.
Baumeister W. Chów trzody chlewnej, przeł. z 4-go wyd. M. Brühl. K. 2.60.
Biliński K. Kalendarz weterynaryjny na rok 1903. Opracował lekarz weter. Rocznik III. Brody. K. 3.50.
Biliński Wł. Podręcznik dla oglądaczy bydła i mięsa. 80 hel.
Bojanowski St. Za końmi na Wołyń i Ukrainę. K. 3.

Bojanowski St. Jak spieniężać konie luksusowe w Galicyi. K. 1.
— W sprawie chowu koni w Galicyi. K. 2.
— Konie galicyjskie na międzynarodowym konkursie hipicznym w Turynie. K. 2.
— Czy nadaje się do chowu w Galicyi poprawna świnia żuławska (veredelte Marschschwein). str. 28. K. 1.
Brownsford A. Podręcznik do racyonalnego żywienia zwierząt gospodarskich. Wyd. II-gie. K. 4.
Brunicki J. br. Ogólne zasady hodowli zwierząt domowych. Podług rozprawy prof. M. Wilkensa napisał . . . 90 hel.
Buczwiński L. Poradnik weterynaryjny. K. 2.40.
— Podręcznik weterynaryjny. Część I. Choroby pomorkowe. K. 2.60.
Bujwid prof. dr. Perlica u bydła i środki zaradcze. 52 hel.
Cegiel Wł. Hodowla królików ras poprawnych jako zaniedbane źródło naszego dobrobytu. 50 hel.
Chojecki T. O tuczeniu bydła opasowego. Podręcznik dla gospodarzy. Z 4-ma rysunkami. 52 hel.
Czapla F. dr. Wścieklizna u zwierząt i sposób, w jaki ją ograniczyć można. 80 hel.
Czapski M. hr. Historya powszechna konia, 3 tomy. K. 20.
Dammann R. dr. Zarys hygieny zwierząt domowych, przeł. z niem. St. Dawid. K. 1.60.
Duleba K. Ratowanie bydlęcia odętego. 15 hel.
Falkowski Wł. K. Chów królików. Odmiany i rasy zajęcy, królików i leporydów, ich hodowla i słabości oraz leczenie tychże, z 21 rycin., na 15 tabl. K. 5.
— Chów kur. K. 3.
— Chów gęsi, łabędzi, kaczek, pantarek, indyków, bażantów i pawi. K. 3.
— Hodowla królików. K. 1.60.
Funk Wiktor dr. Hodowla bydła rogatego. Wskazówki do racyonalnego wychowu, żywienia i użytkowania bydła rogatego. Z 75 rys. w tekście. K. 4.70.
Górski Fr. dr. Uwagi nad hodowlą krów mlecznych. K. 1.10.
Graff K. dr. Hodowla zwierząt. 2 tomy. K. 7.80.
Haubner dr. Weterynarya gospodarska czyli nauka leczenia zwierząt domowych. Według 12-go wyd. oryginału przerob. i uzupełn. przez dr. Siedamgrodzkiego, przeł. z niemieckiego dr. M. Laurysiewicz i A. Strzelecki. Wyd. 4-te przejrzane i znacznie przerobione ze 104 drzeworyt. w tekście. K. 7.80.
Heinrich R. prof. dr. Pasza i żywienie zwierząt gospodarskich. Podręcznik do racyonalnego żywienia i zużytkowania produkowanych w gospodarstwie i w handlu będących przedmiotów pastewnych dla rozmaitych celów hodowli. Dzieło premiowane przez Tow. Meklemburskie. Przeł. z niem. Henryk Kotłubaj. K. 4.
Henzé G. Trzoda chlewna, z franc. przełożyli studenci Instytutu Gosp. Wiejsk. w Nowej Aleksandryi, z 49 drzewor. K. 2.
Hodowla gospodarcza zwierząt rolniczych, przez starego Rolnika. Karton. K. 2.60.
Hostoński K. Pies, jego choroby i leczenie tychże z szczególnem uwzględnieniem wścieklizny. K. 2.
Kanarek, jego rozmnażanie, hodowla i leczenie chorób. Z niem. Wyd. 2-gie. 52 hel.

Kępiński L. S. Praktyczne wskazówki przy kupnie i obchodzeniu się z końmi. K. 2.

Kiszkiel J. Grużlica u bydła rogatego i innych zwierząt domowych. 40 hel.

Klecki Waleryan. Studya nad morfologią, własnościami i pochodzeniem bydła rogatego Bretanii. Z 4 tabl. K. 4.

— Walka z gruźlicą u bydła w świetle nowych spostrzeżeń i doświadczeń. Warszawa. 75 hel.

Koszutski W. Pomiary i znamiona charakterystyczne najwięcej znanych ras i odmian bydła nizinnego i górskiego, według Lenertha, opisał . . . K. 1.30.

Kotłubaj Henryk. Weterynarya gospodarska z anatomią, fizyologią, nauką o powierzchowności oraz hygieną zwierząt domowych. Z 429 drzeworytami w tekście. K. 7.80.

Kowalewski M. O zwierzętach szkodliwych i pożytecznych w gospodarstwie. Z 98 rycinami. K. 1.20.

Kretowicz Paweł. Kucie koni z uwzględnieniem postawy nóg i chorób kopyta. Wyd. 2-gie z 65 rycinami. K. 3.60.

Królikowski Stanisław prof. Tablica poglądowa do rozpoznawania wieku konia. K. 1.20.

— Hygiena weterynaryjna czyli nauka utrzymania zdrowia zwierząt gospodarskich. Ze 104 rycin. w tekście. K. 7.

— Chore zwierzę a człowiek. K. 1.

Krosiński Wł. dr. Ubezpieczenie bydła domowego. 40 hel.

Księga stad owczarń zarodowych w guberniach Królestwa Polskiego, wydana staraniem sekcyi rolnej. W. O. T. P. R. P. i H. Warszawa. K. 2.60.

Lange K. Kr. O budowie i wewnętrznych organach konia. Z pięciu tablicami kolorowanemi (poglądowemi) i tekstem podług dzieła A. Schwartza. K. 2.

Lehndorf J. hr. Przewodnik dla hodowców koni. Tłómacz. polskie zbiorowe z 2-go niem. wyd. przez członków Tow. wyścigów konnych i zachęty chowu koni w Pławnie, z 4-ma rycinami i 30 drzeworytami w tekście. K. 7.80.

Lowe Bruce. Hodowla koni wyścigowych podług systemu liczbowego. W oprawie K. 20.80.

Lubomęski A. Praktyczne zastosowanie teoryi żywienia inwentarza, dra H. Grouvena, z uwzględnieniem miar i wag dziesiętnych. Wyd. 3-cie popraw. i powiększone. K. 1.60.

Lubomęski A. Uwagi o zwierzętach domowych, ich gatunkach, rasach i parzeniu się, podług Nathusiusa. Wyd. 2-gie. K. 1.30.

Łaszczyński Wł. dr. Podręcznik dla owczarza. K. 1.

— Zootechnika czyli hodowla dochodowa. K. 4.

Maisburg Karol. Z systematyki bydła krajowego. Z 2 ryc. i tablicą pomiarów czaszkowych. K. 2.

Morelowski J. dr. Ustawy o zaraźliwych chorobach zwierzęcych i o księgosuszu, wraz z odnośnemi rozporządzeniami ogólnemi i szczególnemi dla Galicyi. K. 2.80.

Nitkowski A. Zasady w hodowli. 52 hal

Ochorowicz Julian dr. Fizyologia wyścigów konnych w stosunku do krajowej hodowli koni (projekt reformy). K. 3.20.

Ostaszewski Ostoja Kazimierz. Oficyalna księga stad koni półkrwi dla Galicyi i Bukowiny Galicyjsk. Tow. chowu koni i wyścigów. Tom I. Tekst polski i niemiecki. K. 12.

Paszkowski J. Katechizm w przedmiocie opieki nad nierozumnemi żyjącemi istotami, a mianowicie nad zwierzętami dom. 66 hel.

Pawlik St. dr. Mezőhegyes król. węgierska domena i stadnina rządowa koni. 60 hel.

Piotrowski G. dr. Fizyologia zwierząt ssących domowych. K. 5.20.

Popiel Antoni. Podręcznik do hodowli bydła rogatego, według najnowszych dzieł opracowany. 3 tomy. Zniż. K. 8.

Pribyl. Hodowla drobiu i **Goedde.** Hodowla bażantów. Z czwartego wyd. niem. przełożył Antoni Strzelecki. Z 56 rycinami w tekście. K. 3.20.

Rady dla utrzymujących buhaje rozpłodowe. 20 hel.

Rewieński St. Gospodarstwo w oborze, w mleczarni i w chlewie. Z 8 drzew. w tekście. K. 2.60.

— Listy o jeździe konnej. Praktyczny i przystępny wykład jazdy konnej, oraz ujeżdżania koni wierzchowych. Wyd. 2-gie przejrzane i poprawione z 11 drzeworytami. K. 2.10.

— Pies, jego gatunki, rasy, wychów, utrzymanie, użytkowanie i układanie, choroby i ich leczenie. Z drzeworyt. K. 3.20. W oprawie 4.20.

— Gospodarski chów koni. K. 1.60.

Rohlwes. Nauka leczenia zwierząt domowych, wyd. 22-gie, zupełnie przerobione przez dr. G. Felischa, pow. weterynarza w Inowrocławiu, przełożył na język polski A. Strzelecki, z illustracyami w tekście. Wyd. nowe zupełnie przerobione i na nowo oprac. K. 2.60. W oprawie 3.20.

Rohr H. Pouczenie popularne o wściekliźnie u psów. 70 hel.

Ryx Jerzy. Zootechnika z dzisiejszego punktu widzenia. 80 hel.

Schultze Bernard. Żywienie zwierząt gospodarskich. Z 2-go niem. wyd. przełożył Stanisław Rewieński. K. 4.

Śniegocki A. Chów bydła rogatego. (Bibl. rolnicza t. III). K. 2.40.

— O hodowli krów, poradnik dla gospodarzy i gospodyń. 52 h.

— O hodowli świń. 52 hel.

Steuert L. Zwierzę domowe w stanie zdrowym i chorym. Wskazówki utrzymywania, ochrony i leczenia koni, bydła, owiec, świń, psów i drobiu. Przełożył z niem. dr. Mieczysław Pankowski. Z 298 rycinami w tekście. W oprawie K. 6.

— Rady sąsiada w chorobach inwentarza, czyli w jaki sposób ma gospodarz inwentarz chory pielęgnować i leczyć. Przeł. Józef Markowski. K. 3.50.

Sumiński A. hr. Hodowla gołębia rasowego i standard polski. (Odbitka z »Ekonomisty narodowego«). 90 hel.

Sypniewski J. Owczarstwo. Cena zniżona K. 11.

Sypniewski Jul. i Wilkoński F. O. Księga stad. Bydło. K. 1.30.

Taczanowski Wład. O ptakach drapieżnych w Król. Polskiem, pod względem wpływu, jaki wywierają na gospodarstwo ogólne. K. 1.30.

Tarczyński H. Świnia domowa, soliter, wągier i trychiny. 40 hel.

Waśniewski H. Charakter zwierząt. 80 hel.

— Mechaniczna metoda leczenia zwierząt domowych bez lekarstwa. (Masaż, ruchy czynne i bierne). 80 hel.

Wiśniewski S. Hodowla królików. 15 hel.

Wodziński L. O układaniu koni pod wierzch i do zaprzęgu. Wyd. 2-gie, z illustr. K. 3.20.

Wodziński R. O hodowaniu koni. K. 2.60.

Zalewski Bohdan inż. agr. Jak żywić inwentarz w naszych warunkach? K. 2.

Leśnictwo. Myśliwstwo.

Berdau. Botanika leśna. K. 5.20.
Biesiekierski. Kuropatwa. K. 2.10.
Brykczyński Józef. O lesie i drzewach przypolnych. 20 hel.
Dygasiński Ad. Wielkie łowy: przygody myśliwskie, z 15 rysunkami Sawiczewskiego, opr. K. 5.20.
Goedde. Hodowla bażantów. K. 2.60.
Grus Roman. Brzoza, jej opisanie, uprawa i znaczenie w gospodarstwie leśnem. K. 1.20.
— O chorobie młodych sosen zwanych »osutką«. 60 hel.
— Ściółka leśna. K. 1.10.
— Uprawa i pielęgnowanie lasu. Rady dla rolników i leśników (Bibl. roln. t. II). K. 2.40.
Hryniewiecki Bol. Nasze lasy. 32 hel.
Kohlmann W. Tabele kubiczne do drzewa okrągłego. K. 1.20.
— Tabele kubiczne do drzewa rzniętego i ciosanego. K. 2.10.
— Tabele kubiczne do drzewa okrągłego, rzniętego i ciosanego. K. 3.60.
— Tabele kubiczne do drzewa rzniętego i ciosanego, według stopowej i metrycznej miary. K. 4.50.
Koleczko W. Zasady praktycznego urządzania lasów, ich szacowania i zagospodarowania. Z dodaniem dwóch map, tablic i drzeworytów w tekście. K. 4.
Machczyński K. O wyżłach i ich układaniu. Z 20 rysunkami J. Wasilewskiego. K. 2.35.
— W polu i w kniei. Z teki myśliwego. Z 10 kol. rys. J. Wasilewskiego. K. 5.20.
Magdziński St. Krótki rys o szkodnikach w drzewostanach leśnych starszych, szkółkach i kulturach, oraz środki zaradcze. 40 h.
Neumeister. Żywienie jeleni i sarn. K. 1.60.
Nowicki Aleks. Podręcznik do odnawiania lasów, z dodatk. o ustaleniu wydmisk, z 21 rycin. K. 4.
— Zadrzewianie nieużytków. Dla użytku gospodarzy rolnych opisał . . . Karton 40 h.
Olszowski W. O szacowaniu drzewostanów leśnych. 52 hel.
Ostroróg. Myśliwstwo z ogary. K. 2.
Przewodnik dla leśniczych. Zbiór wiadomości z gospodarstwa lasowego i odnośnych nauk pomocniczych, dla użytku właścicieli lasów i poświęcających się zawodowi leśnemu. 2 tomy. Wyd. 2-gie.
Strzelecki Henryk. Gospodarstwo lasowe. Cięcie lasu. Wyd. 2-gie. popraw. i uzupełn. z portretem autora. K. 3.60.
— O rozpoznawaniu drewna drzew leśnych i krajowych. Poradnik dla leśników i wogóle osób trudniących się wyrabianiem, kupnem i sprzedażą drzewa. K. 2.
Strzelecki Henryk. Tablice do obliczania miąższości drzewa. 60 h.
Sumiński Ar. hr. Myśliwy. Z rysunkami. K. 4.
Sylva-Taroucca. Hodowca a myśliwy. K. 3.20.
Szlezygier J. Myśliwy ze strzelbą, zasady, uwagi i wskazówki, dotyczące polowania, dotyczące hodowli, ochrony i rozmnażania zwierzyny, z dodatkiem myśliwsk. terminologii. K. 2.
Tomkiewicz St. Kilka wyrachowań do użytku w lesie i przy tartaku. K. 3.20.

Tucewicz W. Podręcznik do urządzania lasów, przełożyli z rosyjskiego studenci Instytutu gospod. wiejskiego i leśnictwa w Nowej Aleksandryi (Puławach) pod red. prof. J. Krasuskiego. Cena zniżona K. 2.50.

Turski M. O hodowaniu drzew leśnych. K. 1.10.

Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelnictwo. Jedwabnictwo.

Arctówna Marya. Rośliny krajowe trujące, lecznicze i jadalne, z kolor. rycinami, opr. K 4.

Barszczewski B. Ul bezdenek ramowy, dla okolicy krótki czas pożytku dla pszczół dającej. K. 2.

Berger J. Rodzina kaktusów, opisana w systematycznym porządku z dodaniem wiadomości o hodowli i pielęgnowaniu tych roślin, z 24 drzewor. Cena zniżona K. 2.60.

Betten Robert. Hodowla kwiatów w pokoju. K. 4.

Bogucki A. Jedwabnictwo nasze i obce. Regulamin hodowli jedwabników. Wyd. 2-gie. K. 1.20.

Braun Adam. Z zakresu gospodarstwa pasiecznego. Podkarmianie pszczół. Karton. 95 hel.

Brzeziński J. Dobór wzorowy odmian drzew owocowych do hodowli ogólnej. K. 1.20.

— Szparagi i ich racyonalna hodowla. K. 1.20.

— Hodowla drzew i krzewów owocowych. K. 7.

Butlerow A. Jak hodować pszczoły. Przetłómaczył ks. Julian Jakubowski. 80 hel.

— Pszczoła, jej życie i główne prawidła rozumowanego hodowania pszczół, tłóm. i uzupełnił uwagami B. Grabowski, z dodaniem 42 rys. w tekście. Cena zniż. K. 2.

Chłapowski K. Nawozy sztuczne w zastosowaniu do ogrodnictwa z 28 rycinami. K. 1.50.

Ciesielski T. dr. Bartnictwo czyli hodowla pszczół dla zysku, oparta na nauce i wielostronnem doświadczeniu. Tom I. Przyroda pszczół. K. 5.

Tom II. Gospodarka w pasiece. K. 5.

Durst Emil. Główne zasady hodowli pokojowej roślin, oraz lista roślin, przydatnych do hodowli pokojowej. K. 1.04.

— Rośliny ozdobne pojedyncze czyli solitery, służące do ozdobienia parków i t. d. podczas lata. Ozdobione 56 drzeworyt. K. 2.35.

Folakowski Emil. O uprawie winogradu. 64 hel.

Froń S. O hodowli drzew i krzewów owocowych w ogródkach małych gospodarstw. 70 hel.

Gawarecki Zygmunt. Sposoby powiększania urodzajności drzew owocowych. K. 1.

Goeschke Fr. Ogród wiejski. Popularny przewodnik przy zakładaniu i pielęgnowaniu ogrodów oraz podręcznik do nauki ogrodnictwa. Przekład z niem., z drzeworyt. w tekście. K. 1.04.

Grabowski L. i **Szanior Fr.** Kalendarz dla ogrodników, wydany staraniem Ogrodnika Polskiego na rok 1903. Warszawa. K. 2.

Herget A. Uprawa warzyw, przejrzał i uzupełnił dr. T. Ciesielski. K. 1.60.

Higuet E. O hodowaniu jedwabników dzikich. 13 hel.

Jakimionek K. Niepłodność drzew owocowych. (Podręczna bibl. ogrodn. I.). 66 hel.

Jakubowski J. ks. W sprawie pszczelnictwa. Artykuły polemiczne. 52 hel.

Janczewski prof. dr. Trzy metody hodowli drzew owocowych. (Odbitka z »Tygodnika Rolnicz.«). 50 hel.

Jankowski Edm. Dla ogrodników. Podręcznik dla ogrodniczków, praktykantów ogrodniczych i ogrodników wiejskich. K. 3.70.
— Dobre rady co do sadów dla ziemian, a głównie dla włościan. 26 hel.
— Krzew winny, jego hodowla w gruncie i budynkach, z 13 drzew. Wyd. 2-gie. K. 2.60.
— Kwiaty naszych mieszkań. Z 198 figur. Wyd. 2-gie. K. 9.40.
— Kwiaty naszych ogrodów. Opis i hodowla kwiatów gruntowych wraz z zasadami tworzenia kobierców kwiatowych, wzorami klombów, przykładami rysowania ich i obsadzania. Wyd. 3-cie, znacznie dopełnione, z 410 figurami. K. 10.40.
— Ogród przy dworze wiejskim. Wyd. 2-gie poprawione, dopełnione i powiększone. K. 9.90.
— Ogrodnictwo przemysłowe, z 58 rysunkami. W opr. K. 5.20.
— Ogrody na płasku. Z 10 planami ogrodów. K. 3.40.
— Ogrody polne, książeczka dla włościan i właścicieli mniejszych posiadłości. 52 hel.
— O pieczarkach i szparagach. (Odbitka z książki »Ogród przy dworze wiejskim«). 26 hel.
— Sad i ogród owocowy. Wyd. 3-cie, znacznie powiększone, z 12 tabl. fotogr. i licznymi drzewor. w tekście. K. 11.50.
— Sad przy chacie. Objaśnione 23-ma drzeworyt. Wyd. 3-cie, znacznie powiększone. 65 hel.
— Trawniki, ich zakładanie i pielęgnowanie. 40 hel.
— Zasilanie ogrodów i roślin ogrodowych nawozami. 80 hel.

Jankowski Stefan. Najważniejsze rośliny pastewne. 40 hel.

Jasiński St. Wzory i plany ogrodów oraz wzory kobierców kwiatowych. 7.80.

Kaczyński Józef. Warzywa w gruncie. Ze 105 drzeworyt. K. 6.50.

Karczewska M. O uprawie warzyw. Książeczka dla włościan. 52 h.

Karwacki Aleks. dr. O hodowaniu i pielęgnowaniu kwiatów i roślin pokojowych. Wyd. 3-cie, przejrzane i powiększ. K. 1.60.
— Ogrodnictwo warzywne. Drzewa owocowe i krzewy jagodowe oraz użyteczność tychże. Wyd. 2-gie. K. 1.60.

Kolb M. Teorya ogrodnictwa, z niem. przełożył i uzupełnił Aleks. Szanior. K. 4.

Kubaszewski Ad. Owoce południowe. brzoskwinie, morele, winokrzewy i figi w naszym kraju. Praktyczna hodowla na wolnem powietrzu i pod szkłem. Z 94 rycin. i 2 planami. K. 6.
— Ogród jako źródło dochodu czyli praktyczne sadownictwo, opis gatunków i odmian drzew i krzewów owocowych, jakie się okazały najwdzięczniejszymi w naszym klimacie, z trzema tablicami i 110 rycinami w tekście. K. 9.60.

Kurowski A. i Tabeau W. Hodowla drzew i krzewów owocowych, tudzież zbiór, przechowywanie i zużytkowanie owoców. K. 2.20.

Kwiatkowski Aleksander. Wskazówki dla początkujących pszczelarzy. Zestawienie najważniejszych prawideł pszczelnictwa umiejętnego w pytaniach i odpowiedziach z wielu objaśniającymi drzeworytami. K. 1.20.

Langauer Fr. Ogród szkolny. Wskazówki do zakładania, pielęgnowania i pedagogicznego zużytkowania ogrodu szkolnego. Opracowanie polskie, do klimatu naszego zastosowane przez dr. Eustachego Wołoszczaka. Z 6 plan. i 7 fig. w tekście. K. 2.

Lange K. Ogród warzywny, jego urządzenie i pielęgnowanie roślin warzywnych. K. 2.

Lewicki K. Pszczelnictwo. Zbiór wiadomości o życiu i przyrodzie pszczół, do potrzeb pszczelarzy zastosowany oraz przewodnik racyonalnego prowadzenia pasieki w ulach ramowych warszawskich i bezdenkach z nadstawkami, Z 44 drzeworytami. Wyd. 4-te poprawione i powiększone. K. 4.

— Ul gospodarski czyli bezdenek snorowy z nadstawką ramkową. Najlepszy sposób wyzyskiwania pszczół przez zabieranie matki na czas głównego pożytku. W dodatku: ulepszenie ula ramowego warszawskiego i miodosytnictwo. Do druku opracował K. Prószyński. K. 2.

Lucas E. dr. Warzywnictwo, zawierający dokładny wykład teoretyczno-praktyczny uprawy ogrodowej i rolnej roślin warzywnych. Przeł. L. Dembowski. Wyd 2-gie, przejrzane przez L. C., z 115-ma rycin. i planem. K. 3.60.

Matecki B. Rośliny pnące i wijące gruntowe, oraz szklarniowe. K. 2.

Mieroszewska L. Kwiaty w pokoju i ich wybór, sposób pielęgnowania, według najnowszej nauki i własnych doświadczeń. K. 2.

Molicki Fr. Najnowsze bartnictwo czyli zakładanie i prowadzenie pasiek sposobem najlepszym i najpraktyczniejszym. Z 255 rys. w tekście. K. 9.10.

Nieciengiewicz J. Jedwabnictwo praktycznie i teoretycznie wyłożone. K. 1.30.

Niklewicz K. Kultura winorośli. Wyd. 2-gie z 38 rys. w tekście. K. 1.30.

Olszewski K. prof. Hodowla chryzantemów. K. 2.

Owocarstwo, czyli nowe sposoby użytkowania z owoców drzew owocowych, w klimacie naszym wzrastających, przez Starego Rolnika. K. 1.60.

Owsiński Jan. Miejsce na sad. 52 hel.

Radło . . . E. Ogrody, czyli opis prowadzenia sadu, ogródka owocowego, ozdobnego, ogrodu warzywnego, inspektów, oraz wskazówki użytkowania owoców. Z licznymi drzeworytami w tekście. Wyd. 2-gie. K. 3.20.

Rivers T. Ogród pod szkłem. Z 15-go angielsk. wydania przełożył Wł. Kaczyński. W kart. K. 2.

Skarytko W. Praktyczny bartnik. Krótki teoretyczno-praktyczny illustrowany przewodnik dla początkujących pasieczników. Z niem. przełożył prof. Bronisław Gustawicz. K. 2.40.

Skorupski. Opisanie ulów bezdenków ramkowych, z dodaniem łatwego sposobu przeprowadzania pszczół z prostych bezdenków do ramkowych. 40 hel.

Stefanowska Michalina. Co się dzieje w ulach? Życie i obyczaje pszczoły zwyczajnej. 40 hel.

Strumiłło J. Ogród owocowy. Z 8-go wyd. przejrzał i dopełnił F. Berdau. K. 2.60.

Szczudło J. Hodowla hyacyntów. 20 hal.

Tyniecki Wł. Sadownictwo gospodarskie. K. 1.50.

Wachowski Winc. Elementarz hodowli pszczół dla włościan. 52 h.

Wiśniewski Seweryn. Ogród warzywny. Wyd. 2-gie. W opr. 80 h.

Zwierzchowski A. W sprawie podniesienia ogrodnictwa krajowego. Warszawa 1902. 80 hel.

Przemysł rolniczy. Technologia. Budownictwo. Miernictwo.

Blauth J. dr. Znaczenie torfu w przemyśle. K. 1.30.
— O drenowaniu. 16 hel.
Chrząszcz L. O drenowaniu, korzyści jego i wykonanie. Wadowice 1902.
Ciesielski D. T. Miodosytnictwo, czyli sztuka przerabiania miodu i owoców na napoje. K. 3.
Classen H. dr. Fabrykacya cukru ze szczególnem uwzględnieniem przerobu. Przekład polski St. Grzybowskiego. K. 9.40.
Domański St. Jak niwelować? 80 h.
Dulęba K. Tanie a dobre narzędzia rolnicze dla włościan. 80 h.
Gniewosz J. N. P potrzebie rozwoju przemyslu domowego w Galicyi. K. 2.40.
Hoff B. Tablice wydatków alkoholu z surowych płodów skrobiowych. Opr. K. 4.60.
I. T. O serowarstwie. Streszczone podług dr. Klenkego. 78 hel.
Jabirzykowski Z. Wyrób win z jagód i owoców. 24 hel.
Jankowski E. Ogrodnictwo przemysłowe. K. 5.20
Jenik A. Szematyzm i skorowidz gorzelń w Galicyi. K. 3.
Klecki W. dr. Serowarstwo. K. 5.20.
Kostubaj Wł. Torf i jego zastosowanie w rolnictwie 2.60
Łubkowski K. O zastosowaniu torfu i brykiet torfowych do opalania parowozów na drogach żelaznych niemieckch. K. 1.30.
Niklewicz K. Wina owocowe i miody. K. 1.04.
— Przemysł owocowy. K. 3.20.
Pawlik St. dr. prof. W sprawie przemysłu cukrowniczego. 60 hel.
Profic J. i Chmielewski Z. inż. Uprawa torfowisk i ich zużytkowanie na ściółkę i opał. K. 1.20.
Reinhert. Poziomowanie (niwelacya) w zakresie melioracyi rolnych. K. 1.30.
Rigaux E. Mleczarstwo wyrób masła i serów. Przełożył z franc. W Zieliński. K. 4.20.
Ringelmann A. Budownictwo wiejskie. Tłóm. G. Bielski. K. 6.40.
Stoblecki St. O korzyściach drenowania. K. 1.20.
Stodolski R. Nawadnianie łąk. K. 2.60.
— Ogólny pogląd na torfowiska. K. 1.04.
Tatarowicz Z. Czy cukrownictwo ma racyę bytu w Galicyi. K. 1.
Tuleja J. O przemyśle gorzelnianym w Galicyi. K. 1.50.
Turkowski Fr. Gorzelnictwo. K. 4.
Wszelaczyński M. O torfie ze stanowiska gospodarstwa społecznego. 40 hel.
Wyrób niepalnych dachów, ścian pował i brandmurów ze słomianych mat. K. 1.04.
Załoziecki R. Gorzelnictwo. K. 18.

Księgarnia H. ALTENBERGA we Lwowie

zwraca uwagę wszystkich panów
właścicieli dóbr i w ogóle polskich rolników
na pomnikowe dzieło rolnicze

ENCYKLOPEDYA ROLNICZA

wydana staraniem i nakładem

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.

Każdy Ziemianin powinien w swej bibliotece posiadać ENCYKLOPEDYĘ ROLNICZĄ, która stanowi nieoceniony księgozbiór wszystkiego tego, co rolnikowi jest potrzebne.

Cena całego dzieła (11 tomów w formacie leksykonowym) **w bardzo trwałych i pięknych oprawach półskórkowych** wynosi obecnie

Koron 300.

Pragnąc ułatwić nabycie tego znakomitego wydawnictwa, dostarcza je

Księgarnia H. Altenberga we Lwowie

także na spłaty miesięczne.

Panowie reflektujący na Encyklopedyę Rolniczą, zechcą się w tej sprawie porozumieć wprost

z Księgarnią H. Altenberga we Lwowie.

Zwraca się uwagę, że nakład tego dzieła jest **na wyczerpaniu.**

Włochy. Wspaniałe album w wielkim formacie, zawiera wszystkie zabytki sztuki włoskiej, widoki miast, ruin, typy ludowe etc. Tekst pod redakcyą Michała Rollego. W pięknej oprawie półskórkowej 50·—

Wysłouchowa. Za wolność i lud (r. 1863) . . . . —·70

Wyspiański. Iliada Homera, część I. Pomór — Gniew. Tekst grecki opracowany przez prof. Sternbacha, tekst polski Juliusza Słowackiego. Ilustracye St. Wyspiańskiego. Wydanie wytworne . . . . . . 10·—

— Wesele . . . . 3·—

Zawistowska. Poezye. Z przedmową Miriama. Ozdobne wydanie z portretem autorki i rysunkami St. Dębickiego. W pięknej oprawie skórkowej . . . 3·60

Zbierzchowski. Przed wschodem słońca, powieść . . 3·—

BIBLIOTEKA UTWORÓW DRAMATYCZNYCH.

Kor.

Tom I. **Björnson Björnstjerne, LABOREMUS.** Tłómaczył Dr Alfred Wysocki . . . . 1·—

Tom II. **Hejiermanns Herman, NADZIEJA.** Tłómaczył Jan Kasprowicz . . . . 1·50

Tom III. **Eurypides, CYKLOP.** Tł. Jan Kasprowicz . —·50

Tom IV. **Grillparzer Franc., BIADA KŁAMCY.** Tłómaczył Jan Kasprowicz . . . . 1·50

Tom V. **Maeterlinck Maurycy, INTRUZ.** Tłómaczył Zygmunt Bytkowski . . . . —·50

Tom VI. **Ibsen Henryk, RYCERZE PÓŁNOCY.** Tłómaczył Dr A. Wysocki . . . . 1·20

Tom VII. **Marivaux, IGRASZKI TRAFU i MIŁOŚCI.** Tłóm. Zygmunt Sarnecki . . . . 1·20

Tom VIII. **D'Annunzio, SNY PÓR ROKU.** Tłómaczył Marion . . . . 1·20

Tom IX. **Maeterlinck Maurycy, ŚLEPCY.** Tłómaczył Zygmunt Bytkowski . . . . —·60

Tom X. **Bracco Robert, PIETRO CARUSO.** Tłómaczył Jan Kasprowicz . . . . —·60

Tom XI. **Kawecki Zygmunt, DRAMAT KALINY.** Trzy akty z prozy życia (z 6 ilustr.) . . . . . 2·—

Tom XII. **Maeterlinck Maurycy. MONNA VANNA.** Tłómaczył Z. Sarnecki . . . . 1·20

Tom XIII. **Gorkij, MIESZCZANIE.** Tł. Z. Siedlecki . . 1·60

Tom XIV. **Najdienow, DZIECI WANIUSZYNA.** Dramat w 4 aktach. Przetłómaczył z rosyjskiego H. Zbierzchowski . . . . 1·60

Cena Kor.

Lenkiewicz Władysław. Rolnik podolski. Krytyczny pogląd na gospodarstwo rolne Podola. Tarnopol, 1900 3·—

Patzig G. C. Praktyczny rządca ekonomiczny według wymagań nowoczesnych, podręcznik praktyczny, pouczający dla właścicieli dópr, dzierżawców, rządców i gospodarzy wiejskich. Podług niemieckiego wydania do potrzeb krajowych zastosował A. Świeżawski. Część I: Rolnictwo uzupełnione nauką o sadownictwie, którą napisał Wład. Tyniecki. Część II: Chów bydła. Gospodarstwo stawowe. Zarybianie stawów. Nauka o robotach gospodarskich. Rachunkowość gospodarska. Budownictwo wiejskie. Wydanie trzecie. 2 tomy. Kwów, 1902 . . . . 10·—

Przewodnik dla leśniczych. Zbiór wiadomości z gospodarstwa lasowego i odnośnych nauk pomocniczych, dla użytku właścicieli lasów i poświęcających się zawodowi leśnemu. 2 tomy. Wydanie II. znacznie pomnożone i przerobione. Lwów, 1886.

I. Meteorologia. Klimatologia. Botanika. Zoologia leśna. Arytmetyka. Geometrya. Z rycinami w tekscie i 10 tablicami z nauki owadów.

II. Gospodarstwo lasowe z rycinami w tekscie i 7 tablicami . . . . 12·80

Rylski Tomasz prof. Podręcznik mechaniki rolniczej dla gospodarzy praktycznych. Wybór i użycie narzędzi i machin rolniczych. Z 130 rycinami w tekscie . 6·—

Strzelecki Henryk dyr. Gospodarstwo lasowe: Cięcie lasu. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione z portretem autora. Lwów, 1889 . . . . 5·60

Królikowski Stanisław. Hygiena weterynaryjna czyli nauka utrzymania zdrowia zwierząt gospodarskich z 104 rycinami w tekscie. Lwów, 1897 . . 6·—

— Tablica poglądowa do rozpoznawania wieku konia. Lwów, 1897 . . . . 1·20

Tyniecki prof. Władysław. Botanika i Zoologia leśna Dra Z. Romera. 1878 (1 tablica litograf.) . . . 4·40

— Choroby roślin: Zgnilizna kartofli. Wyd. II pomn. 1872 (1 tablica litograf.) . . . . 1·—


— Sadownictwo gospodarskie, Lwów, 1901 . . 1·50

Szpilmann J. dr. Wady mleka. Odbitka z Przeglądu weteryn. r. 1888. Tom III. Lwów 1889 . . . . . 1·—

DOM DLA ZIEMIAN WE LWOWIE.

MOTORY

benzynowe, naftowe i spirytusowe



akcyjnej fabryki MOTORÓW

GNOM

w OBERURSEL koło Frankfurtu n. M.

DOM DLA ZIEMIAN WE LWOWIE.

DOM DLA ZIEMIAN WE LWOWIE.

MLECZARSKIE MASZYNY I NACZYNIA


firmy KAROL W. JURANY w Wiedniu

„KORONA“

odznaczone są na wszystkich obesłanych wystawach.

Paryż 1900: Grand Prix.

Zastępstwo: DOM DLA ZIEMIAN.



SEPARATORY.

System K (z jedną wkładką).

K 0	na godz.	40 litr.	K.	**145**
K 00	» »	50	» »	**170**
K 1	» »	75	» »	**210**
K 2	» »	150	» »	**275**
K 3	» »	225	» »	**365**

System R (z 3, 4, 5 wkładkami).

R 1	na godz.	125 litr.	K.	**240**
R A 1	» »	250	» »	**340**
R 2	» »	350	» »	**390**
R 3	» »	500	» »	**500**

DO RUCHU MOTOROWEGO:

K 3	na godz.	225 litr.	K.	**370**
R 3	» »	350	» »	**510**
R 7	» »	700	» »	**1050**
R 15	» »	1800	» »	**2000**
R 25	» »	2300	» »	**2400**



MAŚLNICE.

Nr	0	1	2	3
zamaśla śmietanki l.	4	8	12	20
Cena K.	25	35	45	60
Opakowanie	1	1	2	2

URZĄDZENIA KOMPLETNYCH MLECZARSTW

według najnowszych systemów.

WSZELKIE NACZYNIA MLECZARSKIE.


FABRYKA KAMIENIA
SZTUCZNEGO
i DACHÓWEK
STOWARZYSZENIE
ZAREJESTROWANE
Z OGRANICZONĄ PORĘKĄ
we LWOWIE.
POLECA WYROBY Z KAMIENIA
SZUCZNEGO:
CEGŁĘ OKŁADZINOWĄ, PŁYTKI POSADZ
KOWE KOLOROWE, GZYMSY i KAMIENIE
FASADOWE, PŁYTY CHODNIKOWE i t d
Z GLINY: DACHÓWKĘ PRASOWANĄ
i CEGŁĘ PRÓŻNĄ -
Zamówienia przyjmuje Biuro central
ne w gmachu BANKU HIPOTECZNEGO
we LWOWIE.
Telefon 396.

Pierwszy i najstarszy artystyczny Zakład

WYROBU SZYLDÓW I TABLIC z METALU LANYCH

jakoteż na szkle, blasze, drzewie itp. malowanych,

niemniej wyroby RYTOWNICZE I PIECZĘTARSKIE

założony w r. 1847

i odznaczony medalami na wielu wystawach

G. SCHAPIRY Syn

we Lwowie, Sykstuska 10.



Prócz wyż nadmienionych wyrobów wykonuje **trawione szyby** chemicznym sposobem, niemniej **szyby malowane i wypalane, WITRAŻE** w deseniach pojedynczych do najbogatszych malowideł artystycznych i oprawia takowe w ołów.

Cenniki na żądanie franko.

Ośmielam się zwrócić uwagę P. T. Publiczności na **dokładny** mój adres **tylko** pod

L. 10

przy ul. Sykstuskiej.



SKŁAD FABRYCZNY ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH

EIFERMANN & Comp.

Lwów, Gródecka 14.

Biuro centralne Drohobycz, filie Borysław, Schodnica.

Utrzymuje w składach swych wszelkie artykuły techniczne, wchodzące w zakres przemysłu gorzelnianego, browarowego, młynowego, tartakowego i naftowego.

Pokój do śniadań

pod zarządem

STAN. POCHMARSKIEGO

Lwów, Pasaż Mikolascha

zimne i ciepłe potrawy w jak największym wyborze, wszelkie napoje najlepszej jakości. Miły pobyt dla gości z prowincyi.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

nie, zwłaszcza podczas influenzy, cholery i innych epidemij, jako pierwsza pomoc. Jedna próba więcej pouczy i przekona, niż to ogłoszenie. Prawdziwy i niefałszowany jest ten balsam tylko wtedy, jeśli flaszeczka jest opatrzona powyższą zieloną marką ochronną i sposobem użycia z takąż marką ochronną. **Należy tedy zawsze zważać na powyższą markę ochronną!** Fałszerzy i naśladowców mojego jedynie prawdziwego balsamu, jakoteż sprzedających bezwartościowe, naśladowane, publiczność w błąd wprowadzające balsamy, ścigam surowo sądownie na podstawie ustawy o markach ochronnych. **Gdzie niema składu mojego balsamu, należy zamawiać i adresować wprost: An die Schutzengel Apotheke des A. THIERRY in Pregrada bei Rohitsch-Sauerbrunn.** Przed fałszerstwem chroni najlepiej **sprowadzanie wprost** z mojej fabryki. **Rozsyłkę** uskutecznia się **tylko** w patentowanych **oryginalnych kartonach** po 12 małych albo 6 podwójnych flaszek. Kosztują one (12 małych, albo 6 podwójnych flaszek) franko do każdej stacyi pocztowej w Austro-Węgrzech 5 Koron, do Bośnii i Herzegowiny 5 K. 60 hal. Mniej, niż 12 małych, albo 6 podwójnych flaszek nie wysyła się. Wysyłka tylko za poprzedniem nadesłaniem pieniędzy, lub za powziątkiem.

Apteka pod Aniołem Stróżem A. THIERRY'ego w Pregradzie
obok Rohitsch-Sauerbrunn.

Przy zamówieniach od 6 tuzinów począwszy, znaczny opust. Zamówienia, za które pieniądze równocześnie wysłano, załatwia się **natychmiast przed innemi.**

Oba te środki, niezrównane w swej skuteczności, nie ulegają nigdy zepsuciu, przeciwnie, im starsze, tem są lepsze i skuteczniejsze; nie psują się ani wskutek gorąca, ani mrozu i w każdej chwili mogą być użyte. Dają zawsze pomoc, przynajmniej aż do przybycia lekarza, oczywiście nie należy nigdy używać imitacyj i innych polecanych a bezwartościowych i bezskutecznych środków, za które się tylko niepotrzebnie pieniądze wyrzuca, ale trzeba się trzymać tego jedynego wypróbowanego środka, który w każdej rodzinie na wszelki wypadek powinien być przygotowany. Gdzie nie można dostać z wszelkiemi cechami prawdziwości, należy wprost zamawiać i adresować:

An Apotheker A. THIERRY Schutzengel-Apotheke in PREGRADA bei Rohitsch-Sauerbrunn.

Apteka pod Aniołem Stróżem

A. Thierry'ego w Pregrada.

SIŁA i DZIAŁANIE

prawdziwej maści centyfoliowej

(zwanej przedtem maścią cudowną).

Maścią tą wyleczono zupełnie 14 lat trwające, za nieuleczalne uważane, próchnienie kości, a niedawno nawet 22-letnie, zadawnione, ciężkie cierpienie podobne do raka. Prawdziwa maść centyfoliowa, o nadzwyczajnej sile, środek, który w najtrudniejszych, nawet zastarzałych cierpieniach, z najlepszym skutkiem był używany, który poprostu w leczeniu ran i uśmierzaniu bólów jest niedościgniony, polega na koncentracyi zawartej w czerwonej róży **„rosa centifolia" cudownych naturalnych środków leczniczych z innemi substancyami, które słyną z doskonałego działania na rany.**

Prawdziwa maść centyfoliowa daje się zastosować: przy cho-

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Prawdziwa angielska pomada ochronna na skórę.

Nie zawiera żadnych szkodliwych lub zakazanych substancyj, działa szybko i pewnie przeciw wszystkim chorobom skórnym,



1.

Before.



2.

After.

chroni przed każdym złym wpływem powietrza i promieni słonecznych. Usuwa zadziwiająco wszelkie nieczystości z twarzy i skóry, jako to: **piegi, plamy wątrobiane, wągry itd.** zmarszczki i nierówności skóry, szorstkie i czerwone ręce czyni delikatnemi i gładkiemi a przy ciągłem użyciu nadaje twarzy młodzieńczą świeżość i delikatność a całej skórze wogóle ton różowawy. Każdego wieczora przed spaniem natrzeć delikatnie twarz i te części ciała, które się pragnie utrzymać w młodzieńczej świeżości i delikatności, następie ubiera się rękawiczki i przez noc zatrzymuje. Z rana myje się świeżą zimną wodą i dobrem neutr. mydłem (najlepiej mojem mydłem **Borax**).

Każdy słoik musi na pokrywce mieć wypaloną firmę:

Schutzengel-Apotheke des A. Thierry in Pregrada.

Słoik prawdziwej angielskiej pomady ochronnej na skórę wraz z mydłem borax kosztuje franko kor. 3 50.

Podług oryginalnej angielskiej recepty sporządzone **w aptece pod Aniołem Stróżem A. Thierry'ego w Pregrada obok Rohitsch-Sauerbrunn.**

PASTYLKI HÄMATYNOWE.

Sporządzone podług oryginalnej francuskiej recepty z prawdziwego ekstraktu Liebiga w połączeniu z chemicznemi substancyami, są najpewniejszym środkiem do zwalczania bledmicy, anemii i chorób stąd wynikających. Wytwarzają one krew i odświeżają organizm. Przy wszystkich oznakach początkującej anemii i bledmicy, które łatwo rozpoznać przez lekkie zmęczenie, osłabienie muszkułów, bicie serca, trudne oddechanie, złe trawienie, kurcze żołądkowe, zawrót głowy, uciążliwe bóle głowy itd., należy zawczasu przeszkodzić dalszemu rozwojowi choroby i zamówić pastylki hämatynowe, które są jedynym pewnym i skutecznym środkiem przeciw bledmicy i anemii.

Pastylki hämatynowe sporządza się świeżo na każde zamówienie **w aptece pod aniołem Stróżem A. Thierry'ego w Pregradzie obok Rohitsch-Sauerbrunn.** — Pudełko kosztuje franko 4 korony.

Każde pudełko musi być zaopatrzone w własny podpis wytwórcy.

ZAGORYAŃSKI SYROP PIERSIOWY.

Bardzo przyjemny do zażywania środek dla starszych, jak i dla dzieci w każdym wieku, przeciw kaszlom wszelkiego rodzaju, katarom piersiowym i płucnym, zaflegmieniu, chorobliwemu ślinieniu, bólom piersi itd. Usuwa cierpienia przy wszystkich, choćby zastarzałych cierpieniach piersiowych i płucnych. Jedna cała flaszka kosztuje franko 3 kor. 30 hal. Każda flaszka opatrzona jest kapslą metalową z wyciśniętą na niej moją firmą. Sporządza i sprzedaje: **Apteka pod Aniołem Stróżem A. Thierry'ego w Pregrada obok Rohitsch-Sauerbrunn.**

Dokończenie na następnej stronie.


JAN PRACNER
ROUDNICE

KRAKÓW. - DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI.

DOM
DLA
ZIEMIAN
WE
LWOWIE